

PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO DEL AGUILUCHO PAMPA (*Busarellus nigricollis*) PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA

FIRST RECORD OF BLACK-COLLARED HAWK (*Busarellus nigricollis*) IN CÓRDOBA, ARGENTINA

Sabrina L. Herrero^{1,2*}, Pablo N. Montaña Rasch^{1,2} & Franco G. Montaña Herrero²

¹Club de Observadores de Aves de Palermo (COA Carancho)

²Calle 128 N° 6024, San Martín (1650), San Martín, Argentina

*sabrinaherrero@hotmail.com

RESUMEN: El Aguilucho Pampa (*Busarellus nigricollis*) se distribuye desde México hasta Uruguay. En Argentina, se lo encuentra en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe y Entre Ríos. En este trabajo presentamos por primera vez un registro de Aguilucho Pampa en la provincia de Córdoba, en la “Laguna de Can-Mar” en la localidad de San Ignacio, Valle de Calamuchita.

PALABRAS CLAVE: *Aguilucho Pampa (Busarellus nigricollis)*, *Accipitridae*, *distribución*

ABSTRACT: The Black-Collared Hawk (*Busarellus nigricollis*) is distributed from Mexico to Uruguay. In Argentina, it can be found in Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, and the northern regions of Santa Fe and Entre Ríos. In this study, we present the first recorded sighting of the Black-collared Hawk in the province of Córdoba, at the ‘Laguna de Can-Mar’ in the town of San Ignacio, Valle de Calamuchita.

KEYWORDS: *Black-Collared Hawk (Busarellus nigricollis)*, *Accipitridae*, *distribution*

El Aguilucho Pampa (*Busarellus nigricollis*) es un ave rapaz de la familia Accipitridae, única especie de su género, que habita diversos tipos de humedales: esteros, lagunas, madrejones, bosques abiertos, húmedos, campos bajos, selvas en galería en la ribera de ríos y arroyos, represas y cunetas creadas artificialmente (Bodrati & Salvador 2017). Se distribuye por la Región Neotropical, desde México hasta Uruguay (De la Peña 2020). En Argentina, su distribución comprende lugares que habitualmente no superan los 500 msnm en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe y Entre Ríos (Pearman & Areta 2020). El plumaje general del Aguilucho Pampa

es rufo ocráceo, con cola pardo negruzca sin banda. El juvenil presenta color crema en su cabeza, con apenas un estriado fino de pardo en la nuca y con la línea ocular oscura, apenas marcada (López-Lanús 2020). El día 25 de enero de 2023, a las 15:23 h, observamos y fotografiamos un individuo juvenil de Aguilucho Pampa sobrevolando la “Laguna de Can-Mar” en la localidad de San Ignacio Valle de Calamuchita, depto. de Calamuchita, Córdoba, Argentina (Fig. 1; 32°15’S, 64°51’O; 535 msnm; eBird: Montaña Rasch 2023). Se presentó planeando de manera descendente y luego, volvió a ascender, también planeando, hasta perderse en lo alto del cielo, con dirección oeste. Esta observa-

ción es novedosa por tratarse de una zona con un ambiente altoserrano donde se encuentran numerosos arroyos y ríos, sobre todo a lo largo de las quebradas, a lo que se agregan pequeñas lagunas (Salvador et al. 2017a) y porque, si bien han existido hallazgos de esta especie en zonas aún más sureñas que su distribución habitual, como en La Plata, Buenos Aires (eBird: Arroyo 2021), en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Figuroa Varela 2022) o en el Delta del Paraná (Rubini & Zagel 2021), este se trata del primer registro para la provincia de Córdoba (Salvador et al. 2017b). Esta contribución permite dar a conocer la observación y convoca a estar atentos a nuevos hallazgos en la zona mencionada, a fin de considerar luego a este registro como casual o para pensar a futuro la posibilidad de expansión de la distribución de la especie.

REFERENCIAS

- ARROYO M. (2021). eBird Checklist: <https://ebird.org/ebird/view/checklist/S79366880>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (16/01/2021)
- BODRATI A & SALVADOR S. (2017). Depredación de cría de yacaré pytá (*Caiman latirostris*), rata nutria (*Holochilus* sp.) e invertebrados por parte del Ta-guató Pampa (*Busarellus nigricollis*). *Nuestras Aves*, 62: 7–10
- DE LA PEÑA M. (2020). Aves Argentinas: Descripción, Comportamiento, Reproducción y Distribución (Actualización). Cathartidae, Pandionidae, Accipitridae, Aramidae, Rallidae, Heliornithidae. Pp 54-57 en: Tomo 4. *Comunicaciones del Museo de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"* (Nueva Serie)
- FIGUEROA VARELA A. (2022). Aguilucho Pampa. (*Busarellus nigricollis*). Argentinat [<https://www.argentinat.org/observations/143727989>]
- LÓPEZ-LANÚS B. (2020). Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos; identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. Ediciones de Campo. Audiornis Producciones. Buenos Aires, Argentina
- MONTAÑO RASCH PN. (2023). eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S126916252>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <https://ebird.org/species/blchaw1> (03/05/2023)
- PEARMAN M & ARETA JI. (2020). Birds of Argentina and the South-west Atlantic. Field Guide. Helm, London
- RUBINI F & ZAGEL M. (2021). Primer registro de nidificación exitosa del Aguilucho Pampa *Busarellus nigricollis* en el bajo delta del río Paraná, Campana, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 66: 47-49
- SALVADOR S, SALVADOR L, FERRARI C & VITALE S. (2017a). Listado de aves de la provincia de Córdoba, Argentina: "Birds Checklist". Aves Argentinas. [<https://avesargentinas.org.ar/noticia/nueva-lista-de-las-aves-de-la-provincia-de-c%C3%B3rdoba>]
- SALVADOR S, SALVADOR L & FERRARI C. (2017b). Aves de la provincia de Córdoba. Distribución e Historia Natural. DP Argentina SA, Buenos Aires




Figura 1: Aguilucho Pampa (*Busarellus nigricollis*) en vuelo observado el 25 de enero de 2023, en la "Laguna de Can-Mar", localidad de San Ignacio Valle de Calamuchita, departamento de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Fotografía: Montaña Rasch P.