

# PRIMER REGISTRO DE SUIRIRÍ REAL (*Tyrannus melancholicus*) PARA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA

## FIRST RECORD OF TROPICAL KINGBIRD (*Tyrannus melancholicus*) FOR TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA

Luciano D. Mathieu<sup>1</sup>, Leandro F. González & Kenneth Roberts<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>COA Ushuaia

<sup>2</sup>Fundación Pajareritos Argentinos y de América (PAYDA)

\*kennethrobertsrg@gmail.com

**RESUMEN:** El Suirirí Real (*Tyrannus melancholicus*) es una especie migratoria perteneciente a la familia Tyrannidae. En Argentina, se distribuye principalmente en el norte del país, extendiéndose hasta la provincia de Río Negro, con registros aislados en Chubut y uno en Santa Cruz. En este artículo, presentamos el primer registro de Suirirí Real para la provincia de Tierra del Fuego, lo que también constituye el registro más austral de la especie.

**PALABRAS CLAVE:** aves migratorias, distribución, Suirirí Real (*Tyrannus melancholicus*), Tyrannidae

**ABSTRACT:** The Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*) is a migratory species belonging to the Tyrannidae family. In Argentina, it is mainly distributed in the northern part of the country, reaching the province of Río Negro, with isolated records in the province of Chubut, and one in Santa Cruz. In this article, we present the first record of Tropical Kingbird for the province of Tierra del Fuego, which also represents the southernmost record for the species.

**KEYWORDS:** distribucion, migratory birds, Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*), Tyrannidae

El Suirirí Real (*Tyrannus melancholicus*) es una especie migratoria de la familia Tyrannidae. Esta ampliamente distribuida en América, habitando desde Canadá hasta Argentina. Habita ambientes variados, como bordes de bosques, sabanas, áreas agrícolas, y zonas urbanizadas, como parques y jardines (Stouffer et al. 2020). En Argentina, su distribución alcanza hasta la provincia de Río Negro, con registros esporádicos en Chubut. Al sur del paralelo 47°S, existen dos registros, uno en la región de Magallanes, Municipio San Gregorio, Chile (eBird: Matus 2012) y uno en la provincia de Santa Cruz, Municipio Puerto Deseado,

Argentina (eBird: Castrillón 2022). El 7 de enero de 2024, cerca de las 10:00 h, registramos un individuo de Suirirí Real posado en una mata verde (*Lepidophyllum cupressiforme*) cerca del Río San Martín (53°15'S, 68°32'O), aproximadamente a 700 metros de su desembocadura en la Bahía San Sebastián, Tierra del Fuego. El área del registro es una planicie baja con numerosas lagunas de agua salada. Está dentro de la Estepa Magallánica, con vegetación predominante de coirón (*Festuca gracillima*), mata negra (*Chilietrichum diffusum*), y calafate enano (*Berberis buxifolia*; León et al. 1998). El clima es templado frío con una tempera-

tura media anual de 5 °C, semiárido con una precipitación promedio anual de 380 mm en Río Grande, y predominando los vientos fuertes del oeste (León et al. 1998). El individuo observado mostró un comportamiento evasivo, bajando repetidamente a la mata verde y regresando a su posición original, dificultando la toma de fotografías. A pesar de la distancia inicial de 150-200 metros, logramos obtener una imagen clara después de un tiempo de observación (Fig. 1). Este registro representa el primero del Suirirí Real en la provincia de Tierra del Fuego y es el registro más austral de la especie hasta la fecha.

## REFERENCIAS

- Castrillon ME (2022) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S123709766>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 7/1/2024
- León RJ, Bran D, Collantes M, Paruelo JM, Soriano A (1998) Grandes unidades de vegetación de la Patagonia extra andina. *Ecología Austral*, 8: 125–144
- Matus R (2012) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S14882064>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 7/1/2024
- Stouffer PC, Chesser RT, Jahn AE (2020) Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*), version 1.0. En: Birds of the World, Billerman SM (eds). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.trokin.01>. Accedido el 7/1/2024



**Figura 1.** Suirirí Real (*Tyrannus melancholicus*) observado el 7 de enero del 2024 en el Río San Martín, Bahía San Sebastián, Tierra del Fuego, Argentina. Fotografía: Roberts R.

**Figure 1.** Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*) observed on January 7, 2024, on the San Martín River, San Sebastián Bay, Tierra del Fuego, Argentina. Photograph: Roberts R.