

ESTE TRABAJO FUE REVISADO POR PARES Y POR UN COMITÉ CIENTÍFICO, Y HA SIDO ACEPTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN LA REVISTA NUESTRAS AVES. SIN EMBARGO, AÚN NO HA SIDO MODIFICADO PARA SU PUBLICACIÓN FINAL, POR LO QUE ESTA VERSIÓN Y LA FINAL PODRÍAN NO SER IGUALES.

PRIMER REGISTRO DEL PLAYERITO ENANO (*Calidris pusilla*) PARA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA

FIRST RECORD OF SEMIPALMATED SANDPIPER (*Calidris pusilla*), FOR THE PROVINCE OF TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA

Kenneth Roberts^{1*}

¹Fundación Pajareritos Argentinos y de América (PAYDA)

*kennethrobertsrg@gmail.com

RESUMEN: El Playerito Enano (*Calidris pusilla*) es un migrante neártico que cría mayormente en el norte de Norteamérica. En la época estival, llega generalmente al norte de Sudamérica, con escasos registros en el sur del continente. Aquí, presento el primer registro de Playerito Enano, para la provincia de Tierra del Fuego, Argentina.

PALABRAS CLAVE: *distribución, migración, Playerito Enano (Calidris pusilla), Scolopacidae*

ABSTRACT: The Semipalmated Sandpiper (*Calidris pusilla*) is a Nearctic migrant that breeds mostly in northern North America. In summer months, it generally reaches northern South America, with scarce records in the south of the continent. Here, I present the first record of Semipalmated Sandpiper for the province of Tierra del Fuego, Argentina.

KEYWORDS: *distribution, migration, Semipalmated Sandpiper (Calidris pusilla), Scolopacidae*

El Playerito Enano (*Calidris pusilla*), es una especie de la familia Scolopacidae. Está entre los *Calidris* más pequeños, midiendo cerca de 16 cm (Sibley 2000) y pesando entre 17 y 50 gramos (Hicklin & Gratto-Trevor 2020). Es un migrante neártico, criando durante el verano boreal en el Ártico y subártico desde el extremo este de Siberia, hasta la Isla Baffin y la provincia de Terranova y Labrador, en Canadá (BirdLife 2024). Después de la temporada reproductiva, migra hacia el sur, donde pasa la época estival (Hicklin & Gratto-Trevor 2020), generalmente llegando en Sudamérica por el Atlántico hasta el sur de Brasil (eBird 2024) y por el Pacífico hasta el norte de Chile (Jaramillo 2003), aunque cuenta con bastantes registros en latitudes más australes en este país (eBird 2024). En

la costa Atlántica de Argentina y Uruguay se vuelve más escaso, habiendo pocos registros (eBird 2024; EcoRegistros 2024; iNaturalist 2024). En Argentina, cuenta con registros en las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, y Chubut (Narosky et al. 1977; del Castillo et al. 2021; eBird 2024; EcoRegistros 2024; iNaturalist 2024).

En este artículo, presento el primer registro de Playerito Enano para la provincia de Tierra del Fuego. El 10 de noviembre del 2024, cerca de las 20:30 h, a las afueras de Río Grande, Tierra del Fuego, logré observar a un individuo de Playerito Enano (Fig. 1) entre un grupo de Playeritos Rabadilla Blanca (*Calidris fuscicollis*). Lo primero que me llamó la atención, al verlo

de lejos, fue el color general claro, y el tamaño, un 30% menor a los Playeritos Rabadilla Blanca. Al acercarme, logré apreciar otras características que ayudaron a su identificación; patas negras, pecho blanco con difuso semicollar parduzco, rabadilla negra, pico corto y grueso. Se estaba alimentando junto a los Playeritos Rabadilla Blanca en una laguna artificial formada en el fondo de una cantera, lo que resultaba en que estuviera rodeada casi completamente por pilas de ripio de entre tres y cinco metros de altura. Al día siguiente, cerca de las 08:00 h, volví al lugar para comprobar si el individuo permanecía allí. Tras poco tiempo de búsqueda apareció, aparentemente alimentándose sobre las bardas de ripio, junto a algunos Playeritos Rabadilla Blanca. Lo observé por un buen rato, durante el cual se movía junto a los otros Playeritos, entre las bardas de la cantera y la laguna artificial. Ambos días al momento de observar al Playerito Enano, la marea se encontraba baja. Es en este momento que queda expuesto un amplio intermareal que es utilizado por las aves playeras para alimentarse.

En la Patagonia austral esta especie solo cuenta con tres registros previos, los dos primeros en la Restinga Ali, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, el 31 de enero del 2018, (eBird: Kerbage 2018; Rost 2018) y el tercero en la Estancia 12 de febrero, Tierra del Fuego, Magallanes, Chile, el 25 de mayo del 2023 (eBird: Caceres 2023). Este último a sólo 184 km del lugar donde se hizo el registro que presento aquí. Si bien solamente cuatro registros no son suficientes para determinar fehacientemente la presencia “regular” de la especie en la zona, podrían indicar una presencia mayor a la que se creía anteriormente. La gran



Figura 1. Playerito Enano (*Calidris pusilla*), observado el 10 de noviembre de 2024, en Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Fotografía: Roberts K.

superficie de ambientes favorables y el hecho de que puede pasar desapercibido fácilmente en las grandes bandadas de otros *Calidris*, dan lugar a pensar que es una especie sub-observada.

REFERENCIAS

- BirdLife International. (2024) Species factsheet: Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla*. Downloaded from <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/semipalmated-sandpiper-calidris-pusilla>. (18/11/2024)
- Caceres E (2023) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S157431883>. eBird: An online database of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (11/04/2025)
- del Castillo M, Oscar D, La Grotteria J, Juani M, Ornstein U, Galimberti A, Terán A, and Lorenzón R. (2021). Primeros Registros de Playerito Enano (*Calidris pusilla*) para la provincia de Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves*, 66: 26–29. doi: 10.56178/na.vi66.47
- eBird. 2024. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (11/2024)
- EcoRegistros. 2025. Playerito Enano (*Calidris pusilla*) - Ficha de la especie. Accedido de <https://www.ecoregistros.org> el 21/04/2025
- Hicklin P and Gratto-Trevor CL. (2020). Semipalmated Sandpiper (*Calidris pusilla*), version 1.0. In *Birds of the World* (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA
- iNaturalist: Playerito enano (*Calidris pusilla*). <https://www.inaturalist.org/taxa/3862-Calidris-pusilla> Accedido el 21/04/2025
- Jaramillo A. (2003). *Birds of Chile*. Princeton University Press, New Jersey
- Kerbage M. (2018). eBird Checklist: <https://ebird.org/ebird/view/checklist/S75716526>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (31/01/2018)
- Narosky S, Yzurieta D and Nores M. (1977). Presencia del Chorlito Enano, *Calidris pusilla*, en la Argentina. *Hornero*, 11: 433-434. doi: 10.56178/eh.v11i5.1245
- Rost G. (2018). Primeras evidencias fotográficas del Playerito Enano (*Calidris pusilla*) para la provincia de Chubut, Argentina. *EcoRegistros Revista*, 8: 26-29
- Sibley DA. (2000). *National Audubon Society The Sibley Guide to Birds*