



GUYRA PARAGUAY (2004) *Lista comentada de las aves de Paraguay/Annotated checklist of the birds of Paraguay*. Guyra Paraguay, Asunción

MAZAR BARNETT J & PEARMAN, M. 2001. *Lista comentada de las aves argentinas*. Lynx Edicions, Barcelona.

RIDGELY RS & TUDOR G (1994) *The birds of South America. Volume 2*. University of Texas Press, Austin

WOODALL PF (2001) Family Alcedinidae (kingfishers). Pp. 130–249 en: DEL HOYO J, ELLIOTT A & SARGATAL J (eds) *Handbook of the birds of the world. Volume 3. Hoatzin to auks*. Lynx Edicions, Barcelona

Recibido: noviembre 2013 / Aceptado: febrero 2014

Nuestras Aves 59: 11, 2014

## PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO DE ERMITAÑO CANELA (*Phaethornis pretrei*) EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES

*Fernando Bernasconi*

CUAMBI (Custodios del Ambiente y la Biodiversidad), Casa 168, Bº Gral. Belgrano, Ituzaingó (3302), Corrientes, Argentina.  
Correo electrónico: bernasconif@gmail.com

El género *Phaethornis* está representado en la Argentina por dos especies, el Ermitaño Canela (*P. pretrei*) y el Ermitaño Escamado (*P. eurynome*). El Ermitaño Canela es abundante en el este y centro de Brasil, y también ocurre en Bolivia, Paraguay y norte de Argentina (Sick 1997). En Argentina cuenta con registros en Salta, Jujuy y Santiago del Estero (de la Peña 2012). En Misiones hay registros desde 1988, cuando un ejemplar fue encontrado atropellado en una ruta en las afueras de Puerto Iguazú (Castelino & Moreyra 1989).

El 14 de agosto de 2013 a las 11:45 h observé un Ermitaño Canela libando de una rosa china (*Hibiscus rosa-sinensis*) en la vereda de una vivienda dentro del ejido urbano de la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes (27°34'58.62"S, 56°40'51.78"O, 78 msnm). El 16 de septiembre de 2013, pude fotografiar (Fig. 1) a un individuo libando en bebederos para picaflores en el jardín de mi

domicilio particular, también en Ituzaingó (27°34'35.87"S, 56°40'42.58"O). Tal vez ambas observaciones se refieran a un mismo ejemplar. Luego de esto he constatado visitas de manera irregular a los bebederos antes mencionados hasta el 23 de octubre de 2013. Estos son los primeros registros documentados y observaciones del Ermitaño Canela en la provincia de Corrientes.

Ituzaingó dista unos 100 km en línea recta perpendicular al límite sur de su distribución actual en el Paraguay, en el departamento Misiones (Guyra Paraguay 2005). Esto, complementado con registros obtenidos en Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil (Damiani 2009), podría indicar que la especie está experimentando una expansión hacia al sur.

Agradezco especialmente a Luis G Pradier y a Lisandro Cardinale por la revisión de la versión previa y por el tiempo, conocimientos, sugerencias y datos que me brindaron para poder realizar este trabajo. También a Adrian Di Giacomo y Alejandro Bodrati por los datos aportados y revisión de la versión final del presente trabajo.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

CASTELINO MA & MOREYRA PA (1989) Sobre el Picaflor Ermitaño Canela (Lesson & Delattre, 1839) en la provincia de Misiones, Argentina (Aves, Trochilidae). *Nótulas Faunísticas* 16:1–2

DAMIANI RV (2009) Primeiro registro de *Phaethornis pretrei* (Aves, Trochilidae) para o Rio Grande do Sul, Brasil. *Revista Biotemas* 22:199–202

DE LA PEÑA MR (2012) *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: informe preliminar*. Ediciones Biológica, Santa Fe

GUYRA PARAGUAY (2005) *Atlas de las aves de Paraguay*. Guyra Paraguay, Asunción

SICK H (1997) *Ornitología Brasileira*. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro



**Figura 1.** Adulto de Ermitaño Canela (*Phaethornis pretrei*), Ituzaingó, Corrientes, Argentina. 16 de septiembre 2013.  
Foto: F Bernasconi.

Recibido: noviembre 2013 / Aceptado: febrero 2014