



ARTICULOS

Revista Nuestras Aves, 47:31

ACLARACIÓN SOBRE ALGUNOS REGISTROS DEL PICAFLOR PICUDO (*Helimaster longirostris*) EN LA ARGENTINA

Martín R. de la Peña

Tres de Febrero 1870. (3.080), Esperanza, Santa Fe. Correo electrónico: martin@fca.unl.edu.ar

El 10 de noviembre de 1976 se halló nidificando en Esperanza, departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe, un picaflor cuya hembra tenía una visible mancha oscura en la garganta. Olrog (1979) lo toma, al parecer, como picaflor pecho escamado (*Helimaster squamosus*). Con posterioridad la fotografía de la hembra incubando, fue enviada al Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y se la identifica como picaflor picudo (*Helimaster longirostris*). Con este dato es incluido para la avifauna argentina (De la Peña, 1978 y 1988).

Luego de este nido se localizaron dos más con hembras con mancha en la garganta, uno el 17 de octubre de 1999 en Calchaquí, departamento Vera, Santa Fe, y el otro el 4 de diciembre de 2001, en Esperanza. En este caso fue consultado Karl Schuchmann, de Alemania, el que determina que algunas hembras adultas del picaflor de barbijo (*Helimaster furcifer*) tienen una mancha en la gar-

ganta. Por tal motivo, se descartan todos estos registros del picaflor picudo. De un total de 25 nidos de picaflor de barbijo localizados, 22 eran hembras sin mancha y 3 hembras con mancha en la garganta.

En la actualidad, el picaflor picudo cuenta para la Argentina con un registro publicado, en la provincia de Formosa (F. Moschione en Mazar Barnett y Pearman, 2001).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- DE LA PEÑA, R. 1978. Enciclopedia de las aves argentinas. Editoria I Colmegna. Santa Fe, 321 páginas.
DE LA PEÑA, R. 1988. Nuevos registros de aves poco citadas para Santa Fe. Nuestras Aves, 16: 17-18.
MAZAR BARNETT, J. y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de las aves Argentinas/Annotated checklist of the birds of Argentina. Lynx Edicions. Barcelona, 164 páginas.
OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27:1-324.

Recibida: febrero de 2003

Revista Nuestras Aves, 47:31-33

NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA SANTA FE, ARGENTINA

Martín Manassero¹, Horacio Luna² y Luciano Acquaviva³

¹ Suchón 531 (3.013), San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: martinmmsc@hotmail.com

² Las Heras 1780 (2.121). Pérez, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: horacioluna@hotmail.com

³ San Sebastián 2.052 (2.121), Pérez, Santa Fe. Correo electrónico: lucianoacquaviva@hotmail.com

Los registros fueron obtenidos en su mayoría, en una zona con bosques y pastizales, pertenecientes al chaco oriental, situados a unos 16 km al oeste de Villa Guillermina (28°15'S; 59° 28'O), departamento General Obligado, en el extremo nordeste de Santa Fe (localidad mencionada en el texto como "al oeste de Villa Guillermina"). Los nuevos registros realizados, quizás se deban a que en esta zona hay bosques en buen estado de conservación y a que este sector fue poco recorrido por ornitólogos y observadores de aves. Adicionalmente agregamos observaciones realizadas en otras localidades de la provincia.

Pava de monte común (*Penelope obscura*)

El 23 de agosto de 1995, se observaron dos ejemplares en Las Claritas, a 17 km al suroeste de Villa

Ocampo, departamento General Obligado, provincia de Santa Fe (M. Cracogna, com. pers.). Esta especie tenía una cita anterior en la provincia, en cercanías de Tacuarendí, departamento General Obligado, el 27 de julio de 1995 (M. Cracogna en De la Peña, 1997).

Paloma colorada (*Columba cayennensis*)

El 5 de enero de 2002, M. Manassero observó tres ejemplares en bosques de Las Claritas. El 7 de enero de 2003, registramos un ejemplar al oeste de Villa Guillermina. Es una especie rara, observada en el noreste de la provincia (De la Peña, 1997).

Ñanday (*Nandayus nenday*)

Registramos al oeste de Villa Guillermina una pareja y luego un grupo de unos cinco ejemplares en