

de 1981. Departamento San Justo= desembocadura del Río Segundo, un ejemplar el 31 de octubre de 1996. Departamento Santa María= Falda del Carmen, dos ejemplares el 22 de marzo de 1976. Departamento Tulumba= Lucio V. Mansilla, un ejemplar el 22 de junio de 1996; El Tuscal, un individuo el 11 de febrero de 1997; El Jarillal, Chuña Huasi, un ejemplar el 13 de mayo de 1990 y cuatro el 22 de diciembre de 1990. Cerro Colorado, diez ejemplares el 25 de mayo de 1982, seis el 2 de diciembre de 1984, dos el 26 de octubre de 1986, uno ejemplar el 22 de diciembre de 1996, y cinco el 14 de febrero de 1997.

Previamente, la especie ha tenido pocos registros en la provincia de Córdoba. Fue señalada para los alrededores del Dique Cruz del Eje, Villa de María, Serreuela (Nores, 1996), tiene dos registros en la costa sur de Mar Chiquita (Michelutti en Nores, 1996) y está citada en otoño e invierno para Villa María (Salvador y Salvador en prep. en Nores, 1996).

Con nuestros datos se amplía la distribución conocida y se deduce que el tangará común muestra preferencia por bosques tanto de llanura como de las sierras, pero con buena cobertura arbórea. A menudo se halla muy asociada a la presencia de liga o muérdago, plantas hemicárpasitas de la familia Lorantáceas. Creemos que la escasez de datos que poseía esta especie fue debido a su pequeño tamaño y el hábito de frecuentar las copas de los árboles, lo que dificulta su detección, a menudo realizada al escuchar su canto.

Consideramos que la especie es común en los ambientes boscosos de la provincia.

Agradecemos a Conrado Rosacher, Duilio Brunello, Guillermo Olmos, Alejandro Giraudo, Pablo Cano y Luis Biancucci por los datos aportados.

*Revista Nuestras Aves*, 39: 11-12.

## NIDIFICACIÓN DEL GAVIOTÍN CHICO COMÚN (*Sterna superciliaris*) EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Hernán Pouyedano

Calle 16 Nº 887 (1.900) La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

El 29 de enero de 1994, mientras recorría playas solitarias situadas a unos 30 km al norte de la localidad de Mar Chiquita (partido Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires), observé una pareja de gaviotines chicos comunes que agredían a un grupo de gaviotas cocineras (*Larus dominicanus*), impidiéndoles asentarse en el lugar. Al acercarme, comprobé que defendían su nidada compuesta por tres huevos de tonalidad crema con manchitas pardas y grises, depositados en una simple depresión en la arena, distante unos 60 m de la orilla del mar.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BALDO, J. L. y M. ORDÁNO. 1993. Nuevos registros de aves para Sierra Grande, departamentos San Alberto, Santa María y Punilla, Provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 48: 1-15.
- BIANCUCCI L. 1995. Una nueva especie para la avifauna cordobesa y nuevas localidades para otras seis. *Hornero*, 14: 76.
- BUCHER, E. H. 1992. Population and conservation status of flamingos in Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. *Waterbirds*, 15: 179-184.
- DE LA PEÑA, M. R. 1986. Guía de las aves argentinas. Tomo III. Grafos Impresiones, Santa Fe, 82 páginas.
- FRENZEL, J. 1891. Uebersicht über die in der Provinz Córdoba (Argentinien) vorkommenden Vogel. *J. F. Orn.*, 194:113-127.
- LUTI, R., M. A. BELTRAN de SOLIS, F. M. GALERA, N. MULLER de FERREYRA, M. BERZAL, M. NORES, M. A. HERRERA y J. C. BARRERA. 1979. Vegetación de la provincia de Córdoba. En J. B. VAZQUEZ, R. A. MIATELLO y M. E. ROQUE (eds.), *Geografía Física de la Provincia de Córdoba*: 297-368. Edit. Bolt.
- MICHELUTTI, 1994. Presencia de la parina chica (*Phoenicoparrus jamesi*) en la Reserva de Mar Chiquita. *Nuestras Aves*, 30: 26.
- MIATELLO, R., V. COBOS y C. ROSACHER. 1991. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. *Historia Natural*, 8:1-5.
- NAVAS, J. R. y N.A. BO 1991. La distribución geográfica de las razas australes de *Anairetes parvulus* en la Argentina (Aves, Tyrannidae). *Neotrópica*, 37 (98): 145-149.
- NELLAR ROMANELLA, M. M. 1993. Lista y distribución de las aves de San Luis. Museo Privado Ciencias Naturales e Investigaciones Ornitológicas "Guillermo E. Hudson". San Luis, 98 páginas.
- NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. H. Bucher (editores), "Biodiversidad de la provincia de Córdoba": 255-337. Córdoba, 378 páginas.
- NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 56 (1-2): 1-114.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.
- SALVADOR, S. 1983. La avifauna en Villa María y sus alrededores. Escuela Normal "Víctor Mercante", Inst. Sec. "Bernardino Rivadavia". Villa María, Córdoba, Argentina.
- YZURIETA, D. 1995. Manual de reconocimiento y evaluación ecológica. Ministerio de Agricultura y Ganadería y Recursos Renovables, Córdoba, República Argentina, 396 páginas.

Recibida: julio 1997

Resulta destacable el hallazgo de esta especie nidificando en costas marinas, ya que tiene claras preferencias por el uso de ambientes fluviales (Moschione y Klimaitis, 1984; de la Peña, 1987). Posiblemente esta presencia esté ligada al sistema de la albufera Mar Chiquita, hábitat propicio para la especie pero carente de playas arenosas adecuadas para nidificar.

Debemos comentar que en la zona hay otras especies muy parecidas, como el gaviotín chico boreal (*Sterna antillarum*), por lo cual futuras observaciones deberían tener en

cuenta esto para confirmar mi hallazgo.

El gaviotín chico común es ocasional para la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993), sin datos de nidificación. Los registros más australes corresponden al Cabo San Antonio y cercanías, donde es frecuente observarla (Blanco *et al.*, 1988; y observaciones propias). Se trataría del primer registro de nidificación para la provincia, como así también el más austral para la especie.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

BLANCO, D. E., G. D. PUGNALI y H. RODRÍGUEZ GOÑI. 1988 Punta Rasa:

su importancia en la conservación de las aves migratorias. Informe inédito.

DE LA PEÑA, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves Argentinas. Edición del Autor. Santa Fe.

MOSCHIONE, F. y J. KLIMAITIS. 1984. Observaciones sobre nidificación asociada de *Charadrius collaris*, *Sterna superciliaris* y *Rynchops nigra* en el Río Uruguay, Entre Ríos Argentina. El Hornero, 12 (3): 197-202.

NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.

Recibida: julio de 1997.

## Comunicaciones

Revista Nuestras Aves, 38: 12.

### PRIMER REGISTRO DEL CANASTERO PÁLIDO (*Asthenes modesta*) EN EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI, PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA

Daniel E. Feinstein

Casilla de Correo 984, (8.400) San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Correo electrónico: feinstei@bariloche.com.ar

El 25 de febrero de 1997 a primeras horas de la tarde, vimos un ejemplar de *Asthenes modesta* caminando con saltitos entre piedras, sobre la margen izquierda del río Limay, 3 km aguas abajo del paraje Villa Llanquín, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia del Neuquén.

Pudimos observar claramente el estriado debajo de la mancha gular, una delgada franja superciliar, y también las timoneras rufas y negras. Emitía agudos, breves y continuos "pit"(en coincidencia con lo descripto en la bibliografía). Se posó sobre un *Verbascum thapsus* y, al notarse observado, desapareció detrás de unos arbustos.

El canastero pálido se distribuye en la Argentina desde la Puna, en el noroeste del país, hasta el sur de la Patagonia (Olrog, 1979). Sin embargo, la especie no estaba citada para el Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi (Christie et

al., 1988; Chehébar y Ramilo, 1989).

Agradezco a Eduardo Ramilo por el aporte de datos; a Mariano Gelain por su estímulo para la redacción de este informe; y a mi esposa Judith por su apoyo, paciencia y manejo.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

CHEHÉBAR, C. y E. RAMILO. 1989. Fauna del Parque Nacional Nahuel Huapi. 38 páginas.

CHRISTIE, M. I., E. RAMILO y M. BETTINELLI. 1988. Las aves de los parques nacionales norpatagónicos y zonas adyacentes. Administración de Parques Nacionales, San Carlos de Bariloche.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

Recibida: mayo 1997.

Revista Nuestras Aves, 38: 12-14.

### NOTAS BREVES SOBRE AVES DE LA ARGENTINA Y PAÍSES VECINOS

por Marcos Babarskas y Juan Carlos Chebez  
(compilación y comentarios)

En reiteradas oportunidades socios y amigos de la Asociación Ornitológica del Plata han enviado cartas comentando registros interesantes de aves para el cono sur de América, sin responder a la forma clásica de artículos y comunicaciones. A través de esta nueva sección de Nuestras Aves damos a conocer esa información inédita recibida. En general

los datos corresponden a novedades ornitogeográficas, pero también recibimos registros de nidos, datos de comportamiento, y otros aspectos de la vida de las aves.

Nuestra tarea como compiladores será la de seleccionar y comentar lo novedoso de ese material citando desde ya la fuente y confrontándolo con la bibliografía necesaria.