SUMARIO

1	Observaciones	de	Camr	20

- 10 Noticias. La Reaparición de un Ave de Sol
- 11...... Beca Olrog. La Gaviota de Olrog. Entre Canales y Cangrejos

Observaciones de Campo

Revista Nuestras Aves 37: 1, 1997

HALLAZGO DEL PRION PICO ANCHO (Pachyptila desolata) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Juan P. Isacch y Silvina Bachmann

Laboratorio de Vertebrados, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3250, (7600) Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

El 27 julio de 1996 encontramos en una playa ubicada al sur de la ciudad de Miramar, partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires, un ejemplar muerto de Prión Pico Ancho (*Pachyptila desolata*). Por su estado, es muy probable arribara a la costa debido a una fuerte sudestada ocurrida dos semanas antes del hallazgo. Se podía distinguir la coloración general característica del género con una banda negra en el extremo de la cola. Fue medido el pico y corroborada la especie en base a Escalante (1970) y a Narosky e Yzurieta (1987). Las medidas fueron: culmen 27,6 mm y ancho máximo del pico 14,0 mm. El cráneo quedó en la colección del Laboratorio de Vertebrados, Universidad Nacional de Mar del Plata.

Esta especie nidifica en la Antártida e Islas del Atlántico Sur y migra hacia el norte durante el invierno, alcanzando sobre el Atlántico las latitudes de la Argentina, Uruguay y sur de Brasil (Watson, 1966; Escalante, 1970; Harrison, 1983). A pesar de su distribución pelágica nunca había sido citado para la costa de la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Agradecemos a Mariano Martínez por la lectura crítica del manuscrito.

BIBLIOGRAFIA CITADA

ESCALANTE, R. 1970. Aves marinas del río de la Plata y aguas vecinas del Océano Atlántico. Ed. Barreiro y Ramos S. A. Montevideo. Uruguay. 199 pp. HARRISON, P. 1983. Seabirds an identification guide. Croom Helm. Ltd. A. H. & A. W. Redd. Beckentham, 448 pp.

NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 pp.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 pp.

WATSON, G. E. 1966. Seabirds of the tropical atlantic ocean. Smithsonian identification manual. Press. Washington D. C., 120 pp.

Recibida: octubre 1996.

Revista Nuestras Aves 37: 1-2, 1997

ALBINISMO EN UN EJEMPLAR DE OSTRERO COMUN (Haematopus palliatus)

Diego Zelaya¹, Tito Narosky², Sebastián Di Martino³ y Pablo Petracci⁴

¹-Agüero 1261, 2 E, (1425) Buenos Aires, Argentina. ²-Avenida H. Yrigoyen 4200, (1824) Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina. ⁴-Agustín Alvarez 1812, (8000) Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina. ⁴-Patricios 712, (8000) Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

El 14 de agosto de 1995, recorriendo las playas del balneario La Chiquita, 60 km al este de Mayor Buratovich, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires, Zelaya, Narosky y Adolfo García Ruiz observaron un ejemplar de Ostrero Común (*Haematopus palliatus*) completamente albino, con pico y patas del color de los ejemplares normales, pero el iris oscuro, tal vez pardo negruzco. Este