

REGISTRO DEL MACÁ GRIS (*Podiceps dominicus*) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA

Hernán Casañas y Rubén Cargnelutti

Delegación Córdoba "Claes C. Olrog" de la Asociación Ornitológica del Plata. Casilla de Correo 9, (5178) La Cumbre, Provincia de Córdoba, Argentina

La especie es citada para la provincia de Córdoba por Stempelmann y Schulz (1890) bajo el nombre de *Colymbus dominicanus*, considerando además que la misma "pasa vagando y hace su nido en otra provincia".

Posteriormente Nore's *et al.* (1983) y Nore's (1996) aclaran que la cita se debe a una confusión con el Macá Común (*Podiceps rolland*), en base a un ejemplar mal clasificado depositado en el Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba (MZUNC).

El 11 de noviembre de 1996 fue observado un ejemplar en plumaje nupcial de este macá, a unos 20 km al este de la localidad de Cruz del Eje (30° 44' S 64° 48' O). El cuerpo de agua artificial (tajamar de represa), ubicado a unos 8 km de la ruta nacional 36 y su intersección con el camino a Copacabana (límite entre los departamentos Punilla e Ischilín), posee una superficie no mayor a una hectárea, y es alimentado por una vertiente natural ubicada a pocos kilómetros del lugar.

La vegetación de la zona corresponde a un ecotono entre el bosque serrano y el bosque chaqueño occidental (Cabrera, 1976), degradada por la acción de la ganadería y la tala. En ciertos sectores del cuerpo de agua pueden encontrarse algunos manchones de juncos (*Schoenoplectus californicus*). El ejemplar observado se encontraba en compañía del Macá Común con quien se mostraba muy agresivo.

Probablemente el mismo individuo fue observado posteriormente el 17 de noviembre de 1996 en el mismo sitio (en compañía de A. Bosso, L. Volkmann y J. Klavins). Dos días después Volkmann (com. pers.) volvió a observarlo en el lugar.

Teniendo en cuenta la consideración de Nore's (1996) este sería el primer registro concreto para Córdoba.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- CABRERA, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia argentina de agricultura y jardinería, tomo 2 (fasc. 1). Editorial ACME S.A.C.I., Buenos Aires, 85 pp.
- NORE'S, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. H. Bucher (editores), "Biodiversidad de la provincia de Córdoba": 255-337. Córdoba, 378 pp.
- NORE'S, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 56 (1-2): 1-114.
- STEMPELMANN, H. y F. SCHULZ. 1890. Enumeración de las aves de la provincia de Córdoba (República Argentina). Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 10: 393-409.

Recibida: Diciembre 1996

Revista Nuestras Aves 37: 6-7, 1997.

PRESENCIA DEL ATI (*Phaetusa simplex*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Alcjandro Bodrati¹, Guillermo Bodrati¹ y Carlos A. Ferrari²

¹-Los Ceibos 1695, (1607) Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, Argentina. ²-Matheu 2151, 1º B, (1249) Buenos Aires, Argentina.

Las citas del Atí (*Phaetusa simplex*) para la provincia de Buenos Aires son según Narosky y Di Giacomo (1993): noviembre de 1902 (Hartert y Venturi, 1909) y noviembre de 1904 (piel en Museo Argentino de Ciencias Naturales), ambos para Barracas al Sud. Además según Durnford (1877) y Lynch Arribálzaga (1878), habitó las costas del Plata y del Paraná. Por estos registros la presencia del Atí actualmente era considerada hipotética para la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993). Recientes avistajes permiten confirmar su presencia actual en el extremo norte del territorio bonaerense.

El 14 de abril de 1995 en campos inundados y bañados formados por el desborde del arroyo Espinillo, a 12 km al norte de la ciudad de San Pedro y a la vera del camino que une dicha ciudad con el sitio histórico Vuelta de Obligado, se observó un individuo solitario de Atí, el cual sobrevoló la zona aproximadamente 15 minutos, para luego dirigirse en dirección a la costa del río Paraná. En el lugar también se observaron diversas especies acuáticas como Cisne Cuello Negro (*Cygnus melanocorypha*), Sirirí Colorado (*Dendrocygna bicolor*), Pato Cutirí (*Amazonetta brasiliensis*), Gaviotín Lagunero (*Sterna trudeaui*), etc. (Bodrati 1996).

Posteriormente al atardecer del 18 de enero de 1997, pudo observarse un grupo de 12 individuos de Atí, volando de norte a sur, siguiendo el curso del río Baradero, a 11 km al sur de la ciudad homónima, en campos de la Fundación Figueroa Salas.

Es interesante comentar que ambos avistajes coinciden con importantes crecidas del río Paraná.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- BODRATI, A., G. BODRATI y H. FERNANDEZ. 1996. Sobre la importancia en la conservación de un Refugio Histórico y Natural en las barrancas de Vuelta de Obligado, Partido de San Pedro. Informe Inédito, Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, 25 pp.
- DURNFORD, H. 1877. Notes on the birds of the province of Buenos Ayres. Ibis 1877: 166-203.
- HARTERT, E. y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. Novit. Zool., 16: 159-267.
- LYNCH ARRIBALZAGA, E. 1878. Rápida ojeada sobre la fauna del Baradero. El Naturalista Argentino, I: 3-18, 52-58, 75-83, 101-105, 242-248, 330-336.