

CONTRERAS, J.R. 1981. Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No Passeriformes. Hist. Nat. 2: 21-28.

- 1987. Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Formosa, República Argentina. Hist. Nat. 7: 33-52.

LUTI, R., M. SOLIS, F. GALERA, N. FERREYRA, M. BERZAL, M. NORES, M. HERRERA y J. BARRERA. 1979. Geografía Física de la Provincia de Córdoba. VI, Vege-

tación. J. Vázquez, R. Miatello, M. Roqué. Ed. Boldt. Argentina. pp. 297-367.

NORES, M. y D. YZURIETA. 1980. Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina. Sec. de Estado de Agric. y Ganad. Córdoba.

NORES, M.; D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las Aves de Córdoba, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cs. Cba. 56: 1-114.

OLROG, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna Argentina. Opera Lilloana. 27: 1-324.

* Recibida enero de 1992

** Cátedra de Zoología II (Vertebrados). Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Avda. Vélez Sársfield 299, (5000) Córdoba.



Cardenilla en la laguna de Los Padres, Buenos Aires*

Por Juan Núñez Chas y Miguel Sorensen**

En la bibliografía reciente (Narosky y Yzurieta 1987, Ridgely y Tudor 1989) se da como límite austral de distribución de la Cardenilla (*Paroaria capitata*) el norte de la provincia de Buenos Aires. Nores (1986) comunica el registro, aparentemente extralimital, de un individuo en Viedma, provincia de Río Negro.

El 24 abr 90, en la Laguna de los Padres, pdo. de Gral. Pueyrredon, a unos 20 km de la ciudad de Mar del Plata, observamos siete individuos de esta especie, tanto adultos como juveniles. En el mismo sitio la observaron M. Fugassa (com. pers.) unos meses antes, y R. Ymbernon el 17 ene 87, criando pichones en la copa

de un sauce criollo (*Salix humboldtiana*). El mismo observador también halló la especie en la estancia La Peregrina, muy cerca de la laguna La Brava, pdo. de Balcarce.

Por último, en la colección del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata, se encuentra una piel de esta especie (nº PC 176), obtenida el 25 abr 88 en dicha ciudad por J. V. Schactel.

La información de esta nota permitiría confirmar la ampliación de la distribución de la Cardenilla en Buenos Aires.

Agradecemos a R. Castillo (del museo L. Scaglia), a M. Fugassa y a R. Ymbernon sus datos, así como al

Grupo Ornitológico del Sudeste Bonaerense (LARUS) por su colaboración ●

BIBLIOGRAFIA

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

NORES, M. 1986. Nuevos registros para aves de Argentina. Homero 12: 304-307.

RIDGELY, R. S. y G. TUDOR. 1989. The Birds of South America: I The Oscines Passerines. Univ. of Texas Press, Austin.

* Recibida junio de 1991.

** España 2052 3º B, 7600 Mar del Plata.



Hallazgo extralimital del Burrito Pico Rojo

Neocrex erythrops olivascens *

Por Aníbal R. Camperi **

El Burrito Pico Rojo (Fam. Rallidae) tiene una distribución conocida en la Argentina que abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Chaco.

La primera cita para Tucumán corresponde a Lillo (1902), quien la menciona para San Miguel de Tucumán; a ésta se suman las de Wetmore (1926) para Tapia, y de Navas (1991) para Taí Viejo y Concepción, quien además menciona, por primera vez, una localidad salteña para esta raza: Orán.

Olog (1958) la registra por primera vez para Jujuy, citándola para Yuto y San Salvador de Jujuy. Salvador y Narosky (1987) dan a conocer un registro de observación realizado cerca de Villa Angela, Chaco.

En el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) acaba de ingresar un ejemplar de esta subespecie, sin sexo determinado, encontrado muerto por el señor Raúl Chiesa en península de Valdés, Chubut, en noviembre de 1989. Como es poco pro-

bable que se tratara de un ejemplar escapado de cautiverio, ya que el plumaje se halla en perfectas condiciones, el presente registro puede ser considerado extralimital. Al tratarse de una especie poco común y difícil de observar, es posible que pase inadvertida muchas veces, por lo que su área de distribución puede ser mayor que la conocida.

En el MACN existen las siguientes pieles correspondientes a esta raza: JUJUY, Yuto, 1 masculino, 7 feb 1963,

col. F. Contino. SALTA, Orán, 1 masculino, 24 nov 1971, col. G. Hoy. TUCUMAN, concepción, 1 femenino, 7 mar 1927, col. J. Mogensen; Taffi Viejo, 1 masculino, 9 ene 1915, col. P. Girard.

En el Museo de Ciencias Naturales de La Plata hay dos ejemplares más: TUCUMAN, Buena Vista, San Pedro de Colalao, 1 masculino, 16 ene 1961, col. J. Guanuco; río Tipa, San Pedro de Colalao, 1 masculino, 10 dic 1960, col. J. Guanuco ●

BIBLIOGRAFIA

LILLO, M., 1902. Enumeración sistemática de las aves de la provincia de Tucumán. *An. Mus. Nac. Buenos Aires* 8: 169-221.

NAVAS, J.R., 1991. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Vol. 43, Aves, Fasc. 3, Gruiformes. PROFADU, CONICET.

OLROG, C.C., 1958. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). IV. *Acta Zool. Lilloana* 16: 83-90.

SALVADOR, S. y T. NAROSKY, 1987. Nuevos registros para aves argentinas. *Nuestras Aves* 13: 9-11.

WETMORE, A., 1926. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay

and Chile. *Bull. U. S. Nat. Mus.* 133: 1-448.

*Recibida agosto de 1991.

** Fac. Cs. Naturales y Museo de la Plata, Div. Zoología de Vertebrados, Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata.

N. de la R.: el mismo mes en que esta nota era considerada por los revisores (agosto 1991) salía de imprenta "Nueva guía de las aves argentinas" de Canevari et. al, donde se cita el hallazgo que motivó esta nota. Como se trata de una especie poco conocida, y la nota incluye los antecedentes de la especie, la redacción igualmente considero adecuado publicarla.

Algunas aves nuevas o poco conocidas para la región de Bahía Blanca*

Por Rolf Delhey*

La avifauna de Bahía Blanca y sus alrededores está poco estudiada.

Existe una lista de especies de Marelli (1933) y otra más reciente, aún no publicada (Delhey et al 1987). La presente nota tiene por objetivo señalar la presencia de algunas especies poco conocidas o no citadas anteriormente en la región.

Harpyhallaetus coronatus - Agulla Coronada.

10/6/1988, Ruta Nac. 35, km 211 (cerca de la localidad de Perú, Depto. Guatraché, La Pampa); dos ejemplares en la copa de un árbol. Aunque el lugar indicado queda a unos 200 km de Bahía Blanca, me parece interesante dar a conocer esta observación dado que no he encontrado ningún registro reciente de la especie en la zona que, según Olrog (1979) llega hasta Río Negro. Ringuelet y Arámburu (1957) la mencionan para Carmen de Patagones.

Spizlapteryx circumcinctus - Halconcito Gris.

Entre el 10 y 14/3/1988 pude observar un ejemplar, siempre en el mismo lugar en las afueras de Bahía Blanca. Esta especie es bastante frecuente en el monte, durante los meses de invierno. El 14/7/1991 registré seis individuos en la zona de Chasicó (pdo. Villarino) y el 21/7/1991 tres, en sólo dos horas de observación, en Cabeza de Buey (Villarino). El Halconcito Gris ha sido observado anteriormente en el área por Short (1967)

y Zapata y Martínez (1972).

Thrinocorus rumiclvorus - Agachona Chilca.

1/4/1987, campo abierto en las afueras de la ciudad; dos ejemplares. En abril de 1879, Doering observó con frecuencia las bandadas de esta especie en los campos bonaerenses entre Azul y Puán (Doering y Lorentz 1939), pero hoy parece ser más rara, al menos en la zona de estudio.

Chordelles minor - Añapero Boreal.

A partir del verano 1984/85 he registrado entre uno y cuatro individuos sobrevolando el Barrio Parque Patagonia de Bahía Blanca, siendo la fecha más temprana de observación el 20/12 y la más tardía el 1/3. En todos los casos habían sido días muy calurosos y los añaperos aparecieron durante unos pocos minutos crepusculares, volando por encima de los árboles, aparentemente en actitud de cazar insectos. Tuve oportunidad de observar un ejemplar posado a lo largo de una rama de lambertiana (*Cupressus macrocarpa*), a unos 3 m sobre el suelo, donde permaneció hasta el crepúsculo. De acuerdo con Pereyra (1932) esta especie llegaría hasta el delta del Paraná. Con el registro de Fiameni (1987b) para Necochea y las observaciones presentadas aquí, el límite de distribución se extiende ahora bastante más hacia el sur y oeste.

Leucochloris albicollis - Pica-

flor Garganta Blanca.

Fue observado en varias oportunidades a partir de primavera de 1985, en barrios residenciales de la ciudad, correspondiendo la fecha más temprana al 2/9 y la más tardía (en la primavera) al 3/11, además de un registro en otoño (11/3). Esta especie ha sido citada para la zona norte y costa atlántica bonaerenses, con observaciones más cercanas en Necochea (Fiameni 1986), Monte Hermoso (Bó y Darrieu 1988) y Tornquist (De Lucca 1990). Nuestros registros sugieren que sigue avanzando hacia el sur y oeste.

Sephanoides galeritus - Picaflor Rubí.

A partir de mayo de 1986, pude observar un grupo de por lo menos cuatro individuos en el Barrio Parque Patagonia. Durante los meses de julio y agosto (último registro 27/8/1986) un macho solía visitar frecuentemente nuestro jardín libando de las flores de transparente (*Myoporum laetum*) y membrillero japonés (*Chaenomeles lagenaria*), y buscando pequeños insectos y arañas en los cipreses. Entre el 19/4 y 16/8/1987 se hicieron nuevamente presentes, pudiendo observarse también las hembras. Durante el invierno de 1989 vi, en varias oportunidades, picaflores sobrevolando el jardín sin poder identificarlos, pero es casi seguro que se tratara de la misma especie. Este picaflor es un ocasional visitante en la provincia de Bue-