

col. F. Contino. SALTA, Orán, 1 masculino, 24 nov 1971, col. G. Hoy. TUCUMAN, concepción, 1 femenino, 7 mar 1927, col. J. Mogensen; Taffi Viejo, 1 masculino, 9 ene 1915, col. P. Girard.

En el Museo de Ciencias Naturales de La Plata hay dos ejemplares más: TUCUMAN, Buena Vista, San Pedro de Colalao, 1 masculino, 16 ene 1961, col. J. Guanuco; río Tipa, San Pedro de Colalao, 1 masculino, 10 dic 1960, col. J. Guanuco ●

BIBLIOGRAFIA

LILLO, M., 1902. Enumeración sistemática de las aves de la provincia de Tucumán. *An. Mus. Nac. Buenos Aires* 8: 169-221.

NAVAS, J.R., 1991. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Vol. 43, Aves, Fasc. 3, Gruiformes. PROFADU, CONICET.

OLROG, C.C., 1958. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). IV. *Acta Zool. Lilloana* 16: 83-90.

SALVADOR, S. y T. NAROSKY, 1987. Nuevos registros para aves argentinas. *Nuestras Aves* 13: 9-11.

WETMORE, A., 1926. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay

and Chile. *Bull. U. S. Nat. Mus.* 133: 1-448.

*Recibida agosto de 1991.

** Fac. Cs. Naturales y Museo de la Plata, Div. Zoología de Vertebrados, Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata.

N. de la R.: el mismo mes en que esta nota era considerada por los revisores (agosto 1991) salía de imprenta "Nueva guía de las aves argentinas" de Canevari et. al, donde se cita el hallazgo que motivó esta nota. Como se trata de una especie poco conocida, y la nota incluye los antecedentes de la especie, la redacción igualmente considero adecuado publicarla.

Algunas aves nuevas o poco conocidas para la región de Bahía Blanca*

Por Rolf Delhey*

La avifauna de Bahía Blanca y sus alrededores está poco estudiada.

Existe una lista de especies de Marelli (1933) y otra más reciente, aún no publicada (Delhey et al 1987). La presente nota tiene por objetivo señalar la presencia de algunas especies poco conocidas o no citadas anteriormente en la región.

Harpyhallaetus coronatus - Agulla Coronada.

10/6/1988, Ruta Nac. 35, km 211 (cerca de la localidad de Perú, Depto. Guatraché, La Pampa); dos ejemplares en la copa de un árbol. Aunque el lugar indicado queda a unos 200 km de Bahía Blanca, me parece interesante dar a conocer esta observación dado que no he encontrado ningún registro reciente de la especie en la zona que, según Olrog (1979) llega hasta Río Negro. Ringuelet y Arámburu (1957) la mencionan para Carmen de Patagones.

Spizlapteryx circumcinctus - Halconcito Gris.

Entre el 10 y 14/3/1988 pude observar un ejemplar, siempre en el mismo lugar en las afueras de Bahía Blanca. Esta especie es bastante frecuente en el monte, durante los meses de invierno. El 14/7/1991 registré seis individuos en la zona de Chasicó (pdo. Villarino) y el 21/7/1991 tres, en sólo dos horas de observación, en Cabeza de Buey (Villarino). El Halconcito Gris ha sido observado anteriormente en el área por Short (1967)

y Zapata y Martínez (1972).

Thrinocorus rumiclvorus - Agachona Chlca.

1/4/1987, campo abierto en las afueras de la ciudad; dos ejemplares. En abril de 1879, Doering observó con frecuencia las bandadas de esta especie en los campos bonaerenses entre Azul y Puán (Doering y Lorentz 1939), pero hoy parece ser más rara, al menos en la zona de estudio.

Chordelles minor - Añapero Boreal.

A partir del verano 1984/85 he registrado entre uno y cuatro individuos sobrevolando el Barrio Parque Patagonia de Bahía Blanca, siendo la fecha más temprana de observación el 20/12 y la más tardía el 1/3. En todos los casos habían sido días muy calurosos y los añaperos aparecieron durante unos pocos minutos crepusculares, volando por encima de los árboles, aparentemente en actitud de cazar insectos. Tuve oportunidad de observar un ejemplar posado a lo largo de una rama de lambertiana (*Cupressus macrocarpa*), a unos 3 m sobre el suelo, donde permaneció hasta el crepúsculo. De acuerdo con Pereyra (1932) esta especie llegaría hasta el delta del Paraná. Con el registro de Fiameni (1987b) para Necochea y las observaciones presentadas aquí, el límite de distribución se extiende ahora bastante más hacia el sur y oeste.

Leucochloris albicollis - Pica-

flor Garganta Blanca.

Fue observado en varias oportunidades a partir de primavera de 1985, en barrios residenciales de la ciudad, correspondiendo la fecha más temprana al 2/9 y la más tardía (en la primavera) al 3/11, además de un registro en otoño (11/3). Esta especie ha sido citada para la zona norte y costa atlántica bonaerenses, con observaciones más cercanas en Necochea (Fiameni 1986), Monte Hermoso (Bó y Darrieu 1988) y Tornquist (De Lucca 1990). Nuestros registros sugieren que sigue avanzando hacia el sur y oeste.

Sephanoides galeritus - Picaflor Rubí.

A partir de mayo de 1986, pude observar un grupo de por lo menos cuatro individuos en el Barrio Parque Patagonia. Durante los meses de julio y agosto (último registro 27/8/1986) un macho solía visitar frecuentemente nuestro jardín libando de las flores de transparente (*Myoporum laetum*) y membrillero japonés (*Chaenomeles lagenaria*), y buscando pequeños insectos y arañas en los cipreses. Entre el 19/4 y 16/8/1987 se hicieron nuevamente presentes, pudiendo observarse también las hembras. Durante el invierno de 1989 vi, en varias oportunidades, picaflor sobrevolando el jardín sin poder identificarlos, pero es casi seguro que se tratara de la misma especie. Este picaflor es un ocasional visitante en la provincia de Bue-

nos Aires (Olrog, 1979). Simultáneamente con mis observaciones, Fiameni (1987a) lo registró en Necochea.

***Agriornis microptera* - Gaucho Gris.**

5/8 y 18/8/1985, en las afueras de Bahía Blanca. Esta especie, no es frecuente en la zona.

Zapata y Martínez (1972) lo citan para la laguna de Chasicó.

***Agriornis murina* - Gaucho Chico.**

Varias veces, entre el 13 y 15/7/88, pude observar uno o dos ejemplares, posados sobre montículos de tierra o alambrados, en un mismo lugar en las afueras de Bahía Blanca. Este gaucho fue registrado por Zapata y Martínez (1972) y Narosky (1983) en Villarino. En el mapa que acompaña el primer trabajo se encuentran además citas para Ing. White y Bahía San Blas.

***Riparia riparia* - Golondrina Zapadora.**

Entre el 18/2 y 4/3/1985 pude observar una bandada de unos 50 ejemplares en el predio del Depto. de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. En el mismo lugar apareció una bandada de unos 20 individuos entre el 25 y 29/3/1988. El día 1/12/1991, Pablo Petracci y Kaspar Delhey observaron un ejemplar en el valle del arroyo Napostá, a unos 20 km de la ciudad. Estos registros marcarían el límite austral para una especie migratoria, que anteriormente fue citada para Azul (Di Giacomo, 1987).

***Parula pitlayumi* - Pitlayumí.**

Durante varios inviernos, entre 1985 y 1991, he tenido la oportunidad de observar esta especie, en el Barrio Parque Patagonia, recorriendo los árboles y arbustos. La fecha más temprana corresponde al 12/5 y la más tardía al 27/9, tratándose siempre de ejemplares solitarios. Lo he visto también en el parque de una estancia cercana a La Dulce, partido de Necochea (22/7/1986). Esta especie llega hasta Buenos Aires (Olrog 1979) donde habita la zona norte y ribereña. Estos registros serían los más australes conocidos.

***Saltator aurantilrostris* - Peplero de Collar.**

20 y 27/7/1985, Barrio Parque Patagonia. Esta especie ha sido citada para Cristiano Muerto y Sierra de la Ventana (Bó 1965), y cercanías de Médanos (Narosky et al 1990) ●

BIBLIOGRAFIA

BO, N. A. 1965. Notas preliminares sobre la avifauna del nordeste de San Luis. *Homero* 10: 251-268.

BO, N. A. y C. A. DARRIEU. 1988. Presencia de *Leucochloris albicollis* en el balneario Monte Hermoso, Buenos Aires (Aves, Trochilidae). *Neotrópica* 34: 40.

DELHEY, R., S. DI MARTINO, J. A. ESPIE, A. L. SCOROLLI y C. B. VILLAMIL. 1987. Lista preliminar de las aves de Bahía Blanca y zonas aledañas. *Resúmenes I Jom. Nac. Fauna Silvestre*. Santa Rosa (La Pampa), 1987.

DE LUCCA, E. R. 1990. Picaflor Garganta Blanca en el SO de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 22: 32.

DI GIACOMO, A. G. 1987. Primeros registros de la golondrina parda chica en

Buenos Aires y presencia del volatinero en la misma provincia. *Nuestras Aves* 12: 20-21.

DOERING, A., y P. G. LORENTZ. 1939. La conquista del desierto. Diario de los miembros de la Comisión Científica de la expedición de 1879. Buenos Aires.

FIAMENI, M. A. 1986. Presencia del Picaflor Gigante en Necochea, Buenos Aires. *Nuestras Aves* 10: 14-15.

-1987a. Registro del picaflor cabeza granate en Necochea, Buenos Aires. *Nuestras Aves* 12: 14-15.

-1987b. Presencia no habitual de un ave en Necochea. *Nuestras Aves* 14: 12.

MARELLI, C. A. 1933. Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. *Homero* 5: 193-199.

NAROSKY, S. 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. *Homero* 12: 122-126.

NAROSKY, S., A. G. DIGIACOMO y B. LOPEZ LANUS. 1990. Notas sobre aves del sur de Buenos Aires. *Homero* 13: 173-178.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* 27: 1-324.

PEREYRA, J. A. 1932. Los caprimúlgidos (Dormilonas, golondrinas nocturnas o ataja caminos). *Homero* 5: 41-46.

RINGUELET, R. A., y R. H. ARAMBURU. 1957. Enumeración sistemática de los vertebrados de la provincia de Buenos Aires. *Min. Asuntos Agrarios, La Plata*.

SHORT, L. L. 1967. Some unusual birds of Southern Buenos Aires Province. *Homero* 10: 459-460.

ZAPATA, A. R. P., y H. S. MARTINEZ. 1972. Algunas aves no citadas y otras poco frecuentes para el sur de la provincia de Buenos Aires. *Acta Zool. Lilloana* 29: 181-199.

* Recibida enero de 1992

**Depto. de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.



Hallazgo de un nido de *Leucochloris albicollis* en Mar del Plata*

Por Juan M. Núñez Chas**

El Picaflor Garganta Blanca (*Leucochloris albicollis*) es un troquílido que se encuentra en expansión (Narosky e Yzurieta 1987). Alcanza el límite sur de distribución en la provincia de Buenos Aires, donde fue encontrado tan al sur como en Monte Hermoso (Bó y Darrieu 1988) y en

Tornquist (De Lucca 1990). Francia y Sorensen (com.pers.) lo hallaron también en Claromecó.

No conozco antecedentes sobre nidificación o status (residente o migratorio) de este picaflor para latitudes australes. Sin embargo Ymbernon (com.pers.) lo considera residen-

te en Mar del Plata, en tanto que Francia (com.pers.) lo observó en invierno de 1990 en Claromecó. En ambos casos está asociado a bosques perennifolios exóticos, de coníferas y eucaliptos.

El 21 mar 1991 hallé un nido de esta especie construido sobre la rama