

Este trabajo fue revisado por pares y un comité científico, y ha sido aceptado para su publicación en la revista *Nuestras Aves*. Sin embargo, aún no ha sido modificado para su publicación final, por lo que esta versión y la final podrían no ser iguales.

PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO DE SIRIRÍ VIENTRE NEGRO (*Dendrocygna autumnalis*) EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA (ARGENTINA)

FIRST DOCUMENTED RECORD OF THE BLACK-BELLIED WHISTLING DUCK (*Dendrocygna autumnalis*) IN CATAMARCA PROVINCE (ARGENTINA)

Victor G. Herrera^{1*}, Graciela N. Lencina¹ & Gabriel Reinoso Franchino¹

¹COA Catamarca

*vgherrera@gmail.com

RESUMEN: Esta nota da a conocer el primer registro documentado de Sirirí Ventre Negro (*Dendrocygna autumnalis*) para la avifauna de la provincia de Catamarca. La observación se realizó en el estanque de la Estación Experimental del INTA, en la localidad de Santa Cruz, Valle Viejo (Catamarca, Argentina).

PALABRAS CLAVE: *Anatidae*, *avifauna*, *distribución*, *Noroeste Argentino*

ABSTRACT: This note reports the first documented record of the Black-bellied Whistling Duck (*Dendrocygna autumnalis*) for the avifauna of Catamarca Province. The observation was made at the pond located within the INTA Experimental Station in the locality of Santa Cruz, Valle Viejo (Catamarca, Argentina).

KEYWORDS: *Anatidae*, *birdlife*, *distribution*, *Northwest Argentina*

El Sirirí Ventre Negro presenta una amplia distribución que se extiende desde las costas de Arizona y Texas en Estados Unidos, a través de Centroamérica, hasta Sudamérica al este de los Andes, incluyendo el sur de Brasil y Paraguay. En Argentina, alcanza el centro del país, con registros en Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, el sur de Córdoba, el noreste de Buenos Aires, San Luis, La Pampa y, ocasionalmente, el norte de Río Negro (Narosky & Yzurieta 2010; López-Lanús 2020; James & Thompson 2020; de la Peña 2025). En Catamarca no hay registros previos de la especie (Carma 2009), siendo los más cercanos en dirección NE, a 120 km en el departamento de Simoca, Tucumán (eBird: Cenizo 2021), y a 150 km en el departamento de Banda, Santiago del Estero (eBird: Flores 2023). Se observó un único individuo el 2 de

diciembre de 2024 en el estanque de la Estación Experimental del INTA, en la localidad de Santa Cruz, Valle Viejo, Catamarca (28° 29.847' S, 65° 40.117' O). El 3 de diciembre se realizó el registro fotográfico y el individuo continuó observándose durante cinco días más en el mismo sitio. Se pudieron constatar claramente los caracteres diagnósticos de la especie: contraste entre el pico rosado y la cabeza gris, periocular emplumado blanco y contraste entre la parte superior del cuello gris y el resto del cuello pardo, según lo descrito por López-Lanús (2020; Fig. 1 y 2).

El registro del Sirirí Ventre Negro reportado en este trabajo se encuentra dentro del extremo este del rango de distribución según lo conocido sobre la especie, aunque nunca se había reportado en la provincia de Catamarca. Existen registros aislados en Chile (Ba-

ros & Schmitt 2013) y, más al sur, en longitudes similares, como los de Zanotti (2020) en Mendoza, quien sugiere que la distribución de esta especie podría ser más amplia de lo que se conoce actualmente. Debido a que los individuos de esta especie suelen desplazarse y alimentarse en bandadas durante sus movimientos locales o migratorios y especialmente durante la temporada reproductiva (Narosky & Yzurieta 2010; James & Thompson 2020), consideramos que podría tratarse de un individuo errático, desorientado, en descanso o fuera de su rango habitual de desplazamiento, ya que solo se observó un individuo durante al menos siete días. Este tipo de registros aislados es considerado frecuente en especies con comportamiento gregario (del Hoyo et al. 1992). Finalmente, esta comunicación aporta el primer registro documentado y suma una especie a la provincia de Catamarca, ofreciendo nueva información sobre su distribución en el país.

REFERENCIAS

- Barros R, Schmitt F (2013) Resumen de Avistamientos Marzo - Agosto 2012. *La Chiricoca* 16: 24-37
- Carma MI (2009) *Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca 2007*. 1° edición. Consejo Federal de Inversiones (CFI), Buenos Aires, Argentina
- Cenizo M (2021) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S97467590>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 7/4/2026
- Flores F (2023) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S140528880>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 7/4/2026
- del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J (Eds.) (1992). *Handbook of the Birds of the World. Volume 1: Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions, Barcelona.
- James JD, Thompson JE (2020) Black-bellied Whistling-Duck (*Dendrocygna autumnalis*), version 1.0. En: Birds of the World, AF, Gill FB (eds). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bbwduc.01>. Accedido el 7/4/2026
- López-Lanús B (2020) *Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos; identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes*. Segunda edición. Audiornis Producciones. Buenos Aires, Argentina
- Narosky T, Yzurieta D (2010) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires
- de la Peña MR (2025) *Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución (Actualización). Tomo 1. Rheidae, Tinamidae, Anhimidae, Anatidae, Cracidae, Odontophoridae, Phasianidae*. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie), Santa Fe
- Zanotti M (2020) Primeros registros de Sirirí vientre negro (*Dendrocygna autumnalis*) para la provincia de Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda Serie)* 297: 1–5




Figura 1. Individuo de Sirirí Vientre Negro, en el estanque de la EEA INTA Santa Cruz, Valle Viejo, Catamarca. 03 de diciembre de 2024. Fotografía: Herrera VG.

Figure 1. Black-bellied Whistling-duck at the pond at the EEA INTA Santa Cruz, Valle Viejo, Catamarca. 3 December 2024. Photo: Herrera VG.




Figura 2. Individuo de Sirirí Vientre Negro, en el estanque de la EEA INTA Santa Cruz, Valle Viejo, Catamarca. 03 de diciembre de 2024. Fotografía: Herrera VG.

Figure 2. Black-bellied Whistling-duck at the pond at the EEA INTA Santa Cruz, Valle Viejo, Catamarca. 3 December 2024. Photo: Herrera VG.