

Este trabajo fue revisado por pares y un comité científico, y ha sido aceptado para su publicación en la revista *Nuestras Aves*. Sin embargo, aún no ha sido modificado para su publicación final, por lo que esta versión y la final podrían no ser iguales.

NUEVO REGISTRO DEL MILANO TIJERETA (*Elanoides forficatus*) PARA CÓRDOBA, ARGENTINA

NEW RECORD OF THE SWALLOW-TAILED KITE (*Elanoides forficatus*) FOR CÓRDOBA, ARGENTINA

Fernando J. Carezzano^{1*} & Tomás D. Méndez²

¹Cátedra de Morfología Animal, Departamento de Diversidad Biológica y Ecología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Avda. Vélez Sarsfield 299, CP. 5000, Córdoba, Argentina

²Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa, Zona Rural Ucaha, Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba

*fernando.carezzano@unc.edu.ar

RESUMEN: El Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) se distribuye desde Norteamérica hasta Argentina. En el país es un visitante estival regular en provincias centrales. El tres de marzo de 2025 se avistó sobrevolando en la Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa de la provincia de Córdoba un ejemplar adulto. Este registro se suma a los antecedentes que sugieren una presencia más frecuente de la especie hacia el sur de su distribución habitual.

PALABRAS CLAVE: *Accipitridae*, aves migratorias, *Elanoides forficatus*, Reserva Natural Laguna La Felipa, Milano Tijereta

ABSTRACT: The Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*) is distributed from North America to Argentina. In the country is a regular summer visitor in central provinces. On March 3, 2025, an adult specimen was spotted flying over the Laguna La Felipa Natural Wildlife Reserve in the province of Córdoba. This record adds to the growing body of evidence suggesting a more frequent presence of the species toward the southern limit of its habitual distribution.

KEYWORDS: *Accipitridae*, *Elanoides forficatus*, migratory birds, Reserva Natural Laguna La Felipa, Swallow-tailed Kite

El Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) es un accipítrido diurno y sexualmente monomórfico que habita principalmente en los márgenes de selvas, bosques abiertos, humedales arbolados y áreas asociadas a bañados o manglares, hasta los 1.600 msnm (Meyer 2020). La distribución del Milano Tijereta es extensa y abarca gran parte del continente americano, desde el sudeste de Estados Unidos hasta el noreste de Argentina y Uruguay (de la Peña 1987; Ferguson-Lees & Christie 2001; Lencina & Reinoso Franchino 2025; eBird: Tarenco 2025). Los registros más australes

incluyen Pehuén-Có en 2020 (López & Rebollo 2021) y el estuario de Bahía Blanca en diciembre de 2024 (Álvarez et al. 2024). En Córdoba, se registró por primera vez en noviembre de 1991 en la desembocadura del Río Xanaes, cerca de Miramar (Sferco & Baldo 1992). Posteriormente se han documentado otros avistamientos en Villa General Belgrano, Casa Grande (Straneck & Casañas 1995) y en Bell Ville en octubre de 2025 (EcoRegistros: Nin 2025).

El registro aquí presentado se realizó en la Re-

serva Natural de Fauna Laguna La Felipa (33°06'S, 63°33'O), ubicada en el departamento Juárez Celman, sudeste de la provincia de Córdoba. Esta reserva se ubica en la provincia fitogeográfica de la Llanura Pampeana (Kraus et al. 1999), y protege un ambiente de humedales caracterizado por una laguna central rodeada de pastizales de gramíneas y árboles y arbustos nativos y exóticos (Toledo & Menghi 2015). El 3 de marzo de 2025 a las 16:16h se avistó un ejemplar adulto de Milano Tijereta sobrevolando a baja altura la citada reserva (Fig. 1). El registro fue realizado por TDM, Guardaparque del área protegida.

El incremento de registros documentados al sur del paralelo 30° ha llevado a proponer que la especie sea considerada un visitante estival regular en esta latitud (Pagano et al. 2017). No obstante, como señalan dichos autores, esta tendencia podría estar vinculada al aumento del esfuerzo de observación y a la facilidad de identificación de la especie, factores que incrementan la frecuencia de reportes sin que se hayan evaluado aún sus causas biológicas subyacentes. En este contexto, el presente avistamiento en la Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa constituye un aporte adicional al conocimiento de la presencia y distribución del Milano Tijereta en el centro del país.



Figura 1. Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) sobrevolando a baja altura en la Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa, Ucacha, Córdoba, Argentina. Fotografía: Méndez TD.

Figure 1. Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*) flying at low altitude over the Laguna La Felipa Natural Wildlife Reserve, Ucacha, Córdoba, Argentina. Photograph: Méndez TD.

REFERENCIAS

- Álvarez AG, Alfano V, Verniere LC, Sotelo MR, López CF, Sala Díaz MV, Pontoriero AE, Cozzani N. (2024) Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) en el estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires: nuevo registro divagante de tendencia costera austral. *Nuestras Aves* 69: 115-117. <https://doi.org/10.56178/na.vi69.1038>
- Ferguson-Lees J, Christie DA (2001) *Raptors of the World*. Houghton Mifflin Harcourt, Boston
- Kraus TA, Bianco CA, Nuñez CO (1999) *Los ambientes naturales del sur de la Provincia de Córdoba: pasado, presente y futuro, con énfasis en vegetación y suelos*. Editorial de la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto
- Lencina GN, Reinoso Franchino G (2025) Nuevos registros de milano tijereta (*Elanoides forficatus*) y birro chico (*Pyrrhomyias cinnamomeus*) en su distribución austral, Andalgalá, Catamarca, Argentina. *Nuestras Aves* 70: 135-137. <https://doi.org/10.56178/na.vi70.1122>
- López FG, Rebollo ME (2021) The most austral record of Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus*. *Cotinga* 43: 115-116
- Meyer KD (2020) Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*), version 1.0. En: *Birds of the World*, Poole AF, Gill FB (eds). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.swtkit.01>. Accedido el 24/7/2026
- Nin L (2025) Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*). Eco-Registros: <https://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=658374>. Accedido el 24/7/2026
- Pagano LG, Bodrati A, Jensen R (2017) Estatus del Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) en Buenos Aires y nuevos registros para otras provincias argentinas. *Nuestras Aves* 62: 3-7. <https://doi.org/10.56178/na.vi62.20>
- de la Peña, MR (1987) *Guía de aves argentinas. Falconiformes*. Ciencia y Técnica, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe
- Sferco GD, Baldo JL (1992) Presencia del Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) en la provincia de Córdoba. *Nuestras Aves* 27: 29-30
- Straneck RJ, Casañas H (1995) El chiricote, *Aramides cajaneus*, una nueva especie, y nuevos registros del gavilán tijereta, *Elanoides forficatus*, en la provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 71: 1-4
- Tarenco G (2025) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S284731474>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 24/7/2026
- Toledo JM, Menghi (2015) Flora y recursos de la Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa (Córdoba, Argentina). *Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 2: 99-124