

Este trabajo fue revisado por pares y un comité científico, y ha sido aceptado para su publicación en la revista *Nuestras Aves*. Sin embargo, aún no ha sido modificado para su publicación final, por lo que esta versión y la final podrían no ser iguales.

AVIFAUNA DE LA RESERVA NATURAL DE GENERAL RODRÍGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA: PRIMER INVENTARIO Y USO DE HÁBITAT

AVIFAUNA OF THE GENERAL RODRÍGUEZ NATURE RESERVE, BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA: FIRST INVENTORY AND HABITAT USE

Agustin I. Casale^{1,2*}, Julián E. Lorenzi³, Ignacio Colnaghi⁴ & Germán Tamagni⁵

¹División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET), Buenos Aires, Argentina

²Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

³Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES, CONICET-UNLu), Universidad Nacional de Luján, Luján, Buenos Aires, Argentina

⁴Rivadavia 1530, General Rodríguez (1748), Buenos Aires, Argentina

⁵Dirección de Política Ambiental, Municipalidad de General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina

*agustinivancasale@gmail.com

RESUMEN: En este trabajo presentamos el primer inventario de aves de la Reserva Natural de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta lista se generó a partir de datos de relevamientos de campo propios realizados entre 2021 y 2026, complementados con antecedentes bibliográficos y registros provenientes de plataformas virtuales de ciencia ciudadana. Registramos un total de 234 especies distribuidas en 50 familias. Para cada taxón, detallamos el uso de hábitat, la probabilidad de observación, la estacionalidad y el estado de conservación global y nacional. Estos registros constituyen un aporte fundamental al conocimiento de la avifauna provincial, brindando información detallada sobre la distribución espacial y temporal de las especies y destacando el rol crucial de la reserva como área protegida para la conservación de la biodiversidad regional.

PALABRAS CLAVE: *avifauna, Buenos Aires, ciencia ciudadana, General Rodríguez, lista de aves*

ABSTRACT: In this study, we present the first bird inventory of the General Rodríguez Natural Reserve, in the province of Buenos Aires, Argentina. This list was generated by compiling data from our own field surveys conducted between 2021 and 2026, complemented with bibliographic records and data from citizen science platforms. We recorded a total of 234 species distributed across 50 families. For each taxon, we detail the main habitat used, observation probability, seasonality, and both global and national conservation status. These records constitute a fundamental contribution to the knowledge of the provincial avifauna, providing detailed information on the spatial and temporal distribution of species, and highlighting the crucial role of the reserve as a protected area for the conservation of regional biodiversity.

KEYWORDS: *avifauna, bird list, Buenos Aires, citizen science, General Rodríguez*

INTRODUCCIÓN

La Reserva Natural de General Rodríguez se encuentra en el área rural del Partido de General Rodríguez, al noreste de la provincia de Buenos Aires, a 55 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($34^{\circ}41'S$, $58^{\circ}54'O$; Fig. 1). Se ubica en el sector sureste del Partido, lindante al Lago San Francisco (Fig. 2) y delimitada por los arroyos Durazno y La Chozas, ambos tributarios del Río Reconquista, ubicando así al área dentro de su Cuenca Alta (COMIREC 2022).

Debido a su geomorfología y dinámica hídrica, la reserva presenta una marcada heterogeneidad ambiental, lo que nos permitió distinguir cuatro hábitats principales en el área caracterizados por su fisonomía y vegetación: i) pastizal, ii) arboleda, iii) juncuales y iv) lago.

El pastizal se caracteriza por ser un ambiente abierto dominado por pastos, Caraguatá (*Eryngium paniculatum*), Chilca (*Baccharis salicifolia*) y Duraznillo Blanco (*Solanum glaucophyllum*), dando lugar a ejemplares jóvenes de Sauce Criollo (*Salix humboldtiana*) a medida que los suelos se vuelven más inundables. Por su parte, la arboleda intercala ejemplares de especies nativas como el Tala (*Celtis ehrenbergiana*) con una fuerte presencia de especies exóticas invasoras, principalmente Acacia Negra (*Gleditsia triacanthos*), Moras (*Morus nigra* y *M. alba*) y Eucaliptos (*Eucalyptus camaldulensis*). Dentro de este ambiente se encuentra la histórica Casona de Saavedra (una edificación de estilo barroco francés que data de 1895 y perteneció a Eusebio Saavedra, sobrino de Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta; Fig. 3), rodeada por una cobertura vegetal fuertemente dominada por




Figura 1. Mapa de ubicación y entorno de la Reserva Natural de General Rodríguez. El mapa principal destaca el área de la reserva en color verde (centro) y detalla la geografía local, incluyendo los municipios circundantes de Marcos Paz, Moreno y Merlo. La flecha roja en el mapa de Argentina (izquierda) localiza regionalmente la reserva dentro de la provincia de Buenos Aires. La línea punteada roja delimita el área de estudio considerada, con sus respectivas coordenadas indicadas en los extremos. Se incluyen una barra de escala gráfica en kilómetros y un indicador de orientación norte. Figura modificada de COMIREC (2022).

Figure 1. Location and surroundings map of the General Rodríguez Nature Reserve. The main map highlights the reserve area in green (center) and details the local geography, including the surrounding municipalities of Marcos Paz, Moreno, and Merlo. The red arrow on the map of Argentina (left) shows the regional location of the reserve within the Buenos Aires province. The red dotted line delimits the study area considered, with its corresponding coordinates indicated at the margins. A graphic scale bar in kilometers and a north arrow are included. Figure modified from COMIREC (2022).



Figura 2. Vista del Lago San Francisco desde el interior de la Reserva Natural de General Rodríguez, ambiente acuático principal del área de estudio. Fotografía: Casale AI.

Figure 2. View of Lake San Francisco from within the General Rodríguez Nature Reserve, the main aquatic environment of the study area. Photograph: Casale AI.



Figura 3. Vista frontal de la histórica Casona de Saavedra, ubicada en el sector de arboleda de la Reserva Natural de General Rodríguez. Fotografía: Colnaghi I.

Figure 3. Front view of the historic Casona de Saavedra, located in the woodland sector of the General Rodríguez Nature Reserve. Photograph: Colnaghi I.

Ligustros (*Ligustrum* sp.) y una hilera de antiguos Plátanos (*Platanus x hispanica*). Finalmente, los ambientes estrictamente acuáticos están representados por los juncuales, compuestos principalmente por densos manchones de Junco (*Schoenoplectus californicus*), y el Lago San Francisco, que suele presentar una carpeta de vegetación flotante integrada por Lenteja de Agua (*Lemna minor*) y Repollito de Agua (*Pistia stratiotes*) (COMIREC 2022).

A pesar de su importancia biológica y su valor fundamental como área natural protegida, hasta el momento no se cuenta con un inventario detallado de la diversidad ornitológica del área. Con el objetivo de aportar al conocimiento y conservación de este espacio, en el presente trabajo presentamos un listado actualizado de las aves que utilizan la reserva y sus alrededores, caracterizando a las especies según el uso que hacen de los cuatro hábitats descritos, su probabilidad de observación, su estatus de residencia y de conservación.

MÉTODOS

Elaboramos la lista de especies integrando tres fuentes de información: (1) relevamientos de campo propios (2021-2026) dentro del área de estudio (Fig. 1); (2) antecedentes bibliográficos recientes (Morici 2016; Ibáñez et al. 2022) del Área Natural Protegida Dique Ingeniero Roggero (partido de Moreno; en adelante, ANP Dique Ing. Roggero), la zona aledaña más próxima a la reserva; y (3) registros de ciencia ciudadana provenientes de la plataforma eBird (2026), considerando registros históricos hasta el 15 de abril de 2026. Dado que el ANP Dique Ing. Roggero y la Reserva Natural de General Rodríguez conforman un continuo hidrológico y biológico ininterrumpido, decidimos integrar la información de ambas unidades para reflejar adecuadamente la avifauna de la reserva, evitando tratarlas como parches ecológicos aislados, ya que funcionalmente no lo son.

El trabajo de campo consistió en siete jornadas de relevamiento estacionales en el área de estudio, durante las cuales se cubrieron franjas horarias matutinas, vespertinas y nocturnas, lo que representó un total aproximado de 70 horas de muestreo. De manera complementaria, se incorporaron registros incidentales propios, obtenidos durante el mismo período dentro del área de estudio. Para compilar la lista final, utilizamos como marco de referencia la guía de

campo “Aves de la provincia de Buenos Aires” (Narosky & González Táboas 2021). Se evaluó la presencia de cada especie de forma individualizada, cruzando nuestros registros y la bibliografía con una revisión exhaustiva de los datos de eBird (2026) asociados a la reserva y a los alrededores del Lago San Francisco. Para garantizar la robustez de los registros de terceros, aplicamos un criterio de validación conservador: aquellas especies que presentaban un único registro en la plataforma sin evidencia documentada (fotografía o grabación de audio) no fueron contabilizadas. Solo se incluyeron taxones con respaldo audiovisual o que fueron reportados en más de una oportunidad por distintos observadores y en fechas diferentes.

La caracterización de las especies consistió en: (1) determinar su ambiente principal de uso dentro de la reserva (arboleda, pastizal, juncuales o lago); (2) evaluar su probabilidad de observación mediante una escala ordinal; (3) categorizar su estacionalidad; y (4) detallar su estatus de conservación a nivel global y nacional. Para definir el ambiente principal, evaluamos los registros propios considerando los sitios específicos de observación dentro de la reserva. Complementamos esta información con la revisión manual de las fichas de cada taxón en la plataforma Birds of the World (<https://birdsoftheworld.org/>), asignando a cada especie uno o más ambientes en función de sus requerimientos de hábitat conocidos.

Estimamos la probabilidad de observación utilizando una escala ordinal cualitativa basada en la frecuencia general de detección de la especie, a partir de la integración de todas las fuentes de información. Asignamos la categoría I (escasa) a las especies con registros esporádicos o accidentales (una o dos observaciones en total); la categoría II (frecuente) a aquellas registradas de manera regular pero no constante; y la categoría III (abundante) a las especies que fueron detectadas de forma sostenida en la gran mayoría de los relevamientos y listas analizadas, siendo habituales en sus respectivos ambientes.

En cuanto a la estacionalidad, y debido a que las aves migratorias, especialmente en América del Sur, presentan comportamientos diversos, plásticos y complejos (Jahn et al. 2006), incluimos esta clasificación sólo para orientar al lector sobre la época del año con mayor probabilidad de observación para cada especie dentro de la reserva. Agrupamos a las especies

como residentes (R; presentes en cualquier estación, independientemente de si nidifican o no dentro de los límites de la reserva), visitantes estivales (VE) y visitantes invernales (VI). Realizamos esta clasificación teniendo en cuenta lo mencionado en Morici (2016), Narosky & González Táboas (2021) e Ibáñez et al. (2022), y mediante el análisis detallado de las frecuencias de observación mes a mes en eBird (2026). Esto último nos permitió rastrear los movimientos y la dinámica temporal de cada especie a lo largo del año dentro del área de estudio. Cuando la especie lo permitió, empleamos además la herramienta interactiva *ShorebirdViz* de eBird (2026) para evaluar los movimientos continuos a lo largo del año.

Por último, el estatus de conservación de cada especie se obtuvo a partir de la categorización mundial de Lista Roja de la IUCN (2025) y la categorización nacional de Aves Argentinas vigente (MAyDS & AA 2017).

Los análisis descriptivos y los gráficos se generaron con R (R Core Team 2025), utilizando los paquetes *dplyr* (Wickham et al. 2023), *tidyr* (Wickham et al. 2024) y *ggplot2* (Wickham 2016).

RESULTADOS

A partir de los registros propios, la bibliografía consultada y los datos de ciencia ciudadana, documentamos un total de 234 especies de aves, distribuidas en 50 familias taxonómicas (Tabla 1). De estas, el 68,8% (161 especies) corresponden a registros propios, el 23,5% (55 especies) a la bibliografía del ANP Dique Ing. Roggero (Morici 2016; Ibáñez et al. 2022), y el 7,7% (18 especies) fueron detectadas exclusivamente a través de eBird (2026), sin registros propios ni bibliográficos previos, gracias al aporte de la ciencia ciudadana. Si bien es poco probable por lo expuesto anteriormente sobre la continuidad de los ambientes, existe la posibilidad de que alguna de las especies obtenidas de Morici (2016) e Ibáñez et al. (2022) estén presentes solo en el ANP Dique Ing. Roggero. Las familias con mayor riqueza específica dentro de la reserva fueron Tyrannidae con 31 especies, seguida por Furnariidae (19 especies) y Anatidae (17), agrupando entre las tres el 28,6% del total de especies registradas. Otras familias con alta representatividad fueron Thraupidae (15), Scolopacidae (11), Hirundinidae (11) e Icteridae (11).

Tabla 1. Lista sistemática de las especies de aves registradas en la Reserva Natural de General Rodríguez y alrededores. Las familias taxonómicas se indican en negrita. Para cada especie se detalla: HAB (Uso de hábitat: A = Arboleda, P = Pastizal, J = Juncales, L = Lago San Francisco); POB (Probabilidad de observación: I = escasa o rara, II = frecuente, III = abundante); EST (Estacionalidad: R = residente, VE = visitante estival, VI = visitante invernal); y Estatus de conservación a nivel global (IUCN 2025) / nacional (MAYDS & AA 2017). Las categorías globales son LC (Preocupación Menor / Least Concern), NT (Casi Amenazada / Near Threatened) y VU (Vulnerable); las categorías nacionales son NA (No Amenazada), VU (Vulnerable) y AM (Amenazada). El símbolo (“--”) indica que la especie no se encuentra categorizada a nivel nacional. Las especies exóticas se indican con doble asterisco (**). Las especies naturalizadas (poblaciones originarias de otras regiones que se han establecido y reproducen de forma silvestre en el área) se marcan con un asterisco (*). Los superíndices indican la fuente de donde se tomó el registro, siendo ¹registros propios, ²Morici (2016) e Ibáñez et al. (2022) y ³eBird (2026).

Table 1. Systematic list of bird species recorded in the General Rodríguez Nature Reserve and surroundings. Taxonomic families are indicated in bold. For each species, the following is detailed: HAB (Habitat use: A = Woodland, P = Grassland, J = Reedbeds, L = Lake San Francisco); POB (Probability of observation: I = scarce or rare, II = frequent, III = abundant); EST (Seasonality: R = resident, VE = summer visitor, VI = winter visitor); and global (IUCN 2025) / national (MAYDS & AA 2017) conservation status. Global categories are LC (Least Concern), NT (Near Threatened), and VU (Vulnerable); national categories are NA (Not Threatened), VU (Vulnerable), and AM (Threatened). The symbol (“--”) indicates that the species is not categorized at the national level. Exotic species are indicated with a double asterisk (*). Naturalized species (populations originating from other regions that have established and breed in the wild in the area) are marked with a single asterisk (*). Superscripts indicate the source of the record, being ¹authors’ records, ²Morici (2016) and Ibáñez et al. (2022), and ³eBird (2026).

Nombre común	Nombre científico	HAB	POB	EST	Estatus (IUCN/ MAYDS & AA)
Familia Tinamidae (Inambúes)					
Inambú Campestre ¹	<i>Nothura maculosa</i>	P	II	R	LC/NA
Familia Anhimidae (Chajáes)					
Chajá ¹	<i>Chauna torquata</i>	P/L	II	R	LC/NA
Familia Anatidae (Patos y Cisnes)					
Sirirí Pampa ¹	<i>Dendrocygna viduata</i>	L	II	R	LC/NA
Sirirí Colorado ²	<i>Dendrocygna bicolor</i>	L	II	R	LC/NA
Cisne Cuello Negro ¹	<i>Cygnus melancoryphus</i>	L	II	R	LC/NA
Coscoroba ¹	<i>Coscoroba coscoroba</i>	L	III	R	LC/NA
Pato de Collar ¹	<i>Callonetta leucophrys</i>	L	II	R	LC/NA
Pato Cutirí ¹	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	L	II	R	LC/NA
Pato Capuchino ¹	<i>Spatula versicolor</i>	L	II	R	LC/NA
Pato Colorado ¹	<i>Spatula cyanoptera</i>	L	II	R	LC/NA
Pato Cuchara ¹	<i>Spatula platalea</i>	L	II	R	LC/NA
Pato Overo ²	<i>Mareca sibilatrix</i>	L	II	R	LC/NA
Pato Gargantilla ²	<i>Anas bahamensis</i>	L	II	R	LC/NA
Pato Maicero ¹	<i>Anas georgica</i>	L	III	R	LC/NA
Pato Barcino ¹	<i>Anas flavirostris</i>	L	III	R	LC/NA
Pato Picazo ¹	<i>Netta peposaca</i>	L	II	R	LC/NA
Pato Cabeza Negra ¹	<i>Heteronetta atricapilla</i>	L	I	R	LC/NA
Pato Fierro ¹	<i>Nomonyx dominicus</i>	L	I	R	LC/NA
Pato Zambullidor Chico ¹	<i>Oxyura vittata</i>	L	II	R	LC/NA
Familia Cracidae (Pavas de Monte)					
Pava de Monte Ribereña ²	<i>Penelope obscura</i>	A	I	R	LC/VU
Familia Columbidae (Palomas)					
Paloma Casera ^{**1}	<i>Columba livia</i>	A	II	R	LC/--
Paloma Picazuró ¹	<i>Patagioenas picazuro</i>	A/P	III	R	LC/NA
Paloma Ala Manchada ¹	<i>Patagioenas maculosa</i>	A/P	III	R	LC/NA
Torcacita Picuí ¹	<i>Columbina picui</i>	A/P	III	R	LC/NA
Yerutí Gris ¹	<i>Leptotila verreauxi</i>	A	II	R	LC/NA
Torcaza ¹	<i>Zenaida auriculata</i>	A/P	III	R	LC/NA
Familia Cuculidae (Cuculillos y Pirinchos)					

Nombre común	Nombre científico	HAB	POB	EST	Estatus (IUCN/ MAyDS & AA)
Pirincho ¹	<i>Guira guira</i>	A	III	R	LC/NA
Cuculillo Canela ²	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	A	I	VE	LC/NA
Familia Caprimulgidae (Atajacaminos)					
Ñacundá ²	<i>Chordeiles nacunda</i>	P	I	R	LC/NA
Atajacaminos Chico ²	<i>Setopagis parvula</i>	P	I	R	LC/NA
Atajacaminos Tijera ³	<i>Hydropsalis torquata</i>	P	I	R	LC/NA
Familia Trochilidae (Picaflores)					
Picaflor Verde ¹	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	A	III	R	LC/NA
Picaflor Garganta Blanca ¹	<i>Leucochloris albicollis</i>	A	II	R	LC/NA
Picaflor Bronceado ¹	<i>Hylocharis chrysura</i>	A	II	R	LC/NA
Familia Rallidae (Gallinetas, Pollonas y Gallaretas)					
Gallineta Overa ²	<i>Pardirallus maculatus</i>	J	I	R	LC/NA
Gallineta Pico Pintado ¹	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	J	II	R	LC/NA
Ipacaá ²	<i>Aramides ypecaha</i>	J	I	R	LC/NA
Chiricote ¹	<i>Aramides cajaneus</i>	A/J	I	R	LC/NA
Pollona Pintada ¹	<i>Porphyriops melanops</i>	J/L	II	R	LC/NA
Pollona Negra ¹	<i>Gallinula galeata</i>	J/L	II	R	LC/NA
Gallareta Escudete Rojo ¹	<i>Fulica rufifrons</i>	J/L	II	R	LC/NA
Gallareta Ligas Rojas ¹	<i>Fulica armillata</i>	J/L	II	R	LC/NA
Gallareta Chica ¹	<i>Fulica leucoptera</i>	J/L	III	R	LC/NA
Familia Aramidae (Caraus)					
Carau ¹	<i>Aramus guarauna</i>	J	III	R	LC/NA
Familia Recurvirostridae (Teros Reales)					
Tero Real ¹	<i>Himantopus mexicanus</i>	L	III	R	LC/NA
Familia Charadriidae (Chorlos)					
Chorlo Pampa ²	<i>Pluvialis dominica</i>	L	I	VE	LC/NA
Chorlo Cabezón ²	<i>Oreopholus ruficollis</i>	P/L	I	VI	LC/NA
Tero ¹	<i>Vanellus chilensis</i>	P	III	R	LC/NA
Chorlito de Collar ³	<i>Anarhynchus collaris</i>	L	I	R	LC/NA
Chorlito Doble Collar ²	<i>Anarhynchus falklandicus</i>	L	I	VI	LC/NA
Familia Rostratulidae (Aguateros)					
Aguatero ¹	<i>Nycticryphes semicollaris</i>	J	I	R	NT/NA
Familia Jacanidae (Jacanas)					
Jacana ¹	<i>Jacana jacana</i>	J/L	III	R	LC/NA
Familia Scolopacidae (Playeritos y afines)					
Becasa de Mar ²	<i>Limosa haemastica</i>	J/L	I	R	VU/NA
Becasina de Bañado ¹	<i>Gallinago paraguaiae</i>	J/L	I	R	LC/NA
Falaropo Común ³	<i>Phalaropus tricolor</i>	L	I	VE	LC/NA
Pitotoy Solitario ²	<i>Tringa solitaria</i>	L	I	VE	LC/NA
Pitotoy Chico ¹	<i>Tringa flavipes</i>	L	II	VE	VU/NA
Pitotoy Grande ¹	<i>Tringa melanoleuca</i>	L	II	VE	NT/NA
Playero Picudo ³	<i>Calidris himantopus</i>	L	I	VE	NT/NA

Aceptado para publicación

Nombre común	Nombre científico	HAB	POB	EST	Estatus (IUCN/ MAyDS & AA)
Playerito Unicolor ²	<i>Calidris bairdii</i>	L	I	VE	LC/NA
Playerito Rabadilla Blanca ²	<i>Calidris fuscicollis</i>	L	I	VE	VU/NA
Playerito Canela ²	<i>Calidris subruficollis</i>	L	I	VE	VU/AM
Playerito Pectoral ¹	<i>Calidris melanotos</i>	L	I	VE	LC/NA
Familia Laridae (Gaviotas y Rayadores)					
Gaviota Capucho Café ¹	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	L	III	R	LC/NA
Gaviota Capucho Gris ¹	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	L	II	R	LC/NA
Gaviota Cocinera ¹	<i>Larus dominicanus</i>	L	II	R	LC/NA
Rayador ¹	<i>Rynchops niger</i>	L	I	R	LC/NA
Gaviotín Lagunero ¹	<i>Sterna trudeaui</i>	L	I	R	LC/NA
Familia Phoenicopteridae (Flamencos)					
Flamenco Austral ²	<i>Phoenicopus chilensis</i>	L	I	R	NT/VU
Familia Podicipedidae (Macáes)					
Macá Cara Blanca ¹	<i>Rollandia rolland</i>	L	III	R	LC/NA
Macá Pico Grueso ¹	<i>Podilymbus podiceps</i>	L	II	R	LC/NA
Macá Grande ¹	<i>Podiceps major</i>	L	III	R	LC/NA
Familia Ciconiidae (Cigüeñas)					
Cigüeña Americana ¹	<i>Ciconia maguari</i>	J/L	III	R	LC/NA
Tuyuyú ²	<i>Mycteria americana</i>	J/L	I	R	LC/NA
Familia Anhingidae (Aningas)					
Aninga ¹	<i>Anhinga anhinga</i>	L	I	R	LC/NA
Familia Phalacrocoracidae (Cormoranes)					
Biguá ¹	<i>Nannopterum brasilianum</i>	L	III	R	LC/NA
Familia Threskiornithidae (Cuervillos y Espátulas)					
Cuervillo de Cañada ¹	<i>Plegadis chihi</i>	P/J	III	R	LC/NA
Cuervillo Cara Pelada ¹	<i>Phimosus infuscatus</i>	P/J	III	R	LC/NA
Espátula Rosada ¹	<i>Platalea ajaja</i>	J/L	III	R	LC/NA
Familia Ardeidae (Garzas)					
Mirasol Estriado ²	<i>Botaurus involueris</i>	J	I	R	LC/NA
Hocó Colorado ¹	<i>Tigrisoma lineatum</i>	J	I	R	LC/NA
Garza Bruja ¹	<i>Nycticorax nycticorax</i>	J	II	R	LC/NA
Chiflón ¹	<i>Syrigma sibilatrix</i>	P	III	R	LC/NA
Garcita Blanca ¹	<i>Egretta thula</i>	J/L	III	R	LC/NA
Garcita Azulada ¹	<i>Butorides striata</i>	J	II	R	LC/NA
Garcita Bueyera ¹	<i>Ardea ibis</i>	P	II	R	LC/NA
Garza Blanca ¹	<i>Ardea alba</i>	J/L	III	R	LC/NA
Garza Mora ¹	<i>Ardea cocoi</i>	J/L	III	R	LC/NA
Familia Accipitridae (Gavilanes y Milanos)					
Milano Blanco ¹	<i>Elanus leucurus</i>	P	II	R	LC/NA
Gavilán Planeador ²	<i>Circus buffoni</i>	P	I	VE	LC/VU
Gavilán Ceniciento ²	<i>Circus cinereus</i>	P/J	I	R	LC/NA
Caracolero ¹	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	J	II	R	LC/NA

Aceptado para publicación

Nombre común	Nombre científico	HAB	POB	EST	Estatus (IUCN/ MAyDS & AA)
Taguató ¹	<i>Rupornis magnirostris</i>	A	III	R	LC/NA
Esparvero Estriado ³	<i>Accipiter striatus</i>	A	I	R	LC/NA
Gavilán Mixto ¹	<i>Parabuteo unicinctus</i>	A	II	R	LC/NA
Águila Mora ³	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	P	I	R	LC/NA
Familia Tytonidae (Lechuzas)					
Lechuza de Campanario ¹	<i>Tyto furcata</i>	A	II	R	LC/NA
Familia Strigidae (Búhos)					
Alilicucú Común ¹	<i>Megascops choliba</i>	A	II	R	LC/NA
Caburé Chico ²	<i>Glaucidium brasilianum</i>	A	I	R	LC/NA
Lechucita de las Vizcacheras ¹	<i>Athene cunicularia</i>	P	III	R	LC/NA
Lechuzón Orejudo ¹	<i>Asio clamator</i>	A	I	R	LC/NA
Lechuzón de Campo ²	<i>Asio flammeus</i>	P	I	R	LC/VU
Familia Alcedinidae (Martín Pescadores)					
Martín Pescador Grande ¹	<i>Megaceryle torquata</i>	J/L	II	R	LC/NA
Martín Pescador Mediano ¹	<i>Chloroceryle amazona</i>	J/L	I	R	LC/NA
Martín Pescador Chico ¹	<i>Chloroceryle americana</i>	J/L	II	R	LC/NA
Familia Picidae (Carpinteros)					
Carpinterito Barrado ³	<i>Picumnus cirratus</i>	A	I	R	LC/NA
Carpintero Blanco ²	<i>Melanerpes candidus</i>	A	I	R	LC/NA
Carpinterito Bataraz Chico ¹	<i>Veniliornis mixtus</i>	A	II	R	LC/NA
Carpintero Real ¹	<i>Colaptes melanochloros</i>	A	III	R	LC/NA
Carpintero Campestre ¹	<i>Colaptes campestris</i>	P	III	R	LC/NA
Familia Falconidae (Halcones)					
Carancho ¹	<i>Caracara plancus</i>	A/P	III	R	LC/NA
Chimango ¹	<i>Daptrius chimango</i>	A/P	III	R	LC/NA
Halconcito Colorado ¹	<i>Falco sparverius</i>	A/P	III	R	LC/NA
Halcón Plomizo ¹	<i>Falco femoralis</i>	A/P	I	R	LC/NA
Halcón Peregrino ¹	<i>Falco peregrinus</i>	A/P	I	VE	LC/NA
Familia Psittacidae (Loros)					
Cotorra ¹	<i>Myiopsitta monachus</i>	A	III	R	LC/NA
Catita Chirirí ^{*2}	<i>Brotogeris chiriri</i>	A	I	R	LC/VU
Loro Hablador ^{*2}	<i>Amazona aestiva</i>	A	I	R	LC/AM
Loro Barranquero ^{*2}	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	A	I	VE	LC/AM
Ñanday ^{*3}	<i>Aratinga nenday</i>	A	I	R	LC/AM
Calancate Cabeza Azul ^{*2}	<i>Thectocercus acuticaudatus</i>	A	I	R	LC/NA
Calancate Ala Roja ^{*2}	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	A	I	R	NT/NA
Familia Tamnophilidae (Chocas)					
Choca Corona Negruzca ³	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	A	I	R	LC/NA
Familia Furnariidae (Horneros, Espineros y Chincheros)					
Caminera Estriada ²	<i>Geositta cunicularia</i>	P/L	I	R	LC/NA
Chinchero Chico ¹	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	A	III	R	LC/NA
Hornero ¹	<i>Furnarius rufus</i>	A/P	III	R	LC/NA

Aceptado para publicación

Nombre común	Nombre científico	HAB	POB	EST	Estatus (IUCN/ MAyDS & AA)
Junquero ¹	<i>Phleocryptes melanops</i>	J	II	R	LC/NA
Bandurrita Esteparia ³	<i>Upucerthia dumetaria</i>	P	I	VI	LC/NA
Remolinera Parda ¹	<i>Cinclodes fuscus</i>	L	II	VI	LC/NA
Coludito Copetón ²	<i>Leptasthenura platensis</i>	A/P	I	R	LC/NA
Espinero Chico ²	<i>Phacellodomus sibilatrix</i>	A/P	I	R	LC/NA
Espinero Pecho Manchado ¹	<i>Phacellodomus striaticollis</i>	P	III	R	LC/NA
Leñatero ¹	<i>Anumbius annumbi</i>	P	I	R	LC/NA
Espartillero Enano ²	<i>Spartonoica maluroides</i>	P	I	R	LC/VU
Canastero Chaqueño ²	<i>Asthenes baeri</i>	A/P	I	R	LC/NA
Espartillero Pampeano ²	<i>Asthenes hudsoni</i>	P/J	I	R	VU/AM
Canastero Coludo ²	<i>Asthenes pyrrholeuca</i>	P	I	VI	LC/NA
Curutié Colorado ³	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	J	I	R	LC/NA
Chotoy ¹	<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	P	II	R	LC/NA
Pijuí Plomizo ¹	<i>Synallaxis spixi</i>	A/P	I	R	LC/NA
Pijuí Cola Parda ²	<i>Synallaxis albescens</i>	A/P	I	R	LC/NA
Pijuí Frente Gris ¹	<i>Synallaxis frontalis</i>	A/P	II	R	LC/NA
Familia Cotingidae (Cortarramas)					
Cortarramas ¹	<i>Phytotoma rutila</i>	A/P	I	VI	LC/NA
Familia Tityridae (Anambés)					
Anambé Negro ¹	<i>Pachyrhamphus polychopterus</i>	A	II	VE	LC/NA
Familia Tyrannidae (Benteveos y afines)					
Tachurí Sietecolores ¹	<i>Tachuris rubrigastra</i>	J	II	R	LC/NA
Mosqueta Carasucia ¹	<i>Phylloscartes ventralis</i>	A	I	R	LC/NA
Piojito Silbón ¹	<i>Camptostoma obsoletum</i>	A	I	R	LC/NA
Suirirí Gris ¹	<i>Suiriri suiriri</i>	A	I	R	LC/NA
Cachudito Pico Amarillo ²	<i>Anairetes flavirostris</i>	A/P	I	VI	LC/NA
Cachudito Pico Negro ²	<i>Anairetes parulus</i>	A/P	I	VI	LC/NA
Doradito Copetón ²	<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	J	I	R	LC/NA
Doradito Pampeano ²	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	J	I	R	LC/NA
Fiofío Pico Corto ¹	<i>Elaenia parvirostris</i>	A	II	R	LC/NA
Piojito Gris ¹	<i>Serpophaga nigricans</i>	J	II	R	LC/NA
Piojito Tiquitiquí ¹	<i>Serpophaga subcristata</i>	A	II	R	LC/NA
Piojito Trinador ³	<i>Serpophaga griseicapilla</i>	A	I	VI	LC/NA
Barullero ²	<i>Euscarthmus meloryphus</i>	A/P	I	R	LC/NA
Mosqueta Estriada ¹	<i>Myiophobus fasciatus</i>	A	II	R	LC/NA
Mosqueta Parda ¹	<i>Lathrotriccus eulerei</i>	A	I	VE	LC/NA
Churrinche ²	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	A/P	I	VE	LC/NA
Sobrepuesto Austral ²	<i>Lessonia rufa</i>	P/L	I	VI	LC/NA
Pico de Plata ¹	<i>Hymenops perspicillatus</i>	P/J	II	R	LC/NA
Suirirí Amarillo ²	<i>Satrapa icterophrys</i>	P/J	I	R	LC/NA
Dormilona Cara Negra ³	<i>Muscisaxicola maclovianus</i>	P	I	VI	LC/NA
Monjita Blanca ¹	<i>Xolmis irupero</i>	A/P	II	R	LC/NA

Aceptado para publicación

Nombre común	Nombre científico	HAB	POB	EST	Estatus (IUCN/ MAyDS & AA)
Monjita Cenicienta ²	<i>Negetus cinereus</i>	A/P	I	R	LC/NA
Monjita Coronada ¹	<i>Neoxolmis coronatus</i>	A/P	I	VI	LC/NA
Gaucho Pardo ²	<i>Agriornis micropterus</i>	P	I	VI	LC/NA
Viudita Blanca ¹	<i>Fluvicola albiventer</i>	L	I	VE	LC/NA
Burlisto Pico Canela ¹	<i>Myiarchus swainsoni</i>	A	I	VE	LC/NA
Picabuey ¹	<i>Machetornis rixosa</i>	P	II	R	LC/NA
Benteveo ¹	<i>Pitangus sulphuratus</i>	A/P/J/L	III	R	LC/NA
Benteveo Rayado ¹	<i>Myiodynastes maculatus</i>	A	II	VE	LC/NA
Suirirí Real ¹	<i>Tyrannus melancholicus</i>	A/P	II	VE	LC/NA
Tijereta ¹	<i>Tyrannus savana</i>	A/P	II	VE	LC/NA
Familia Vireonidae (Juan Chiviros y Chivies)					
Juan Chiviro ³	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	A	I	R	LC/NA
Chiví-chiví ¹	<i>Vireo chivi</i>	A	II	VE	LC/NA
Familia Hirundinidae (Golondrinas)					
Golondrina Zapadora ²	<i>Riparia riparia</i>	A/P/J/L	I	VE	LC/NA
Golondrina Ceja Blanca ¹	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	A/P/L	III	VE	LC/NA
Golondrina Patagónica ¹	<i>Tachycineta leucopyga</i>	A/P/L	II	VI	LC/NA
Golondrina Doméstica ¹	<i>Progne chalybea</i>	A/P/L	II	VE	LC/NA
Golondrina Negra ²	<i>Progne elegans</i>	A/P	I	VE	LC/NA
Golondrina Parda ¹	<i>Progne tapera</i>	A/P/L	III	VE	LC/NA
Golondrina Ribereña ¹	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	A/P/L	II	VE	LC/NA
Golondrina Barranquera ¹	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	A/P/L	I	VE	LC/NA
Golondrina Cabeza Canela ¹	<i>Alopchelidon fucata</i>	A/P/L	II	R	LC/NA
Golondrina Tijerita ¹	<i>Hirundo rustica</i>	A/P/J/L	II	VE	LC/NA
Golondrina Rabadilla Canela ²	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	P/L	I	VE	LC/NA
Familia Polioptilidae (Tacuaritas)					
Tacuarita Azul ¹	<i>Polioptila dumicola</i>	A/P	III	R	LC/NA
Familia Troglodytidae (Ratonas)					
Ratona ¹	<i>Troglodytes musculus</i>	A/P	III	R	LC/NA
Familia Sturnidae (Estorninos)					
Estornino Pinto ^{**1}	<i>Sturnus vulgaris</i>	A/P	III	R	LC/--
Familia Mimidae (Calandrias)					
Calandria Grande ¹	<i>Mimus saturninus</i>	A/P	III	R	LC/NA
Calandria Real ¹	<i>Mimus triurus</i>	A/P	II	VI	LC/NA
Familia Turdidae (Zorzales)					
Zorzal Chalchalero ¹	<i>Turdus amaurochalinus</i>	A/P	III	R	LC/NA
Zorzal Colorado ¹	<i>Turdus rufiventris</i>	A/P	III	R	LC/NA
Familia Passeridae (Gorriones)					
Gorrion ^{**1}	<i>Passer domesticus</i>	A	II	R	LC/--
Familia Motacillidae (Cachirlas)					
Cachirla Chica ¹	<i>Anthus chii</i>	P	I	R	LC/NA
Cachirla Uña Corta ²	<i>Anthus furcatus</i>	P	I	R	LC/NA

Aceptado para publicación

Nombre común	Nombre científico	HAB	POB	EST	Estatus (IUCN/ MAyDS & AA)
Cachirla Goteada ²	<i>Anthus correndera</i>	P	I	R	LC/NA
Cachirla Pálida ³	<i>Anthus hellmayri</i>	P	I	R	LC/NA
Familia Fringillidae (Cabecitanegras)					
Cabecitanegra ¹	<i>Spinus magellanicus</i>	A/P	III	R	LC/NA
Familia Passerellidae (Chingolos)					
Cachilo Ceja Amarilla ¹	<i>Ammodramus humeralis</i>	P	II	R	LC/NA
Chingolo ¹	<i>Zonotrichia capensis</i>	A/P	III	R	LC/NA
Familia Icteridae (Tordos y Varilleros)					
Pecho Colorado ¹	<i>Leistes superciliaris</i>	P/J	II	R	LC/NA
Boyero Negro ³	<i>Cacicus solitarius</i>	A	I	R	LC/NA
Boyerito ¹	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	A	II	R	LC/NA
Tordo Pico Corto ¹	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	A/P	II	R	LC/NA
Tordo Renegrido ¹	<i>Molothrus bonariensis</i>	A/P	III	R	LC/NA
Federal ¹	<i>Amblyramphus holosericeus</i>	P/J	I	R	LC/VU
Tordo Músico ¹	<i>Agelaioides badius</i>	A/P	III	R	LC/NA
Varillero Negro ¹	<i>Agelasticus cyanopus</i>	P/J	II	R	LC/NA
Varillero Ala Amarilla ¹	<i>Agelasticus thilius</i>	P/J	II	R	LC/NA
Varillero Congo ¹	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	P/J	II	R	LC/NA
Pecho Amarillo ¹	<i>Pseudoleistes virescens</i>	P/J	II	R	LC/NA
Familia Parulidae (Arañeros)					
Arañero Cara Negra ¹	<i>Geothlypis velata</i>	A/J	II	VE	LC/NA
Pitiayumi ¹	<i>Setophaga pitiayumi</i>	A	II	R	LC/NA
Arañero Coronado Chico ¹	<i>Basileuterus culicivorus</i>	A	II	R	LC/NA
Familia Cardinalidae (Fuegueros y Reinamoras)					
Fueguero ¹	<i>Piranga flava</i>	A	II	R	LC/NA
Reinamora Grande ¹	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	A/P	I	R	LC/NA
Familia Thraupidae (Cardenales, Jilgueros y afines)					
Cardenal Copete Rojo ¹	<i>Paroaria coronata</i>	A/P	II	R	LC/NA
Cardenilla ¹	<i>Paroaria capitata</i>	A/J	II	R	LC/NA
Monterita Cabeza Negra ¹	<i>Microspingus melanoleucus</i>	A	II	R	LC/NA
Naranjero ¹	<i>Rauenia bonariensis</i>	A	I	R	LC/NA
Celestino ²	<i>Thraupis sayaca</i>	A	II	R	LC/NA
Cachilo Canela ²	<i>Donacospiza albifrons</i>	P/J	I	R	LC/NA
Sietevestidos Pampeano ¹	<i>Poospiza nigrorufa</i>	P/J	I	R	LC/NA
Jilguero Dorado ¹	<i>Sicalis flaveola</i>	A/P	III	R	LC/NA
Misto ¹	<i>Sicalis luteola</i>	P	II	R	LC/NA
Verdón ¹	<i>Embernagra platensis</i>	P	II	R	LC/NA
Volatinero ¹	<i>Volatinia jacarina</i>	A/P	I	R	LC/NA
Corbatita ¹	<i>Sporophila caerulescens</i>	A/P	II	VE	LC/NA
Pepitero Gris ¹	<i>Saltator coerulescens</i>	A/P	I	R	LC/NA
Pepitero Verdoso ³	<i>Saltator similis</i>	A	I	R	LC/NA
Pepitero de Collar ³	<i>Saltator aurantirostris</i>	A/P	I	R	LC/NA

Aceptado para publicación

Estacionalidad

Al analizar la estacionalidad (Fig. 4), observamos una marcada dominancia de especies con estatus de residencia permanente (n=185; 79,1%), las cuales representan la base de la comunidad ornitológica local. Los movimientos estacionales se ven reflejados en la presencia de visitantes estivales (n=34; 14,5%), que arriban principalmente para la temporada reproductiva, mientras que los visitantes invernales (n=15; 6,4%) constituyen una menor proporción.

Uso de hábitat

El análisis de la distribución por ambiente indica que la arboleda (n=110 especies) y el pastizal (n=104 especies) sostienen la mayor diversidad específica (Fig. 5). Los ambientes vinculados a los arroyos y al Lago San Francisco también presentan una riqueza considerable, con 53 especies habitando los juncales (e.g., el Junquero, *Phleocryptes melanops*) y 75 habitando el lago (e.g., el Macá Cara Blanca, *Rollandia rolland*). Cabe destacar que casi la mitad de las aves registradas (48,7%) muestran plasticidad, desplazándose y utilizando más de un estrato o ambiente dentro del área protegida, como es el caso del Chimango (*Daptrius chimango*) o el Pico de Plata (*Hymenops perspicillatus*).

Cantidad de especies en función de su probabilidad de observación

En términos de probabilidad de observación, el grupo más numeroso corresponde a especies cate-

gorizadas como raras o de difícil observación (n=101; 43,2%). El resto de la comunidad la conforman las especies frecuentes (n=82; 35%) y las abundantes (n=51; 21,8%). La alta proporción de especies con baja detectabilidad incluye tanto taxones con requerimientos de hábitat muy específicos (e.g., el Lechuzón de Campo, *Asio flammeus*) como aquellos que presentan densidades poblacionales naturalmente bajas en la región (e.g. el Playerito Canela, *Calidris subruficollis*).

Estatus de conservación

La mayoría de los taxones se encuentran en la categoría de Preocupación Menor (n=224) según la categorización global de la IUCN, y como No Amenazadas (n=219) a nivel nacional (MAyDS & AA 2017). No obstante, es importante destacar el registro de especies con compromiso de conservación. A nivel global, registramos cinco especies categorizadas como “Vulnerables”: la Becasa de Mar (*Limosa haemastica*), el Pitotoy Chico (*Tringa flavipes*), el Playerito Rabadilla Blanca (*Calidris fuscicollis*), el Playerito Canela (*Calidris subruficollis*) y el Espartillero Pampeano (*Asthenes hudsoni*); y cinco “Casi Amenazadas”: el Aguatero (*Nycticryphes semicollaris*), el Pitotoy Grande (*Tringa melanoleuca*), el Playero Picudo (*Calidris himantopus*), el Flamenco Austral (*Phoenicopterus chilensis*) y el Calancate Ala Roja (*Psittacara leucophthalmus*). A nivel nacional, detectamos siete taxones en categoría “Vulnerable”: la Pava de Monte Ribereña (*Penelope obscura*), el Flamenco Austral (*Phoenicopterus chilensis*), el Gavilán Planeador (*Circus buffoni*), el Lechuzón de Campo (*Asio*




Figura 4. Distribución porcentual de las especies registradas en la reserva según su estatus de estacionalidad. Las categorías se definen como: Residentes (R), Visitantes Estivales (VE) y Visitantes Invernales (VI).

Figure 4. Percentage distribution of the species recorded in the reserve according to their seasonality status. The categories are defined as: Residents (R), Summer Visitors (VE), and Winter Visitors (VI).




Figura 5. Cantidad de especies según el uso de hábitat dentro de la reserva.

Figure 5. Number of species according to habitat use within the reserve.

flammeus), la Catita Chirirí (*Brotozeris chirirí*), el Espartillero Enano (*Spartonoica maluroides*) y el Federal (*Amblyramphus holosericeus*); y cinco catalogados como “Amenazados”: el Playerito Canela (*Calidris subruficollis*), el Loro Hablador (*Amazona aestiva*), el Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*), el Ñanday (*Aratinga nenday*) y el Espartillero Pampeano (*Asthenes hudsoni*). La presencia de estas especies resalta la importancia de la reserva como refugio para la biodiversidad en un entorno de creciente presión antrópica.

DISCUSIÓN

En este trabajo reportamos el primer inventario ornitológico actualizado de la Reserva Natural de General Rodríguez, con un total de 234 especies presentes en el área, pertenecientes a 50 familias taxonómicas distintas. Este número equivale aproximadamente al 56,1% de todas las especies registradas en la provincia de Buenos Aires (Narosky & González Táboas 2021).

Es esperable que se encuentre una gran diversidad de especies en la zona (Fig. 6) debido a la heterogeneidad ambiental que presenta la reserva (COMIREC 2022). Su riqueza florística y estructural resulta determinante para la avifauna local, brindando una amplia variedad de microhábitats y recursos tróficos. La combinación de estratos arbóreos con pastizales y ambientes acuáticos provee el hábitat ideal para un gran número de familias de aves con distintas características.

La Reserva Natural de General Rodríguez es históricamente un área con escasos relevamientos ornitológicos. Incluso en el Partido de General Rodríguez los registros formales son limitados, contando con prácticamente un solo antecedente en la bibliografía (Barreña 2011). Dado que dicho trabajo abarca un área más amplia y no es exclusivo de la reserva, no se incluyó en la bibliografía base utilizada para generar la lista, evitando así sobreestimar la riqueza local con especies que podrían no estar presentes en el área de estudio. No obstante, la integración de la literatura reciente (Morici 2016; Ibáñez et al. 2022) y de los registros provenientes de la ciencia ciudadana (eBird 2026) permitió incrementar significativamente la cantidad de datos y lograr una mayor completitud a nivel regional.

Los últimos avances en cuanto a políticas de conservación impulsados sobre el ANP Dique Ing. Rogge-

ro y actualmente sobre la Reserva Natural de General Rodríguez (como el proyecto de reforestación con flora nativa, el control gradual de especies exóticas invasoras y la remoción de ganado; COMIREC 2022) son de suma importancia para lograr una conservación de los ambientes nativos. Si bien los parches exóticos actuales brindan estructura para muchas especies, la transición hacia ambientes nativos favorecería a largo plazo una comunidad ornitológica más representativa de la ecorregión pampeana (Munro et al. 2007; Benayas et al. 2009).

La importancia biológica de los talaes reside principalmente en que generan un contraste boscoso con respecto a la llanura de los pastizales pampeanos, brindando heterogeneidad al ambiente (Arturi 2006). En particular, los talaes brindan el soporte estructural necesario para la construcción de los nidos y, al mismo tiempo, albergan una gran comunidad de invertebrados que son fuente de alimento durante la etapa de cría de pichones (Jauregui et al. 2023). Estudios previos sugieren que ciertas aves, como el Cardenal Copete Rojo (*Paroaria coronata*), prefieren al Tala como sitio de nidificación por sobre otros árboles exóticos (Marateo et al. 2009). En la reserva, se localizan varios ejemplares de Tala, relictos de los bosques originales de la zona (COMIREC 2022), cuyo marcado retroceso en la provincia de Buenos Aires es atribuido al fuerte incremento de la presión antrópica (Athor et al. 2006). A estas perturbaciones se suma el impacto del ganado vacuno y equino, cuya presencia produce una severa alteración del suelo por pisoteo y compactación, degradando aún más estos ambientes (López 2020). Esta misma presión antrópica que amenaza los talaes, agrava también otras amenazas para las poblaciones silvestres, como la caza furtiva, una problemática común en las áreas protegidas bonaerenses (e.g., Roesler et al. 2012).

El valor de conservación de la reserva, considerando su área de influencia y la conectividad con el ANP Dique Ing. Roggero, queda en evidencia al constatar que alberga 12 especies con algún grado de amenaza a nivel nacional (y 10 a nivel global). Especies como el Espartillero Pampeano (*Asthenes hudsoni*), altamente dependiente de parches de pastizal en buen estado de conservación, o el Playerito Canela (*Calidris subruficollis*), un migrante neártico que utiliza las riberas y humedales como parada en sus rutas migratorias, encuentran en la reserva un refugio fundamental frente a la constante modificación del paisaje circundante.

Futuros relevamientos sistemáticos, acompañados por la continuidad de estas políticas de manejo, resultarán fundamentales para consolidar a la reserva como un área clave para la conservación de la avifauna regional y provincial. El grado de intensidad y el número de años de muestreo son factores que están positivamente correlacionados con un aumento del número de especies registradas en áreas protegidas (e.g., Haene & Pereira 2003). Por lo tanto, es altamente probable que este primer inventario represente ape-

nas el punto de partida, y que la continuidad de los monitoreos revele un número de especies aún mayor que siga poniendo de manifiesto el valor de la reserva.

AGRADECIMIENTOS

A César Mendoza y Arnaldo Arístides Jara, por su amable recibimiento y disposición durante nuestras salidas de campo. A Sergio Lucero, por facilitarnos parte de la bibliografía utilizada. Finalmente, a los



Figura 6. (A) Pijui Frente Gris (*Synallaxis frontalis*) registrado dentro de la arboleda de la reserva. (B) Tero Real (*Himantopus mexicanus*) en la costa del Lago San Francisco. (C) Dos individuos de Rayador (*Rynchops niger*) forrajeando en la desembocadura del Arroyo Durazno en el Lago San Francisco. (D) Macho adulto de Varillero Congo (*Chrysomus ruficapillus*) en la zona de juncuales de la reserva. Fotografías: Casale AI (A, B, C) y Colnaghi I (D).

Figure 6. (A) Sooty-fronted Spinetail (*Synallaxis frontalis*) recorded within the reserve's woodland. (B) Black-necked Stilt (*Himantopus mexicanus*) on the shore of Lake San Francisco. (C) Two Black Skimmers (*Rynchops niger*) foraging at the mouth of the Durazno Stream in Lake San Francisco. (D) Adult male Chestnut-capped Blackbird (*Chrysomus ruficapillus*) in the reedbed area of the reserve. Photographs: Casale AI (A, B, C) and Colnaghi I (D).

autores locales y a la comunidad de observadores de aves, por sentar los precedentes fundamentales para que la conformación de esta lista sea posible.

REFERENCIAS

- Arturi MF (2006) Situación Ambiental en la Ecorregión Espinal. En: Brown A, Martínez Ortiz U, Acerbi M, Corcuera J (eds) *La Situación Ambiental Argentina 2005*. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires, pp 241-246
- Athor J, Baigorria J, Mérida E (2006) Proyecto “Estrategias para la conservación de los talaes bonaerenses”. En: Mérida E, Athor J (eds) *Talaes bonaerenses y su conservación*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires, pp 12-15
- Barreña JL (2011) *Aves rodriguenses*. Edición del autor, Buenos Aires
- Benayas JMR, Newton AC, Diaz A, Bullock JM (2009) Enhancement of biodiversity and ecosystem services by ecological restoration: a meta-analysis. *Science* 325(5944): 1121-1124. <https://doi.org/10.1126/science.1172460>
- Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) (2022) Reserva Natural y Parque Municipal General Rodríguez: Estudio de Impacto Ambiental y Social (Partido de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires), Buenos Aires
- eBird (2026) eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York (URL: <http://www.ebird.org>)
- Haene E, Pereira J (2003) *Fauna de Otamendi. Inventario de los animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi (Pdo. de Campana, Prov. de Buenos Aires, Argentina)*. Temas de Naturaleza y Conservación, Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires
- Ibáñez H, Lartigau B, Lartigau M, Lorenzi J (2022) *Actualización de las aves del Área Natural Protegida Dique Ingeniero Roggero y su zona de influencia*. Municipio de Moreno y Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires
- IUCN International Union for Conservation of Nature (2025) The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-2. <https://www.iucnredlist.org>. Accedido el 15/4/2026
- Jahn AE, Levey DJ, Johnson JE, Mamani AM, Davis SE (2006) Hacia una interpretación mecánica de la migración de aves en América del Sur. *El Hornero* 21(2): 99-108. <https://doi.org/10.56178/eh.v21i2.791>
- Jauregui A, Gonzalez E, Colombo MA, Segura LN (2023) Importancia de la estructura y composición del bosque para las aves que nidifican en los talaes del Parque Costero del Sur. En: Athor J, Albareda D (eds) *Parque Costero del Sur, nuevos temas sobre naturaleza, conservación y patrimonio cultural*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires, pp 7-15
- López JA (2020) *Un tesoro en peligro: Cuenca Alta del Río Reconquista*. García Ediciones, Buenos Aires
- Marateo G, Segura LN, Arturi MF (2009) Las relaciones entre las aves y el bosque en el Parque Costero del Sur. En: Athor J (ed) *Parque Costero del Sur. Magdalena y Punta Indio: Naturaleza, conservación y patrimonio cultural*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires, pp 122-137
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Aves Argentina (2017). Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. CABA, Argentina, pp 34-36
- Morici A (2016) *Aves del área natural protegida Dique Ingeniero Roggero*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires
- Munro NT, Lindenmayer DB, Fischer J (2007) Faunal response to revegetation in agricultural areas of Australia: a review. *Ecological Management & Restoration* 8(3): 199-207. <https://doi.org/10.1111/j.1442-8903.2007.00368.x>
- Narosky T, González Táboas F (2021) *Aves de la provincia de Buenos Aires*. Ecoval Ediciones. Buenos Aires
- R Core Team (2025) R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. <https://www.R-project.org/>
- Roesler I, De Pino E, Carricart JP, Agostini MG (2012) Conservación de la Reserva Natural Punta Lara. En: Roesler I, Agostini MG (eds) *Inventario de los vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara, provincia de Buenos Aires, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación, Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires, pp 173-183
- Wickham H (2016) *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer, New York
- Wickham H, François R, Henry L, Müller K, Vaughan D (2023) *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. R package version 1.1.4. <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>
- Wickham H, Vaughan D, Girlich M (2024) *tidyr: Tidy Messy Data*. R package version 1.3.1. <https://CRAN.R-project.org/package=tidyr>