

Este trabajo fue revisado por pares y un comité científico, y ha sido aceptado para su publicación en la revista *Nuestras Aves*. Sin embargo, aún no ha sido modificado para su publicación final, por lo que esta versión y la final podrían no ser iguales.

# REVISIÓN Y DISCUSIÓN SOBRE LA PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL TAGUATÓ NEGRO (*Parabuteo leucorrhous*) EN EL NORESTE ARGENTINO

## REVIEW AND DISCUSSION ON THE PRESENCE AND DISTRIBUTION OF THE WHITE-RUMPED HAWK (*Parabuteo leucorrhous*) IN NORTHEASTERN ARGENTINA

Alejandro Bodrati<sup>1\*</sup>, Dante G. Moresco<sup>2</sup> & Facundo G. Di Sallo<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Proyecto Selva de Pino Paraná, San Pedro (3352), Misiones, Argentina

<sup>2</sup>Vasco de la Carretilla 69, Puerto Iguazú, Misiones (3370), Argentina

<sup>3</sup>Instituto de Biología Subtropical, CONICET- Universidad Nacional de Misiones (Facultad de Ciencias Forestales), Tres Fronteras 183, Puerto Iguazú (3370), Misiones, Argentina

\*[alebodrati@gmail.com](mailto:alebodrati@gmail.com)

**RESUMEN:** El Taguató Negro (*Parabuteo leucorrhous*) presenta poblaciones regulares y de mayor densidad en las selvas montanas de las Yungas del noroeste de Argentina. La población del noreste tendría una densidad muy baja y, en los últimos 65 años, solo se conocen dos registros documentados en Misiones y pocos reportes de observación. La especie fue señalada para las provincias de la región chaqueña (Chaco, Formosa y Santiago del Estero) y de la Mesopotamia (Corrientes y Entre Ríos). En estas cinco provincias, los registros carecen de documentación y la mayoría no incluye descripciones ni detalles. Muchos de los registros son menciones generales repetidas que provendrían de errores de identificación iniciales. En este trabajo hacemos un análisis de los registros de la población oriental de Argentina, discutiendo las claves para la identificación certera en el campo. Las sierras de la provincia de Misiones serían claves para la población del noreste de Argentina.

**PALABRAS CLAVE:** distribución, hábitat, identificación, Mesopotamia, población oriental, región chaqueña

**ABSTRACT:** The White-rumped Hawk (*Parabuteo leucorrhous*) has regular high-density populations in the montane forests of the Yungas in northwest Argentina. The population in the northeast is very low density, and in the last 65 years only two records have been documented in Misiones, with few observational reports. The species was noted for the provinces of the Chaco region (Chaco, Formosa and Santiago del Estero) and in Mesopotamia (Corrientes and Entre Ríos). In these five provinces the records do not have documentation, and most do not have descriptions or details. Many of the records are repeated general mentions that would come from original identification errors. Here we analyze the records of the eastern population of Argentina, discussing the keys for accurate identification in the field. The mountains of the province of Misiones would be key for the population of northeastern Argentina.

**KEYWORDS:** Chaco region, distribution, eastern population, habitat, identification, Mesopotamia

## INTRODUCCIÓN

El Taguató Negro (*Parabuteo leucorrhous*) es un accipitriforme monotípico que se distribuye con dos poblaciones disjuntas desde Venezuela y Colombia hasta el sur de Bolivia, y noroeste de Argentina, habitando los Andes en bosques montanos densos de alta elevación en zonas tropicales y subtropicales (Bierregaard et al. 2020). La otra población habita el este y sudeste de Brasil, el oriente de Paraguay y el noreste de Argentina (Bierregaard et al. 2020). En Argentina la especie está categorizada como ‘Vulnerable’ (MayDS & AA 2017), mientras que a nivel global se considera de Preocupación Menor (BirdLife International 2026). En el sudeste de Brasil, se consideró que las poblaciones tienen un estatus crítico de extinción en el estado de Rio Grande do Sul (Bencke et al. 2003). Las principales causas de esta situación para la especie serían la deforestación y la fragmentación del hábitat (Marques et al. 2002; Bencke et al. 2003). La escasa información con la que se cuenta genera que su estado de conservación sea incierto y no se han realizado estimaciones cuantitativas del tamaño ni de la tendencia de la población (Bierregaard et al. 2020).

En Argentina, el Taguató Negro ha sido listado o mapeado para diez provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos (Dabbene 1910; Bertoni 1913; Zotta 1935; Steullet & Deautier 1935; Pereyra 1950; Short 1975; Olrog 1979; de la Peña 1992; Nores 2002; Bierregaard et al. 2020; de la Peña 2025). Sin embargo, los registros documentados se restringen a dos regiones: las Yungas de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, y la selva Atlántica de Misiones. Para el resto de las provincias de Argentina no encontramos registros documentados que respalden su inclusión en la distribución de la especie. En las Yungas, la especie cuenta con registros documentados desde principios del siglo XX (Lillo 1902; Olrog 1967; Seipke 2009; Camperi et al. 2012; Antelo & Brandán Fernández 2013). Allí es escasa, aunque puede detectarse con regularidad en algunos sitios, como el Parque Nacional Baritú (Salta) y el paraje Abra de Cañas, en el Parque Nacional Calilegua (Jujuy) (Roesler & Juhant 2004; Pearman en Coconier et al. 2007).

En el noreste, en cambio, la información es fragmentaria. Aunque existen registros documentados en Misiones (Navas & Bó 1991), hasta el momento no se ha realizado un análisis de los registros de la especie en la región, ni se ha evaluado el sustento de su men-

ción para Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos.

En este trabajo compilamos los registros del Taguató Negro disponibles en la bibliografía, en colecciones de museos y en plataformas en línea, y describimos nuevos registros en la provincia de Misiones. Además, revisamos y discutimos los registros de las provincias del noreste y presentamos claves para identificar la especie en el campo.

## MATERIALES Y MÉTODOS

Obtuvimos registros del Taguató Negro a partir de dos fuentes: (i) relevamientos ornitológicos generales en el noreste de Argentina y (ii) la revisión de colecciones de museos, literatura y bases de datos en línea.

(i) Relevamientos ornitológicos generales: Realizamos observaciones con prismáticos en sitios que relevamos o durante recorridas vehiculares en distintos sitios del noreste. Hicimos relevamientos ornitológicos de campo en la provincia de Misiones de forma regular entre octubre de 2003 y febrero de 2026, abarcando más de 3500 días de trabajo de campo en más de 70 localidades del norte, centro y este de Misiones, y con esfuerzos menores en localidades del sur de la provincia. Mantuvimos distintos proyectos de monitoreo a largo plazo que permitieron detectar al Taguató Negro. El principal proyecto fue en el Parque Provincial (PP) Cruce Caballero (26°31'S, 53°59'O, dpto. San Pedro) y zonas rurales cercanas, donde se enfocaba en el monitoreo general de aves y estudio de aves que nidifican en cavidades de árboles (Cockle et al. 2017). En 2006–2022, de septiembre a diciembre, como parte de un grupo de investigadores experimentados acampamos en el parque. Entre octubre de 2003 y febrero de 2026 trabajamos en relevamientos de 3–12 días de duración en distintas áreas protegidas del norte y centro de Misiones, como ejemplo: Parque Nacional Iguazú (PN, 25°40'S, 54°27'O, dpto. Iguazú), PP Caá Yará (26°52'S, 54°14'O, dpto. Guaraní), Área experimental y Reserva de Usos Múltiples Guaraní (AERUM, 26°56'S, 54°13'O, dpto. Guaraní), Reserva Natural Cultural Papel Misionero (26°58'S, 54°10'O, dpto. Guaraní), PP Esmeralda (26°53'S, 53°53'O, dpto. San Pedro), PP Península (25°43'S, 54°32'O, dpto. Iguazú) y en reservas privadas.

Realizamos relevamientos ornitológicos de campo en la región chaqueña entre febrero de 1997 y marzo de 2020 en varios sectores de la provincia de Chaco y Formosa. Los mayores esfuerzos de muestreo se rea-

lizaron en el PN Chaco (26°47'S, 59°39'O, dptos. Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral, alrededor de 1000 días de campo) y el PP Pampa del Indio (26°15'S, 59°59'O, dptos. Libertador General San Martín 100 días de campo). Realizamos viajes de relevamientos a la Estancia La Fidelidad (actualmente PN Impenetrable, 25°03'S, 60°52'O; depto General Güemes), Puerto Antequera (valle aluvional de los ríos Paraguay y Paraná, 27°26'S, 58°51'O; dpto 1° de Mayo); Estancia Laguna Corá y río Tragadero (27°25'S, 58°52'O; dptos San Fernando y 1° Mayo); Isla del Cerrito (27°17'S, 58°37'O; dpto. Bermejo). Además, entre 2016 y 2020 realizamos recorridos esporádicos que involucraron distintos ambientes (palmares, bosques de quebracho, selvas en galería de ríos y riachos) entre las localidades de Las Garcitas (26°36'S, 59°49'O; dpto. Sargento Cabral), Capitán Solari (26°45'S, 59°33'O; dpto. Sargento Cabral), Resistencia (26°45'S, 58°55'O; dpto. San Fernando), San Martín (26°32'S, 59°17'O; dpto. Libertador General San Martín) y Pampa del Indio (26°15'S, 59°57'O; dpto. Libertador General San Martín). Realizamos relevamientos de aves en el este de la provincia de Formosa: En el PN Río Pilcomayo (25°28'S, 57°58'O; dpto Pilcomayo) y Estancia La Marcela (26°17'S, 59°08'O; dpto Pirané). Realizamos diez viajes entre julio de 1993 y mayo 2018 al noroeste argentino donde observamos a la especie en el PN Calilegua (23°40'S, 64°51'O; dpto. Ledesma; Jujuy, 38 días de campo).

(ii) Revisión de bibliografía y colecciones: Revisamos las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) e hicimos consultas sobre las colecciones del Museo de La Plata (MLP) y la colección de la Fundación Miguel Lillo de Tucumán (FML); revisamos tres pieles depositadas en el MACN que fueron publicadas anteriormente (Navas & Bó 1991), y reportamos pieles que no fueron comunicadas previamente en la bibliografía (Vertnet; [www.vertnet.org](http://www.vertnet.org)). Realizamos búsquedas bibliográficas en fuentes relevantes sobre la ornitología de Argentina. Buscamos registros en cuatro bases de datos ornitológicas en línea: Vertnet (2026, Constable et al. 2010), Xeno-canto Foundation ([www.xeno-canto.org](http://www.xeno-canto.org)), EcoRegistros ([www.ecoregistros.org](http://www.ecoregistros.org)), eBird ([www.ebird.org](http://www.ebird.org)) y en WikiAves Brasil ([www.wikiaves.com.br](http://www.wikiaves.com.br)). Además de aquellas localidades donde registramos a la especie mediante trabajo de campo, incluimos como nuevas localidades a las que contaban con registros en bases de datos de ciencia ciudadana, pero sin publicación formal. En todos los casos utilizamos localidades como aquellos sitios

reconocidos como pueblos, propiedades privadas, áreas protegidas o áreas de colonias bien definidas y delimitadas.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### Claves para la identificación

Consideramos que la combinación de los siguientes caracteres pueden resultar claves para realizar una correcta identificación del Taguató Negro: 1) color predominante negro, 2) ojos color amarillo intenso 3) tarsos amarillos algo anaranjados (marcas 1–3 visibles en <https://www.wikiaves.com.br/6873911>; WikiAves: Cotrim 2025), 3) notable color crema extenso de las tapadas ventrales que se aprecian en vuelo (e.g. de fotos en vuelo <https://ebird.org/checklist/S92293745>; eBird: Lammertink et al. 2021), 4) dos líneas blancas en la cola ventral, una más notable y gruesa hacia el centro y la otra fina más cercana a la base que se aprecian en vuelo (ver eBird: Lammertink et al. 2021), cola con un ápice blanco, no siempre notable en vuelo, pero según la postura de ave puede ser perceptible cuando está posado (ver por ejemplo <https://www.wikiaves.com.br/2090278>; WikiAves: Souto 2016), 5) subcaudal blanco notable en vuelo (ver eBird: Lammertink et al. 2021), 6) la apariencia es “compacta”, cuello corto y cabeza redondeada, algo pequeña, en relación al cuerpo (ver WikiAves: Souto 2016). Cuando se observa individuos posados, nuestra experiencia indica que no se puede observar con facilidad el color rufo de los muslos porque el plumaje negro del ventral los tapa (ver WikiAves: Ribenboim 2012; Souto 2016; Laube 2020), esto tampoco es fácilmente visible en los individuos en vuelo (ver eBird: Lammertink et al. 2021). El color blanco del subcaudal se observada solo parcialmente dependiendo de la postura o el lugar donde esta posado el individuo (ver WikiAves: Ribenboim 2012; Souto 2016; Laube 2020). Consideramos que los errores de identificación pueden relacionarse a la confusión con individuos morfo oscuro del Aguilucho Cola Corta (ver WikiAves: Campos 2009; Cruz 2012), una rapaz que observamos con frecuencia en la región chaqueña y en la selva Atlántica de Argentina. Nuestras observaciones de campo, en el noroeste y noreste de Argentina, y las claves de identificación mencionadas son coincidentes con fotografías en línea (revisamos 857 fotografías en Wiki Aves, <https://www.wikiaves.com.br>).

## Situación y conocimiento en las provincias del noreste argentino

### Misiones

La provincia de Misiones es la única del noreste argentino con registros documentados del Taguató Negro desde hace más de 100 años (Tabla 1, Fig. 1). La especie se considera extremadamente rara en la selva Atlántica de la provincia (Pearman & Areta 2020). El primer antecedente para Misiones es la inclusión de Dabbene (1910), quien cita a Bertoni a partir de un registro en el Alto Paraná. Luego Bertoni (1913) la incluye sin ningún detalle. La primera prueba física es un individuo colectado (sin localidad precisa) por Emilio Budin en febrero de 1925 y depositado en el Smithsonian Institution, National Museum of Natural History (USNM-Or-264553; Orrell 2026; Tabla 1) y quizás en esa documentación se basan Steullet &

Deautier (1935) y Zotta (1935) para incluir al Taguató Negro en la provincia de Misiones. Luego WH Partridge colectó cinco ejemplares más entre agosto de 1952 y julio de 1959, tres fueron colectados en el Km 30 del arroyo Urugua-í, una en el km 10 del mismo arroyo, y la última en Tobuna (antiguamente Tobunas) (Tabla 1; Navas & Bó 1991).

En el PN Iguazú existen tres registros en base a observaciones. Tito Narosky mencionó, sin detalles, una observación de junio de 1975 y varias observaciones más de invierno (Saibene et al. 1996). La segunda mención es un registro de Flavio Moschione en enero de 1987, y la tercera, de Darío Yzurieta, en noviembre de 1994 (Saibene et al. 1996; Tabla 1). Ninguno de estos registros tiene evidencia física, detalles ni descripciones. Cabe destacar que en las últimas cuatro décadas no se lograron nuevos registros dentro del Parque Nacional Iguazú, a pesar de diversos releva-




**Figura 1.** Registros del Taguató Negro (*Parabuteo leucorrhous*) en el noreste de Argentina. Rombos rojos registros sin documentación (observaciones sin detalles ni descripciones certeras). Círculos verdes registros documentados (fotos, pieles colectadas) o con descripciones donde se mencionan los caracteres diagnósticos de la especie. Los números son coincidentes con la Tabla 1.

**Figure 1.** Records of the White-rumped Hawk (*Parabuteo leucorrhous*) in northeastern Argentina. Red diamonds records without documentation (observations without details or accurate descriptions). Green circles documented records (photos, collected skins) or with descriptions where the diagnostic characters of the species are mentioned. The numbers match with Table 1.

mientos, trabajos de campo y de ser el tercer sitio con más listas de Argentina (eBird 2026), lo que reflejaría que es uno de los sitios más visitados por observadores de aves. Chebez (2009) menciona dos registros: uno para el arroyo Piray Guazú en 1987 y otro en sep-

tiembre de 2006 en el bosque semixerófilo del arroyo Garupá, en las cercanías de Posadas, sin brindar más detalles. Este último registro sería llamativo por el hábitat inesperado para el Taguató Negro.

**Tabla 1.** Registros del Taguató Negro (*Parabuteo leucorrhous*) en las provincias del noreste argentino. Referencias: S/D=Sin detalles, Piel de museo=Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), American Museum of Natural History (AMNH), Los Angeles Counting Museum (LACM), Smithsonian Institution National Museum of Natural History (USNM), A°=Arroyo, AERG=Área Experimental y Reserva Guaraní, RUM=Reserva Usos Múltiples, RBY=Reserva de Biosfera Yaboty, RP=Ruta Provincial, RN= ruta nacional, PP=Parque Provincial, PN=Parque Nacional, PFCSJ=Parque Federal Campo San Juan, Es=Estancia. Se enumeran las localidades concretas del Taguató Negro. Seguido de cada localidad se listan sus registros ordenados cronológicamente.

**Table 1.** Records of the White-rumped Hawk (*Parabuteo leucorrhous*) in the northeastern provinces of Argentina. References: S/D=No details, Museum Skins=Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), American Museum of Natural History (AMNH), Los Angeles Counting Museum (LACM), Smithsonian Institution National Museum of Natural History (USNM), A°=Arroyo, AERG=Experimental Area and Guaraní Reserve, RUM=Multiple Use Reserve, RBY=Yaboty Biosphere Reserve, RP=Route Provincial, RN=national route, PP=Provincial Park, PN=National Park, PFCSJ=Campo San Juan Federal Park, Es=Estancia. "The specific localities of the White-rumped Hawk are listed. Following each locality, its records are listed in chronological order.

| N        | Localidad                                              | Fecha                 | Ambiente        | Nº de individuos               | Documentación | Observadores/<br>Tipo y detalles del registro | Fuente                                 |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| MISIONES |                                                        |                       |                 |                                |               |                                               |                                        |
|          | Misiones, Alto Paraná                                  |                       |                 |                                | NO            | Mención                                       | Dabbene (1910)                         |
|          | "Misiones"                                             |                       |                 |                                | NO            | Mención                                       | Bertoni (1913)                         |
|          | "Misiones"                                             | Febrero 1925          | USNM-Or-264553  | 1 ♂                            | SI            | Colector E Budin                              | Vertnet: Orrell (2026)                 |
| 1        | A° Urugua-í km 10, (Iguazú), 25°52'S, 54°31'O          | 4 de agosto de 1952   | MACN            | 1 ♂                            | SI            | Colector WH Partridge                         | Navas & Bó (1991)                      |
| 2        | A° Urugua-í km 30, (Iguazú), 25°53'S, 54°26'O          | 16 de febrero 1958    | MACN            | 1 ♀                            | SI            | Colector WH Partridge                         | Navas & Bó (1991)                      |
|          |                                                        | 23 de febrero de 1958 | AM-NH-Or-769144 | 1 ♀                            | SI            | Colector WH Partridge                         | Olrog (1967), Vertnet: Trombone (2013) |
|          |                                                        | Julio 1959            | MACN            | 1 ♀                            | SI            | Colector WH Partridge                         | Navas & Bó (1991)                      |
| 3        | Tobuna, (San Pedro), 26°27'S, 53°53'O                  | 14 de julio de 1959   | LACM-Or-46545   | 1 ♀                            | SI            | Colector WH Partridge                         | Vertnet: Mertz et al. (2025)           |
| 4        | PN Iguazú, (Iguazú), 25°40'S, 54°21'O                  | Junio 1975            | Selva           | Sin detalles                   | NO            | Observación T Narosky                         | Saibene et al. (1996)                  |
|          |                                                        | Enero 1987            | Selva           | Un individuo                   | NO            | Observación F Moschione                       | Saibene et al. (1996)                  |
|          |                                                        | Noviembre 1994        | Selva           | Un individuo                   | NO            | Observación D Yzurietta                       | Saibene et al. (1996)                  |
| 5        | RN 12 y A° Piray Guazú, (Montecarlo), 26°28'S, 54°39'O | 1987                  | Borde de ruta   | Sin detalles                   | NO            | Observación JC Chebez                         | Chebez (2009)                          |
| 6        | Forestal Montreal, (San Pedro), 26°52'S, 53°57'O       | Septiembre de 1994    | Selva           | Un individuo volando (12:30 h) | NO            | Observación                                   | Seipke & Cabanne (2002)                |

| N     | Localidad                                                      | Fecha                                    | Ambiente                                                                            | Nº de individuos                                    | Documentación | Observadores/<br>Tipo y detalles del registro | Fuente                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                | Abril 1995                               | Posado borde de camino en selva                                                     | Un individuo                                        | NO            | Observación                                   | Seipke & Cabanne (2002)                  |
| 7     | A° Coaty, RN 14, (Capital), 27°41'S, 55°39'O                   | 18 de octubre de 2003                    | S/D                                                                                 | Un individuo                                        | NO            | Observación C Ferrari & S Vitale              | eBird: Ferrari & Vitale (2003)           |
| 8     | A° Garupá, Garupá, (Capital), 27°29'S, 55°44'O                 | Septiembre 2006                          | Bosques semixerófilo                                                                | S/D                                                 | NO            | Observación JC Chebez                         | Chebez (2009)                            |
| 9     | AERG y RUM, RBY, (Guaraní), 26°55'S, 54°13'O                   | 20 de julio de 2004                      | Valle del arroyo Soberbio, selva en buen estado de conservación                     | Adulto planeando en círculos, valle arroyo Soberbio | NO            | Observación AB                                | Este trabajo                             |
| 10    | PP Cruce Caballero, (San Pedro), 26°28'S, 53°57'O              | 4 al 10 marzo de 2011                    | S/D                                                                                 | S/D                                                 | NO            | Observación                                   | Capllonch et al. (2015)                  |
| 11    | Camino acceso PP Cruce Caballero (San Pedro), 26°31'S, 53°57'O | 10 de octubre de 2012                    | Eucaliptal, remanentes de selva y sector desmontado                                 | Individuo en vuelo y posado                         | NO            | Observación AB                                | Este trabajo                             |
|       |                                                                | 14 de octubre de 2012                    | Mismo ambiente y sector anterior                                                    | Individuo en vuelo circular                         | NO            | Observación AB                                | Este trabajo                             |
|       |                                                                | 26 de octubre de 2012                    | Posado en borde eucaliptal y borde de fragmento de selva                            | Individuo posado                                    | NO            | Observación AB                                | Este trabajo                             |
| 12    | RP 8, Primero de mayo, (Caingús), 27° 08'S, 55° 03'O           | 27 de julio de 2018                      | En vuelo dentro de amplio y profundo valle con selva en buen estado de conservación | Dos individuos                                      | NO            | Observación AB, L Pagano                      | Este trabajo                             |
| 13    | PP Esmeralda RBY, (San Pedro), 26°53'S, 53°53'O                | 24 de noviembre de 2004                  | En vuelo dentro de un valle con selva degradada                                     | Un individuo observado                              | NO            | Observación AB                                | Este trabajo                             |
|       |                                                                | 11 de julio de 2015                      | En vuelo circular con varios Jotes sobre selva en buen estado de conservación       | Un individuo fotografiado                           | SI            | Gómez Umpierrez fotografiado                  | EcoRegistros: Gómez Umpierrez (2020)     |
| 14    | PFCSJ, (Candelaria), 27°22'S, 55°39'O                          | Mayo, junio, octubre y noviembre de 2012 | S/D                                                                                 | S/D                                                 | NO            | S/D                                           | Capmourteres et al. (2015)               |
| 15    | PP Caá Yari, (Guaraní), 26°52'S, 54°14'O                       | 19 de febrero de 2021                    | Identificado por las vocalizaciones                                                 | Un individuo oído                                   | NO            | S Moya & M del Castillo                       | eBird: Moya & del Castillo (2021)        |
| 16    | Ea. La Emilia, (Eldorado), 26°21'S, 54°17'O                    | 23 de julio de 2021                      | En vuelo circular en zona de profundas quebradas                                    | Individuo fotografiado                              | SI            | D Zaffignani, M Lammertink & I Ebrecht        | eBird: Zaffignani et al. (2021)          |
| CHACO |                                                                |                                          |                                                                                     |                                                     |               |                                               |                                          |
|       | "Chaco"                                                        |                                          |                                                                                     | Mención                                             | NO            |                                               | Zotta (1935), Short (1975), Olrog (1979) |
|       | Chaco, sector oriental                                         | Noviembre 1974                           |                                                                                     | Observación                                         | NO            | CC Olrog                                      | Olrog (1985)                             |

| N                   | Localidad                                                                                                  | Fecha                                          | Ambiente                                                        | Nº de individuos    | Documentación | Observadores/<br>Tipo y detalles del registro | Fuente                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Provincia de Chaco                                                                                         | Mayo, junio, octubre y noviembre               | Bosques y selvas                                                | Observaciones       | NO            | S/D                                           | Contreras et al. (1990)                                                               |
|                     | Provincia de Chaco                                                                                         | Sin detalles                                   | S/D                                                             | Mapeo               | NO            | S/D                                           | Narosky e Yzurieta (1987, 2003, 2010)                                                 |
| 17                  | Isla del Cerrito, (Bermejo), 27°17'S, 58°37'O                                                              | 9 de enero de 1987                             | S/D                                                             | Observación         | NO            | GA Herrera                                    | EcoRegistros: Herrera (1987)                                                          |
| FORMOSA             |                                                                                                            |                                                |                                                                 |                     |               |                                               |                                                                                       |
|                     | “Formosa”                                                                                                  | S/D                                            |                                                                 | Mención             | NO            | S/D                                           | Zotta (1935), Short (1975),                                                           |
|                     | Formosa                                                                                                    | S/D                                            |                                                                 | Mapeo               | NO            | S/D                                           | Fjeldsa & Krabbe (1990), Narosky e Yzurieta (1987, 2003, 2010) Pearman & Areta (2020) |
| 18                  | Fortín Sargento Primero Leyes, (Patiño), 24°33'S, 59°23'O                                                  | 13 de septiembre de 1990 y 24 de enero de 1991 | S/D                                                             | Observaciones       | NO            | F Moschione                                   | Contreras et al. (2014)                                                               |
| 19                  | Pirané, (Pirané), 25°45'S, 59°04'O                                                                         | 20 de junio de 1991                            | S/D                                                             | Observaciones       | NO            | F Moschione                                   | Contreras et al. (2014)                                                               |
| 20                  | Riacho Monte Lindo, entre Col. Dalmacia y su desembocadura en el Río Paraguay, (Formosa), 25°52'S, 57°53'O | 6 y 7 de septiembre 2014                       | S/D                                                             | 1 individuo         | NO            | BL López Lanús & S Zalazar                    | López Lanús y Mencia (2017)                                                           |
| SANTIAGO DEL ESTERO |                                                                                                            |                                                |                                                                 |                     |               |                                               |                                                                                       |
| 21                  | Reserva Provincial Copo, (Copo), 25°40'S, 61°46'O                                                          | S/D                                            | S/D                                                             | Mención             | NO            | S/D                                           | Moschione & Bishels (2004), de la Peña (2020)                                         |
| CORRIENTES          |                                                                                                            |                                                |                                                                 |                     |               |                                               |                                                                                       |
|                     | “Corrientes”                                                                                               | S/D                                            | S/D                                                             | Mención, mapeo      | NO            | S/D                                           | Short (1975), Contreras (1981), Fjeldsa & Krabbe (1990), Narosky e Yzurieta (2010)    |
| 22                  | Perichón, (Capital), 27°25'S, 58°45'O                                                                      | S/D                                            | S/D                                                             | S/D                 | NO            | JR Contreras                                  | Nores (2002)                                                                          |
| ENTRE RÍOS          |                                                                                                            |                                                |                                                                 |                     |               |                                               |                                                                                       |
| 23                  | 35 km al nordeste de Paraná, (Paraná), 31°37'S, 60°08'O                                                    | 13 de mayo de 1999                             | En sector alterado, posado en árbol sin hojas, ambiente Espinal | Individuo observado | NO            | M Nores                                       | Nores (2002)                                                                          |

En el PP Cruce Caballero, la especie fue incluida en un listado por Capllonch et al. (2015) con base en una observación, pero la ausencia en el listado de especies similares y presentes en el área generaría dudas sobre la identificación (Bodrati et al. 2010). Este parque es quizás el área con los mayores esfuerzos de muestreo en Misiones en las dos últimas décadas (ver Cockle et al. 2024; Bodrati et al. 2025). Allí se realizaron trabajos de campo intensos y extensos con equipos de investigadores experimentados que trabajaron de forma permanente durante las últimas 20 temporadas (2006-2025), y no se logró detectar a la especie dentro del área protegida (Bodrati et al. 2010; Bodrati et al. 2025). Para el Parque Federal San Juan (PFCSJ), Capmourteres et al. (2015) incluyen al Taguató Negro en un listado basado en observaciones en ambientes de pastizal, selva e isletas de selva. La mención de ambientes muy distintos a los habitados por el Taguató Negro, falta de documentación y descripciones, y la ausencia en el listado de especies morfológicamente parecidas como el Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*), sugiere que podrían haber ocurrido errores en la identificación.

En Misiones obtuvimos seis registros de observaciones de campo en cuatro localidades (Tabla 1): 1) El 20 de julio de 2004, AB observó un individuo adulto planeando en círculos, pocos metros sobre el dosel de selva conservada en el valle del arroyo Soberbio, en el Área experimental y Reserva de Usos Múltiples Guaraní (Tabla 1). El individuo fue identificado por el notable color crema, algo triangular, de las tapadas ventrales. Dos líneas blancas en la cola ventral: una más notable y gruesa hacia el centro y la otra, fina, más cercana a la base; color predominante negro y ojo amarillo intenso. 2) El 24 de noviembre de 2004, AB observó un individuo en vuelo usando corrientes térmicas sobre el dosel de la selva del profundo valle del arroyo Florida, en el Parque Provincial Esmeralda. Fue identificado con los mismos caracteres que en el registro anterior.

3) El 10, 14 y 26 de octubre de 2012, AB observó a un individuo adulto en el mismo sector del camino de acceso al Parque Provincial Cruce Caballero. El ambiente correspondía a un remanente de selva con pendiente hacia un arroyo, con selva riparia, y una pequeña plantación de eucaliptos que los separaba. El individuo fue observado en vuelo y posado en los árboles del borde de la plantación. En vuelo se pudieron observar las características ya descritas. Cuando el individuo estaba posado, no se pudo observar

el color rufo de los muslos porque el plumaje negro ventral los tapaba, e incluso el color blanco del subcaudal solo se observaba marginalmente. Los tarsos estaban tapados parcialmente por el plumaje ventral, pero eran de color amarillo-anaranjado intenso, y el ojo amarillo resaltaba sobre el plumaje negro. La cera del pico era amarilla pero muy apagada (poco notable) respecto al color del iris del individuo. El borde blanco del ápice de la cola era poco perceptible. El individuo tenía una apariencia “compacta”, cuello corto y cabeza redondeada. 4) El 27 de julio de 2018, Luis Pagano y AB observaron dos individuos en vuelo dentro de un profundo valle al sur de la ruta provincial 8, al oeste de la localidad de Primero de Mayo (Tabla 1). Un individuo voló a unos 20 metros sobre los observadores. El color crema de las tapadas era llamativo, una línea blanca gruesa en la cola y otra más fina superior e incluso fino blanco en el ápice de la cola, subcaudal blanco notable, ojo amarillo. Un segundo individuo volaba alejado por debajo de los observadores dentro del valle.

### Documentación reciente en Misiones

Después de 56 años se volvió a documentar al Taguató Negro en la provincia de Misiones: El 11 de julio de 2015, un individuo que volaba en círculos fue fotografiado en el PP Esmeralda (Gómez Umpierrez 2020, Tabla 1). El segundo registro documentado del siglo XXI corresponde a un individuo fotografiado en vuelo por M. Lammertink en la Estancia La Emilia, dpto. El Dorado, el 23 de julio de 2021 (eBird: Lammertink et al. 2021, Tabla 1).

En la provincia compilamos 27 registros; solo ocho fueron documentados: seis hasta mediados del siglo XX y dos en el presente (Tabla 1). Los restantes son menciones, registros visuales o auditivos sin detalles ni descripciones. Los nuevos registros que presentamos aquí serían los únicos con detalles descriptivos.

### Chaco

El Taguató Negro es mencionado por primera vez en la provincia por Zotta (1935), sin ningún otro detalle. Luego Short (1975) y Olrog (1979) lo incluyen para Misiones y Chaco. La inclusión de Olrog (1979) se basaría en una observación de campo del propio autor en noviembre de 1974, en el extremo oriental de la provincia (Olrog 1985). Cabe destacar que Olrog (1979) no incluye al Aguilucho Cola Corta en la provincia de Chaco. En particular, para el Aguilucho Cola

Corta, Olrog (1979) menciona como distribución en Argentina: “Bosques abiertos cerca de ríos y esteros en Jujuy, Salta, Tucumán y Misiones” (Olrog 1979: 63). Sin embargo, el Aguilucho Cola Corta es relativamente frecuente e incluso localmente común en la provincia de Chaco (Roesler 2003) y sería plausible pensar la confusión entre el Taguató Negro e individuos del morfo oscuro del Aguilucho Cola Corta. Nosotros, a pesar de realizar intensos y extensos relevamientos de campo en la provincia de Chaco, no encontramos al Taguató Negro, pero frecuentemente observamos al Aguilucho Cola Corta en los dos morfos descritos.

Por otro lado, Contreras et al. (1990) mapean tres registros en la provincia de Chaco: uno en el extremo sudeste, otro en el este y otro en el sector noroeste. Ninguno de estos registros contiene detalles. Mencionan que los registros son de invierno, pero reportan que las observaciones corresponden a mayo, junio, octubre y noviembre, de los cuales los dos últimos meses corresponden a la primavera. Otro registro visual es señalado en el extremo este en la Isla del Cerrito, dpto. Bermejo, el 9 de enero de 1987 (EcoRegistros: Herrera 1987). Varios autores mapean al Taguató Negro para la provincia de Chaco, posiblemente repitiendo las menciones originales de Zotta (1935) y Short (1975) (Narosky & Yzurieta 1987, 2003, 2010; de la Peña 1992; Bierregaard et al. 2020). Así, en la provincia de Chaco, los registros que conocemos carecen de evidencia física, de detalles o de descripciones adecuadas que permitan confirmar la ocurrencia del Taguató Negro.

## Formosa

En la provincia no existirían registros documentados (Chebez 2009). La primera inclusión en un listado de la provincia sería la de Zotta (1935). Luego, Short (1975) menciona que “quizás” habitaría las provincias de Formosa y Chaco. Es posible que, siguiendo a los autores anteriores, se haya producido la repetición del mapeo y de las menciones para Formosa (Fjeldsa & Krabbe 1990; Narosky & Yzurieta 1987, 2003, 2010). Recientemente, Pearman & Areta (2020) incluyeron un punto aislado en el mapa, en el este de la provincia, y suponemos que lo consideraron un registro ocasional o accidental. Contreras et al. (2014: 134) comentan: “En la Provincia de Formosa es una especie muy rara que cuenta solo con muy escasos registros”. Estos autores incluyen tres registros en igual número de localidades: dos registros visuales de Flavio Moschione en Fortín Leyes, dpto. Patiño, y

otro cerca de Pirané en el dpto. homónimo, también registrado por Flavio Moschione (Tabla 1). La tercera localidad es un listado de Alberto Yanosky que la menciona para la Reserva El Bagual, dpto. Laishi. Los registros no tienen documentación, descripciones, ni otros detalles. Di Giacomo (2005) aclaró que el registro de la Reserva El Bagual no fue tenido en cuenta en su trabajo porque en la compilación de Yanosky se evidenciaban errores de identificación que no permitían tomar los datos con total seguridad. Nosotros, ante la invalidación de Di Giacomo (2005), no incluimos esa información en este trabajo.

*A posteriori*, López Lanús y Mencia (2017) comentan dos registros en el riacho Monte Lindo: el 6 de septiembre de 2014, un individuo adulto observado en vuelo por López Lanús y Sofía Zalazar entre Colonia Dalmacia y su desembocadura en el río Paraguay. El día siguiente otro individuo oído, pero no grabado, por López Lanús cerca del sitio anterior, siendo probable que fuera el mismo individuo o territorio.

Contreras et al. (2014), sugieren como hipótesis, que existirían poblaciones focales en Misiones, Corrientes, en algún sector de Brasil, y tal vez, pero muy dudosamente en Chaco y en Formosa. También en zonas boscosas yungueñas aisladas de Salta y Tucumán, y con muchas reservas, en sitios aislados en Bolivia. Sugieren que los registros de la provincia de Formosa (y Chaco) provendrían de individuos en movimientos dispersivos desde áreas distantes. Esta idea, quizás, fuera tomada de Hilty & Brown (1986) cuando comentan que las poblaciones del núcleo andino en Colombia serían muy focales en ambientes boscosos húmedos, donde nidifican, y luego hacen movimientos. Como explicación, Contreras et al. (2014) sugieren que a partir de las poblaciones de las Yungas se emitirían los ejemplares “transgresivos” que suelen verse en áreas distantes chaqueñas. Otra explicación a los supuestos registros de la región chaqueña es la de Short (1975): “quizás habitaría los márgenes del Chaco occidental cerca de los bosques subtropicales de las laderas andinas del noroeste argentino, y la otra población se extendería desde el oriente de las provincias de Chaco y Formosa a través del este de Paraguay y norte de Corrientes y Misiones, a la costa atlántica de Brasil hasta Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul”. Como mencionara Chebez (2009) no existirían registros con evidencia física en Formosa y tampoco ningún registro con descripciones. Nosotros no encontramos al Taguató Negro durante nuestras prospecciones y destacamos que son necesarios re-

gistros concretos para confirmar la presencia en la provincia.

### Santiago del Estero

La primera inclusión para la avifauna de la provincia es la realizada por de la Peña (2020). Recientemente la especie no fue incluida en listados provinciales (Coria et al. 2021, 2023). La mención del Taguató Negro se basa en un listado del Parque Provincial Loro Habrador (Chaco), donde se menciona sin detalles a la especie para la Reserva Provincial Copo (actualmente dentro del Parque Nacional Copo) (Moschione & Bishels 2004). No existiría ninguna evidencia física para la provincia de Santiago del Estero.

### Corrientes

Para la provincia no existirían registros documentados (Chebez 2009). La primera mención sería la de Short (1975), quien la señala para el norte provincial. Luego, Contreras (1981) la incluye, sin aclarar la información en la que se basó. Nores (2002) menciona un registro de Contreras para la localidad de Perichón, en el departamento Capital, sin ningún otro detalle. Es probable que muchas menciones y sombreados en mapas hayan sido repetidos siguiendo la mención de Short (Fjeldsa & Krabbe 1990; de la Peña 1992; Narosky & Yzurieta 1987, 2003, 2010). No existirían registros documentados del Taguató Negro que confirmen la presencia de la especie en la provincia de Corrientes.

### Entre Ríos

Para la provincia se publicó un registro; Nores (2002) menciona que el 13 de mayo de 1999 observó a un individuo adulto al costado de una ruta, a 35 km al noreste de la ciudad de Paraná, capital provincial. Describió que estaba posado, expuesto en un árbol sin follaje, en un ambiente chaqueño. Describe al individuo: “mostraba todas las características: aspecto y tamaño similar al Taguató Común (*Rupornis magnirostris*)” (Nores 2002: 14). Menciona que el plumaje era predominante negro con cera y las patas amarillas, muslos castaños, pico negro, corto y grueso, y cuando el individuo estaba posado era notable una banda dorsal blanca en la cola, y en vuelo un área blanca en rabadilla y supracaudales. Nores (2002) menciona que el registro en Entre Ríos, teniendo en cuenta un registro de la provincia de Corrientes, expandía la distribución del Taguató Negro 500 km hacia el sur.

Creemos que este registro debería ser tomado con cautela. En nuestra opinión el aspecto y tamaño del Taguató Negro no es similar al Taguató Común. El Taguató Negro tiene aspecto compacto dando la impresión de tener el cuello corto, el cuerpo es “rechoncho”, la cabeza redondeada, la cola cuadrada y es pequeño en relación al Taguató común. El ambiente del registro sería la provincia del Espinal, en el distrito del Ñandubay del dominio chaqueño (Cabrera 1971), y no chaqueño *sensu estricto*. Resulta curioso que Nores no haya notado que la banda blanca de la cola también es ventral y no solo dorsal. Es llamativo que no haya destacado ni mencionado, cuando el individuo volaba, el color crema de las tapadas ventrales, un carácter diagnóstico que llama rápidamente la atención y resulta clave para la identificación en el campo. No obstante, si el registro es acertado, creemos que no se puede afirmar que la especie haya expandido su distribución a un área altamente transformada y a una ecorregión muy diferente de la que habita regularmente el Taguató Negro.

### CONCLUSIONES

Los registros con documentación en Argentina son todos en selvas húmedas, en los faldeos orientales de los Andes y en las selvas de la provincia de Misiones (Fig. 1). No encontramos ningún registro documentado en la región chaqueña (Formosa, Chaco, Santiago del Estero) ni en la Mesopotamia (Corrientes, Entre Ríos). Misiones es la única provincia con registros concretos y accesibles del noreste de Argentina. Las menciones y el mapeo publicados, podrían basarse en errores originales de identificación. Es posible que la suposición de la presencia en esas regiones haya facilitado la repetición de errores hasta la actualidad. Nosotros alentamos a los observadores e investigadores a documentar o describir potenciales registros en áreas del noreste y comunicarlos para comprender la distribución real de la especie.

Las poblaciones del Taguató Negro de la ladera oriental de los Andes habitan bosques de montaña húmedos, generalmente entre los 1500 y los 2900 msnm y en Perú alcanza los 3500 msnm (Bierregaard 1995; Ferguson-Lees & Christie 2001). En Argentina, tendría poblaciones de mayor densidad en las Yungas del oeste donde se distribuye en selvas húmedas hasta los 2000 msnm, desde Jujuy hasta Catamarca (Lillo 1902; Olrog 1979; Ortiz & Capllonch 2007; Seipke 2009). Habita áreas a alturas menores, por debajo de

los 900 msnm en la provincia de Catamarca en el extremo sud-occidental de su área de distribución (Seipke 2009). En contraste, las poblaciones de la selva Atlántica tienen un límite altitudinal mucho más bajo. Ejemplares colectados por WH Partridge en Misiones, y depositados en el MACN (Museo Argentino de Ciencias Naturales) y museos del extranjero (ver Tabla 1), fueron obtenidos a una altitud por debajo a los 200 msnm (Seipke 2009; este trabajo).

En base a nuestro trabajo de campo, y compilación de información, la población de la porción oriental de Argentina sería de muy baja densidad y podría depender de los remanentes de selva en las sierras de la provincia de Misiones. Olrog (1985) menciona que Partridge (com. pers.) la encontró relativamente común alrededor del arroyo Urugua-í a fines de la década de 1950; sin embargo, el número de individuos colectados es bajo y no hay evidencia concreta de que haya sido abundante en el pasado. Más allá del estado de conservación de los remanentes de selva, otros factores, como el gradiente altitudinal y las sierras con quebradas profundas, podrían influir en la presencia de la especie.

En el sudeste de Brasil se mencionó que las poblaciones del Taguató Negro estarían en declive (Bierregaard 1995; Ferguson-Lees y Christie 2001) y que su situación podría ser crítica en Río Grande do Sul (Bencke et al. 2003). Sin embargo, trabajos posteriores sugieren que el Taguató Negro no es tan raro en el sudeste de Brasil como se ha supuesto (Zilio & Mendonça-Lima 2012). Se sugirió que su distribución podría estar limitada por el gradiente altitudinal y el tamaño de los remanentes de selva (Zilio & Mendonça-Lima 2012). Otros estudios en el estado de Paraná podrían apoyar la idea de que el Taguató Negro sería tolerante a la fragmentación de la selva (Anjos & Graf 1993; Anjos 2001), pero la ausencia de registros en zonas perturbadas puede argumentar en contra de esta suposición (Zilio & Mendonça-Lima 2012). Por otra parte, los registros modernos en Río Grande do Sul se realizaron únicamente en grandes áreas conservadas (Bencke et al. 2003; Zilio & Mendonça-Lima 2012). En Brasil, la deforestación y, recientemente, la construcción de centrales hidroeléctricas, que inundaron grandes áreas vírgenes y de selva secundaria antigua, son las principales amenazas para las aves rapaces que habitan en las selvas del sur (Zilio & Mendonça-Lima 2012). En coincidencia con Zilio & Mendonça-Lima (2012), destacamos la evidente necesidad de conservar los remanentes de la selva At-

lántica y de realizar estudios para esclarecer la falta de conocimiento sobre la ecología del Taguató Negro.

## AGRADECIMIENTOS

Los estudios de campo fueron autorizados por el Instituto Misionero de Biodiversidad y el Ministerio de Ecología y RNR de la provincia de Misiones. Néstor Fariña, Kristina Cockle y Luis Pagano participaron en distintas campañas en el campo. Agradecemos el envío de la bibliografía a Diego Monteleone.

## REFERENCIAS

- Anjos L dos (2001) Bird communities in five Atlantic forest fragments in southern Brazil. *Ornitología Neotropical* 12: 11–27
- Anjos L dos, Graf V (1993) Riqueza de aves da fazenda Santa Rita, região dos Campos Gerais, Palmeira, Paraná, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 10(4): 673–693. <https://doi.org/10.1590/S0101-81751993000400013>
- Antelo CM, Brandán Fernández ZJ (2013) *Las aves no Passeriformes de Tucumán, Argentina*. Miscelánea 132: 1–132. Fundación Miguel Lillo, Tucumán
- Bencke GA, Fontana CS, Dias RA, Maurício GNM, Mähler Jr JFK (2003) Aves. En: Fontana CS, Bencke GA, dos Reis RE (orgs). *Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul*. EDIPUCRS, Porto Alegre, pp. 189–477
- Bertoni A (1913) *Contribución para un catálogo de aves argentinas*. Anales Sociedad Científica Argentina 75: 64–102
- Bierregaard RO (1995) The biology and conservation status of Central and South American Falconiformes: a survey of current knowledge. *Bird Conservation International* 5: 325–340. <https://doi.org/10.1017/S0959270900001076>
- Bierregaard RO, Boesman PFD, de Juana E, Marks JS (2020) White-rumped Hawk (*Parabuteo leucorrhous*), version 1.0. In: Birds of the World, del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J, Christie DA, de Juana E (eds.). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whrhaw1.01>
- BirdLife International (2026) Species technical sheet: *Parabuteo leucorrhous*. <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/white-rumped-hawk>. Accedido el 24/02/2026
- Bodrati A, Cockle K, Segovia JM, Roesler I, Areta JJ, Jordan E. (2010). La avifauna del Parque Provincial Cruce Caballero, provincia de Misiones, Argentina. *Cotinga*, 32:41–64

- Bodrati A, Cockle KL, Fariña N, Moresco DG & Di Sallo FG (2025) El Tacuarero o Barranquero (*Clibanornis dendrocolaptoides*) en Argentina: una revisión al conocimiento sobre distribución, estatus, hábitat e historia natural. *Nuestras Aves* 70: 33–57 <https://doi.org/10.56178/na.vi70.1162>
- Cabrera AL (1971) *Fitogeografía de la República Argentina*. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 14:1–42
- Camperi AR, Darrieu CA, Grilli PG, Burgos F (2012) Avifauna de la provincia de Jujuy, Argentina: lista de especies (No Passeriformes). *Acta Zoológica Lilloana* 56: 82–140
- Campos RA (2009) Wikiaves: <https://www.wikiaves.com.br/143794> Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Accedido el 17/09/2026
- Capllonch P, Alderete CA, Aráoz R, Cerón G, Mamaní JC, Quiroga O, Soria K (2015) Caracterización y parámetros biométricos de la avifauna en un fragmento de Selva Atlántica en Misiones, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 59: 124–140
- Capmourteres V, Bauni V, Meluso JM, Bogan S, Homberg M (2015) Aves de la Reserva Natural Campo San Juan, Misiones: Descripción e implicancias para su conservación. *Nótulas Faunísticas* 171: 1–14
- Chebez JC (2009) *Otros que se van. Especies en peligro*. Editorial Albatros, Buenos Aires
- Cockle KL, Martin K, Bodrati A (2017) Persistence and loss of tree cavities used by birds in the subtropical Atlantic Forest. *Forest Ecology and Management* 384: 200–207. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.10.052>
- Cockle KL, Gómez MR, Ferreyra CA, Di Sallo FG, Bodrati A (2024) Lesser Woodcreepers excavate nest cavities in trees. *Ornithology* 141: ukad060. <https://doi.org/10.1093/ornithology/ukad060>
- Coconier EG, López Lanús B, Roesler I, Moschione F, Pearman M, Blendinger P, Bodrati A, Monteleone D, Casañas H, Pugnali G, Alvarez ME (2007) Lista comentada de las aves silvestres de la unidad de gestión Acambuco. En Coconier EG (ed.) *Las aves silvestres de Acambuco, Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N° 6. Aves Argentinas/AOP, pp. 32–103
- Constable H, Guralnick R., Wieczorek J, Spencer C, Peterson AT, VertNet Steering Committee (2010) VertNet: a new model for biodiversity data sharing. *PLoS Biology* 8: e1000309. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1000309>. Accedido el 23/1/2026
- Contreras JR (1981) Lista preliminar de la avifauna correntina I. No Passeriformes. *Historia Natural*, 3: 21–28
- Contreras JR, Berry LM, Contreras AO, Bertonatti CC, Utges EE (1990) *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Chaco. República Argentina. 1. No passeriformes*. Cuadernos Técnicos Félix de Azara N° 1, Corrientes
- Contreras JR, Agnolin F, Davies YE, Godoy I, Giacchino A, Ríos EE (2014) *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. I. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Coria OR, Quiroga OB, Navarro JL, Heredia J, Torres R, Lima J (2021) Lista actualizada de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 65: 42–143
- Coria OR, Torres R, de la Peña M, Lima JJ (2023) *Aves de Santiago del Estero. Ecología y Conservación*. Buenos Aires. Fundación de Historia Natural Félix de Azara
- Cotrim RM (2025) Wikiaves: <https://www.wikiaves.com.br/6873911> Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Accedido el 17/09/2026
- Cruz M (2012) Wikiaves: <https://www.wikiaves.com.br/668891> Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Accedido el 17/09/2026
- Dabbene R (1910) Ornitología Argentina. Catálogo sistemático y descriptivo de las aves de la República Argentina. *Anales Museo Nacional de Buenos Aires*, 18:1–513
- Di Giacomo AG (2005) Aves de la reserva El Bagual. En: Di Giacomo AG, Krapovickas SF (eds). *Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, Provincia de Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área protegida del Chaco húmedo*. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, pp 201–465
- eBird (2026) eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York (URL: <http://www.ebird.org>). Accedido el 24/2/2026
- Ferguson-Lees J, Christie DA (2001) *Raptors of the world*. Houghton Mifflin, Boston, USA
- Ferrari C, Vitale S (2003) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S100187492>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 22/02/2026
- Fjeldsa J, Krabbe N (1990) *Birds of the high Andes*. Apollo Books, Svendborg
- Gómez Umpierrez WL (2020) Nuevo registro del Taguató Negro (*Parabuteo leucorrhous*) en la Provincia de Misiones, Argentina. *Ecoregistros Revista* 10: 58–59
- Herrera GA (1987) Taguató Negro (*Parabuteo leucorrhous*). *EcoRegistros*: <https://www.ecoregistros.org/site/registro.php?id=165334>. Accedido el 27/01/2026
- Hilty SL, Brown WL (1986) *A guide to the birds of Colom-*

- bia. Princeton Univ. Press, New Jersey
- Lammertink M, Zaffignani D, Ebrecht I (2021) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S92293745>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 17/09/2026
- Laube FA (2020) Wikiaves: <https://www.wikiaves.com.br/3856180> Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Accedido el 17/09/2026
- Lillo M (1902) Enumeración sistemática de las aves de la provincia de Tucumán. *Anales Museo Nacional de Buenos Aires* 8: 169–221
- López-Lanús B, Mencia P (2017) Diversidad, abundancia y estado de conservación de las aves de los ríos Monte Lindo y Pilagá en el este de la provincia de Formosa, Argentina. *Nótulas Faunísticas* 228: 1–29
- Marques A A B de, Fontana CS, Vélez E, Bencke GA, Schneider M, do Reis RE (2002) *Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul*. FZB/MCT - PUCRS/PANGA, Porto Alegre
- MAYDS & AA (2017) *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. CABA, Buenos Aires
- Mertz W, Ludt W, Clardy T, Robson S, Camacho N (2025). LACM Vertebrate Collection. Version 18.19. Natural History Museum of Los Angeles County. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/77rmwd>. <https://gbif.org/occurrence/657103106>. Accedido el 23/1/2026
- Moschione F, Bishels L (2004) *Listado de las aves del Parque Provincial Loro Hablaador, provincia de Chaco*. Informe técnico Proyecto Elé. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
- Moya S, del Castillo M (2021) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S83129350>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 22/02/2026
- Narosky T, Yzurieta D (1987) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires
- Narosky T, Yzurieta D (2003) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Editores y Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
- Narosky T, Yzurieta D (2010) *Aves de Argentina y Uruguay. Birds of Argentina and Uruguay: Guía de Identificación Edición Total, A Field Guide Total Edition*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires
- Navas JR, Bó NA (1991) Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. IV. *Revista Museo Argentino Ciencias Naturales* 15: 95–105
- Nores M (2002) Taguató negro (*Buteo leucorrhous*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. *Nuestras Aves* 43: 14. <https://doi.org/10.56178/na.vi43.984>
- Olrog CC (1967) Notas ornitológicas VII. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo Tucumán. *Acta Zoológica Lilloana* XXII: 249–253
- Olrog CC (1979) Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1–324
- Olrog CC (1985) Status of wet forest raptors in northern Argentina. En: Newton I and Chancellor RA (eds.). *Conservation studies on raptors*. ICBP Technical Publication 5, Cambridge, UK, pp. 191–197
- Orrell T, Informatics and Data Science Center - Digital Stewardship (2026). NMNH Extant Specimen Records (USNM, US). Version 1.104. National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/hnhrg3>. Accedido el 23/1/2026
- Ortiz D, Capllonch P (2007) *Guía de los rapaces de la provincia de Tucumán*. Tucumán, Argentina
- Pearman M, Areta JI (2020) *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm, London
- de la Peña MR (1992) *Guía de aves argentinas*. Tomo 1. (Rheiformes a Anseriformes) Edición L.O.L.A. Buenos Aires
- de la Peña MR (2020) *Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución (Actualización)*. Tomo 4 *Cathartidae, Pandionidae, Accipitridae, Aramididae, Rallidae, Heliornithidae*. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), Santa Fe
- de la Peña MR (2025) *Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”* (nueva serie) 7: 1–595
- Pereyra JA (1950) Avifauna argentina (contribución a la ornitología): Continuación del Tomo X de las Memorias del Jardín Zoológico de La Plata. *Hornero* 9(2): 178–241. <https://doi.org/10.56178/eh.v9i2.1376>
- Ribenboim LC (2012) Wikiaves: <https://www.wikiaves.com.br/655536> Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Accedido el 17/09/2026
- Roesler I (2003) El aguilucho cola corta (*Buteo brachyurus*) en la región chaqueña argentina. *Hornero* 18(2): 123–126. <https://doi.org/10.56178/eh.v18i2.852>
- Roesler I, Juhant M (2004) *Rapaces del Parque Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina*. Primer Simposio Argentino sobre Investigación y Conservación de Rapaces,

- SAICR I, Libro de Actas: 3–4.
- Saibene CA, Castelino MA, Rey NR, Herrera J, Calo J (1996) *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. L.O.L.A., Buenos Aires
- Seipke SH (2009) Listado actualizado de las rapaces diurnas en Catamarca, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 15–20
- Seipke SH, Cabanne GS (2002) Rapaces observadas en un área selvática de San Pedro, Misiones, Argentina. *Ornitología Neotropical* 13: 273–282
- Short LL (1975) Zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. *Bulletin American Museum of Natural History* 154: 163–352
- Souto LV (2016) Wikiaves: <https://www.wikiaves.com.br/2090278> Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Accedido el 17/09/2026
- Steullet AB, Deautier EA (1935) *Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina*. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina
- Trombone T (2013) *AMNH Bird Collection. American Museum of Natural History*. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/xvzdcn>. Accedido el 3/1/2026.
- Zilio F, Mendonça-Lima A (2012) The White-rumped Hawk (*Buteo leucorrhous*) in southern Brasil: status, conservation, and first description of the nest. *Ornitología Neotropical* 23: 51–61
- Zotta AR (1935) Lista sistemática de las aves argentinas. *Hornero* 6(1): 151-196