

Este trabajo fue revisado por pares y un comité científico, y ha sido aceptado para su publicación en la revista *Nuestras Aves*. Sin embargo, aún no ha sido modificado para su publicación final, por lo que esta versión y la final podrían no ser iguales.

REVISIÓN Y DISCUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA GARZA CUCHARONA (*Cochlearius cochlearius*) EN ARGENTINA

REVIEW AND DISCUSSION OF THE KNOWLEDGE OF THE BOAT-BILLED HERON (*Cochlearius cochlearius*) IN ARGENTINA

Alejandro Bodrati^{1*}, Gabriel D. Moresco², Fabricio Candia³ & Facundo G. Di Sallo^{1,4}

¹Proyecto Selva de Pino Paraná, Vélez Sarsfield y San Jurjo S/N, San Pedro (3352), Misiones, Argentina

²Vasco de la Carretilla 69, Puerto Iguazú, Misiones (3370), Argentina

³Nueva Formosa Mza 34 casa 4, Formosa Capital (3600), Formosa, Argentina

⁴Instituto de Biología Subtropical, CONICET-Universidad Nacional de Misiones (Facultad de Ciencia Forestales), Tres Fronteras 183, Puerto Iguazú (3370), Misiones, Argentina

*alebodrati@gmail.com

RESUMEN: En Argentina, la Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearius*) ha sido históricamente considerada una especie ocasional o extremadamente rara. A partir de una recopilación de información y de consultas a personas, confirmamos su nidificación en tres provincias del nordeste del país: Formosa, Chaco y Misiones. Los arroyos y riachos de la región chaqueña podrían albergar poblaciones densas, mientras que en Misiones el sistema de arroyos del Parque Nacional Iguazú y el río homónimo Iguazú son clave para la población de Garza Cucharona. El comportamiento nocturno y huidizo, junto con su uso de ambientes poco estudiados y de difícil acceso, explicaría el escaso conocimiento sobre la situación de la especie en el país. Prospecciones minuciosas en ambientes poco explorados podrían dilucidar las verdaderas densidades poblacionales de la Garza Cucharona en el país.

PALABRAS CLAVE: colonias de nidificación, comportamiento, distribución, estatus, hábitat

ABSTRACT: In Argentina, the Boat-billed Heron (*Cochlearius cochlearius*) has historically been considered an occasional or extremely rare species. Based on a compilation of available information and consultations with people, we confirm that it breeds in three provinces in the northeast of the country: Formosa, Chaco, and Misiones. Streams and small rivers in the Chaco region may harbor dense populations, while in Misiones the stream system of Iguazú National Park and the homonymous river are key for the Boat-billed Heron population. The nocturnal, elusive behavior, together with the little-studied and difficult-to-access habitat where the species lives, would be the reason for the limited knowledge of the species in Argentina. Future detailed surveys in little-explored environments could elucidate the true population densities of the Boat-billed Heron in the country.

KEYWORDS: behavior, breeding colonies, distribution, habitat

INTRODUCCIÓN

La Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearius*), Arapacá o Araticú, es una especie politípica que se distribuye, con cinco subespecies, en una enorme geonemia desde el centro de México, Belice y Guatemala hasta Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina (Martínez-Vilalta et al. 2020). En Argentina, es conocida en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, y con un registro único en la provincia de Salta (Braslavsky et al. 2009; de la Peña 2023). Actualmente es considerada como ‘Amenazada’ en el país (MAYDS & AA 2017). Históricamente fue considerada como extremadamente rara, con registros muy espaciados en el tiempo, y se especuló que su presencia sería marginal o transgresiva desde los países vecinos ubicados al norte (Contreras et al. 1990; 2014), también como visitante ocasional, o errante en el norte argentino, como sucedería en el estado de Santa Catarina en el sudeste de Brasil (Do Rosário 1996; Martínez-Vilalta et al. 2020). Sin embargo, son escasos los trabajos que evalúen el estatus de la Garza Cucharona en Argentina.

La Garza Cucharona habita manglares y distintos tipos de selvas densas a lo largo de las costas de ríos, márgenes de arroyos de agua dulce, lagos, marismas y pantanos, y se encuentra regularmente por debajo de los 650 msnm (Martínez-Vilalta et al. 2020). En Argentina fue registrada en bordes boscosos de lagunas, esteros, madrejones y humedales en general, pero esencialmente en selvas ribereñas de arroyos, en humedales creados por arroyos y en montes ralos inundados (Chatellenaz 2005; Contreras et al. 2014). Es de comportamiento tímido, reservado y prefiere ambientes alejados de la presencia humana. De hecho, Wetmore (1965) destacó que, en general, la Garza Cucharona se aleja o desaparece de las zonas habitadas por humanos. Durante el día, las Garzas Cucharonas descansan en grupos o parejas, ocultas entre el follaje de la parte alta de árboles a lo largo de cursos fluviales (Hilty 2003). La especie es estrictamente crepuscular y nocturna, y abandona sus dormideros en la oscuridad para dirigirse a los lugares donde se alimenta (Hilty 2003; Martins et al. 2021). En un estudio sobre los horarios de actividad, en la Amazonía oriental, esta garza estuvo más activa durante la noche (63,6%) que durante el crepúsculo (27,3%) y el amanecer (9,1%) (Martins et al. 2021). En el estudio se determinó que la especie no cambia su actividad en noches de mayor luminosidad lunar que en no-

ches completamente oscuras (Martins et al. 2021). La escasez de localidades formalmente reportadas y la falta de tratamiento de la situación de la especie en obras de ornitología recientes resaltan la necesidad de generar una compilación de información que permita tener un panorama general sobre el estatus y la conservación de la Garza Cucharona en Argentina.

En este trabajo realizamos una compilación de registros de la especie en Argentina, aportando registros inéditos y la primera información sobre su reproducción en la provincia de Misiones. Hicimos consultas a personas que registraron y trabajaron durante largos períodos de tiempo en lugares donde la especie estaba presente. Discutimos el potencial estatus de la especie en Argentina y sugerimos que su abundancia real en el país ha sido pasada por alto o infravalorada debido a su comportamiento esquivo y a los sectores poco relevados donde habita.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtuvimos registros de la Garza Cucharona por medio de relevamientos de campo, revisión de colecciones, literatura y bases de datos.

(i) Relevamiento de campo: en la provincia de Misiones, a pesar de realizar relevamientos ornitológicos generales, inclusive manteniendo proyectos de monitoreo a largo plazo, no logramos detectar a la Garza Cucharona. Pero un hecho de importancia es que nunca nos enfocamos en la especie y nuestros muestreos no se enfocaron en arroyos o riachos que son esencialmente el hábitat clave de la especie (Martínez-Vilalta et al. 2020). Nuestros relevamientos ornitológicos en la provincia de Misiones se realizaron de forma regular entre octubre de 2003 y agosto de 2025, abarcando más de 3500 días de trabajo de campo en más de 70 localidades del norte, centro, este y sur de Misiones. AB y FDS realizaron relevamientos ornitológicos de campo en la región chaqueña entre febrero de 1997 y marzo de 2020 en varios sectores de las provincias de Chaco y Formosa. Los mayores esfuerzos de muestreo se realizaron en el Parque Nacional Chaco, en los dptos. Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral (26°47' S, 59°39' O, alrededor de 1000 días de campo) y el Parque Provincial Pampa del Indio, departamento Libertador General San Martín (26°15' S, 59°59' O, 100 días de campo). En Formosa, FC recorrió las aguas del riacho Monte Lindo Grande navegando durante 40 días y más de 120 horas, en

todas las estaciones del año.

(ii) Revisión de bibliografía, colecciones y bases de datos en línea: Revisamos las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) e hicimos consultas en las colecciones del Museo de La Plata (MLP) y de la Fundación Miguel Lillo de Tucumán (FML). Realizamos búsquedas bibliográficas en fuentes relevantes sobre la ornitología de Argentina. Buscamos registros en cuatro bases de datos ornitológicas en línea: *vertnet.org* (2025; Constable et al., 2010), *Xeno-canto* (2025), *EcoRegistros* (2025) y *eBird* (2025). Incluimos como nuevas localidades a las que contaban con registros documentados en bases de datos de ciencia ciudadana (*eBird* 2025; *EcoRegistros* 2025; *Xeno-canto* 2025; *Vertnet* 2025), pero sin publicación formal.

Tratamos como históricos a los registros que cuentan con 30 años o más. En todos los casos, utilizamos localidades como sitios reconocidos, ya sean propiedades privadas, áreas protegidas o áreas de colonias bien definidas y delimitadas. No consideramos como registros las menciones que encontramos en la bibliografía sin una localidad que pueda ser referenciada geográficamente. Hicimos consultas con personas que contaban con registros publicados e inéditos para conocer mayores detalles de estos o para conseguir información antigua inédita.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Antecedentes en Argentina

La primera mención para el país es la cita de Bertoni (1913), que indica: río Pilcomayo, Argentina, sin otras precisiones. Zotta (1942: 177) la discute y pone en duda esta mención, señalando: “La cita dice «río Pilcomayo», localidad muy poco precisa y que suponemos sea en su desembocadura en el río Paraguay, según una cita reciente para Cochlearius, establecida por Laubmann (1939). Como Bertoni (1913) usó en el mismo año para indicar la presencia de esta especie, también por primera vez, para el Paraguay la misma localidad, suponemos que simplemente la mención de esta especie para la Argentina, ha sido hecha por extensión”. En el mismo trabajo, Zotta (1942) comunica la primera piel de un macho adulto, obtenida en el río Iguazú, Misiones (sin fecha precisa) y depositada en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires (MACN) (Tabla 1). En coincidencia con López Lanús & Mencia (2017), consideramos que el

registro de Bertoni debería ser tratado como el primero para Formosa y para el país. Años después, Partridge (1953) da a conocer dos nuevas pieles depositadas en el mismo museo (MACN). La primera fue obtenida el 20 de abril de 1918 en el interior de las selvas compactas y densas del río de Oro, cerca de Las Palmas, dpto. Bermejo, provincia de Chaco. La segunda piel fue enviada por uno de los colaboradores de campo de Partridge, Marcelino Salas, que obtuvo un macho adulto el 23 de agosto de 1952, en el km 10 del arroyo Uruguá-i en el noroeste de Misiones (Tabla 1).

A continuación, transcurren casi 50 años sin registros reportados en la bibliografía formal. Solo encontramos dos registros de observaciones que son comunicadas décadas después (Contreras et al. 1990, 2014, Tabla 1). Olrog (1979) la indica para las provincias de Corrientes y Entre Ríos, sin brindar información que avale su inclusión en la avifauna de dichas provincias (Chebez 1994, 2009). Contreras (1981) la incluye en el listado de aves de la provincia de Corrientes sin aportar información que la sustente. Chebez (1994) comenta dos registros de la provincia de Misiones: un ejemplar capturado y taxidermizado en 1969 por Juan Foerster en un bañado cercano a Dos de Mayo. Este ejemplar estuvo depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Dos de Mayo, que luego fue trasladado a la ciudad de Montecarlo (Chebez 1992), pero en la actualidad estaría perdido (Pagano LG com. pers. 2019). El otro registro es una observación de F. Moschione en Candelaria en febrero de 1988 (Chebez 1994). Este registro no cuenta con detalles de la localidad precisa ni del hábitat en el que se registró. Luego, el 13 de marzo de 1995, un individuo fue observado en el arroyo Central del Parque Nacional Iguazú, en Misiones. Este sería el primer registro conocido para el Parque Nacional, donde se dudaba de la presencia y de que haya sido común en los arroyos misioneros (Saibene et al. 1996).

En el presente siglo, la Garza Cucharona es mencionada sin mayores detalles en dos localidades de la provincia del Chaco: el Refugio Privado y Estancia El Cachapé (Moschione 2005), y en el valle de inundación del río Paraná, en el extremo este de la provincia (Chatellenaz 2005). En la reserva y Estancia Guaycolec, Formosa, es señalada en el riacho Pilagá (White 2001, Di Giacomo & White 2005, este trabajo). También fue oída en el riacho Monte Lindo por López Lanús y Mencia (2017). En los últimos años se han logrado varios registros en sectores puntuales de arroyos de las provincias de Chaco y Formosa, conse-

Tabla 1. Registros de Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearius*) en Argentina. En casos donde los registros no tenían una coordenada geográfica, utilizamos coordenadas aproximadas a la localidad mencionada en dichos registros. Se listan y numeran las localidades concretas para la especie, y, seguidas de cada localidad, se listan sus registros ordenados cronológicamente.

Table 1. Records of the Boat-billed Heron (*Cochlearius cochlearius*) in Argentina. When records did not include geographical coordinates, we used approximate coordinates for the locality mentioned. The specific localities for the species are listed and numbered, and the records for each locality are listed in chronological order following the locality name.

Localidad, (departamento), provincia, (coordenada geo- gráfica)	Fecha	Tipo de registro. Especimen Museo (n° de colección)	Colector/Observador/es/ lugar	Sexo/ Edad/N° individuos	Fuente
1. Río Pilcomayo, (Pilcomayo), Formosa, (25°14'S 57°44'O).	Sin detalles	Mención	Bertoni	-	Bertoni (1913)
	23 de julio de 2016	Un individuo sobre selva ribereña. Ribera riacho Pilcomayo, a 1 km de Clorinda.	P Monges, fotografiado	adulto	eBird: Monges (2016)
2. Río Iguazú, (Iguazú), Misio- nes, (25°37'S 54°05'O).	Sin detalles	Piel de museo MACN- 6185	R Orfila	♂ adulto	Zotta (1942)
3a. Río de Oro, Las Palmas, (Bermejo), Chaco, (27°03'S 58°39'O).	26 de abril de 1948	Piel MACN-48-253	AC Umana, monte denso hidrófilo del río de Oro	♀ adulta	Partridge (1953)
3b. Río de Oro, Rincón de los Recuerdos, (Bermejo), Chaco, (26°58'S 58°34'O).	20 de junio de 2024	Adulto fotografiado	En la selva, Galfione F	individuo	eBird: Galfione (2024)
4. Arroyo Uruguayí km 10, (Iguazú), Misiones, (25°51'S 54°30'O).	23 de agosto de 1952	Piel MACN-52-468	M Salas, por el arroyo Uruguayí	♂ adulto	Partridge (1953)
5. Al este de Presidencia Roque Sáenz Peña, (Comandante Fernández), Chaco, (26°45'S 60°22'O).	2 de abril de 1984	Observación	En un bañado	Un indivi- duo	Contreras et al. (1990), (2014)
6. Candelaria, (Candelaria), Misiones, (27°27'S 55°43'O)	Febrero de 1988	Observación	Sin detalles	Sin deta- lles	Chebez (1994, 2009)
7. Reserva Privada y Estan- cia Guaycole, riacho Pilagá, (Formosa), Formosa, (25°59'S 58°09'O).	Febrero de 1993	Observación	G Placci	Sin deta- lles	Contreras et al. (2014)
	Octubre de 1998	Observaciones, fotos	Colonia de nidos asociados a Garcita Blanca (<i>Egretta thula</i>) E White	Adultos, pichones	White (2001), Di Giacomo & White (2005)
	Diciembre de 2000	Observaciones	Selva de inundación, riacho Pilagá, colonia de 45 nidos, E White	Adultos, pichones	White (2001)
8. Refugio Privado y Estancia El Cachapé, (Primero de Mayo), Chaco (26°54'S 59°00'O).	Sin precisio- nes	Observación	Colonia de nidificación	S/D	Moschione (2005), Chebez (2009)
9. Paraje La Misión, (Santa Vic- toria), Salta, (22°13'S 64°41'O).	4 de agosto de 2008	Individuo en mal estado, fotografiado	Adulto herido y luego muerto. El registro se realizó a 1310 msnm	Adulto	Braslavsky et al. (2009)
10. Estación Biológica Corrien- tes, San Cayetano, (Capital), Corrientes (27°34'S 58°41'O).	14 de diciem- bre de 2011	Individuo grabado	Sin detalles, López Lanús obs. pers	Sin detalle	Xeno-canto: López-Lanús (2011)
11. Estancia La Emilia, Riacho Monte Lindo, (Formosa), For- mosa (25°48'S 58°00'O).	5 de marzo de 2012	Individuo observado y fotografiado	Un individuo en el riacho	Sin detalle	López Lanús & Mencia (2017)
12. Riacho Monte Lindo, Colonia Dalmacia, (Formosa), Formosa, (25°51'S 57°54'O).	15 de diciem- bre de 2013	Oído	B López Lanús & P Mencia	Sin deta- lles	López Lanús & Mencia (2017)
13. Estancia La Blanca, 10 km al norte de Santo Tomé, (Santo Tomé), Corrientes (28°29'S 55°59'O).	4 y 11 de febrero de 2018	Fotografiado	AV Franzoy	Inmaduro	Franzoy (2018a)

Localidad, (departamento), provincia, (coordenada geo- gráfica)	Fecha	Tipo de registro. Especimen Museo (n° de colección)	Colector/Observador/es/ lugar	Sexo/ Edad/N° individuos	Fuente
	22 de sep- tiembre de 2018	Fotografiado	AV Franzoy	Adulto	EcoRegis- tros: Franzoy (2018b)
14. Resistencia, Capital, Barrio Barberán (San Fernando), Chaco, (27°27'S 59°02'O).	18 de junio de 2019	Encontrado y foto- grafiado	Herido, H Schreiber y HB Fernández	Adulto	EcoRegistros: Schreiber (2019), Fer- nández (2019)
15. Península Andresito, Isla Grande Iguazú superior, (Gral. Belgrano), Misiones, (25°33'S 54°07'O).	11 de enero de 2021	Observados	22 individuos, D Lozano, H Ca- sañas, JJ Bonanno & R Fariña	Grupo grande	eBird: Fariña et al. (2021)
16a. PN Iguazú, arroyo Central, (Iguazú) Misiones, (25°42'S 54°21'O).	13 de marzo 1995	Observado	K Schiaffino, M Castelino, S Heinonen & J Calo	Adulto	Saibene et al. (1996)
16b. PN Iguazú, Isla de los pájaros, río Iguazú, Iguazú, Misiones, (25°41'S 54°26'O).	Diciembre de 2007	Observado	J Herrera, O Benítez, adultos y pichón en colonia de isla	Adultos, pichón	Este trabajo
16c. PN Iguazú, arroyo Santo Domingo, cerca de la desem- bocadura al Iguazú, (Iguazú), Misiones, (25°36'S 54°14 'O).	Mayo 2013	Observado	M Cavicchia & D Varela	Adulto	M. Cavicchia in litt. (2025), este trabajo
16d. PN Iguazú, arroyo Catarat- as, (Iguazú), Misiones (25°42'S 54°26'O).	26 de enero de 2020	Individuo con plumaje inmaduro fotografiado	S Moya	Adulto	Moya (2020)
16e. PN Iguazú, desembocadu- ra arroyo Cataratas, (Iguazú), Misiones, (25°42'S 54°26'O).	25 de julio de 2024	Fotografiado	E White	Adulto	Este trabajo
17. Riacho Monte Lindo Grande, Paso Ghisla, (Pirané), Formosa, (25°27'S 58°47'S).	19 de julio de 2022 a 10 de mayo de 2025	Observaciones, fotos y videos	Individuos solitarios, parejas, grupos de 4 a 8 y 18, varios observadores	Adultos, juveniles	eBird (2025), EcoRegistros (2025)
	19 de no- viembre de 2022	Fotos, videos	Cinco individuos, E Beltrocco, P Meoniz, P Capovilla	Adultos	eBird: Capovi- lla et al. (2022)
	2 de diciem- bre de 2022	Fotografías	Dos individuos, L Bareiro Guiñazú y B Bareiro	Adultos	eBird: Bareiro Guiñazú & Ba- reiro (2022)
	12 de octubre de 2024	Un individuo fotogra- fiado. Camping Río Soñado, unos 2 km de Paso Ghisla	B Bareiro	Adulto	eBird: Bareiro (2024)
18. Riacho Monte Lindo, (Formosa), Formosa (25°42'S 58°10'S).	18 de julio de 2025	Individuo fotogra- fiado	Individuo fotografiado, L Villafañe	Adulto	eBird: Villafañe (2025)
19. Reserva San Sebastián de la Selva, (Gral Belgrano), Misio- nes, (25°51'S 53°58'O).	11 de octubre de 2024	Adulto fotografiado	DF Belmonte & Thibau Aron- son	Adulto	eBird: Belmon- te & Aronson (2025)
20. PP Uruguay-í, seccional Uruzú, (Iguazú), Misiones, (25°51'S 54°10'O).	24 de mayo de 2025	Fotografiado	En árbol costa del arroyo Uruzú, R Salcedo	Adulto	eBird: Salcedo (2025)
21. Reserva Puente Verde, Península Andresito, (Gral Belgrano), Misiones, (25°31'S 54°08'O).	4 de julio de 2025	Fotografiado	Individuo en la selva, Santiago PS	Adulto	eBird: Santiago (2025)

Aceptado para publicación

guidos por distintos observadores que comunicaron esta información en plataformas en línea (eBird 2025, EcoRegistros 2025).

Para la provincia de Corrientes existirían solo dos registros concretos: un individuo fue grabado en diciembre de 2011 en la Estación Biológica Corrientes, en las proximidades de la ciudad homónima, en el noroeste provincial (López Lanús 2011), y otro individuo fue fotografiado en febrero de 2018 en la Estancia La Blanca, en el noreste de la provincia (Franzoy 2018a).

En la provincia de Salta, un individuo juvenil, herido o enfermo (poco después murió), fue encontrado en un camino, en una zona de influencia yungueña, en agosto de 2008, en el paraje La Misión, cerca del río Bermejo, en la frontera con Bolivia. Este registro fue evaluado como ocasional o accidental (Braslavsky et al. 2009).

En la provincia de Misiones siempre se dudó de la presencia habitual o regular de la Garza Cucharona en los arroyos de la provincia (Saibene et al. 1996). Es probable que esta idea se haya generado a partir de los pocos y esporádicos registros obtenidos a lo largo de décadas. Durante 12 años, Andrés Giai y luego William Partridge trabajaron en intensos y extensos trabajos de campo en arroyos como el Uruguay, Yacuy, Aguará Guasú, Piray Guasú, arroyo Palacio y el río Iguazú, donde obtuvieron sólo un individuo de Garza Cucharona (Partridge 1953, Bodrati & Cockle 2012, Tabla 1). En el PN Iguazú, Justo Herrera (com. pers.) menciona haber observado individuos de la Garza Cucharona al menos en tres ocasiones entre 2005 y 2010, aunque no cuenta con los detalles precisos de dichas observaciones. El último registro publicado es un individuo fotografiado, en enero de 2020, en humedales alimentados por el arroyo Cataratas en el Parque Nacional Iguazú (Moya 2020).

Luego de nuestra búsqueda bibliográfica, revisiones en colecciones de museos, búsqueda de registros en línea y consulta con observadores, recopilamos 34 registros de 22 localidades de la Garza Cucharona en Argentina (Fig. 1, Tabla 1). En la ecorregión Chaqueña encontramos 13 localidades con registros, 6 en la provincia de Formosa, 4 en la provincia de Chaco, 2 en la provincia de Corrientes y 1 en la provincia de Salta (con influencia yungueña). En la Selva Atlántica interior encontramos 8 localidades, todas en las provincias de Misiones.

Eventos de nidificación de la Garza Cucharona en Argentina

Encontramos que la Garza Cucharona nidifica en las provincias de Formosa, Chaco y Misiones. Para la provincia de Formosa, Contreras et al. (2014: 61) señalaban: “La fenología de la especie en la región muestra una presencia aleatoria en diferentes meses del año. Su estatus local es poco claro debido a la escasez de información al respecto. No hay datos acerca de anidación en la provincia, y es muy improbable que esto ocurra”. Sin embargo, la nidificación había sido enunciada varios años antes por White (2001) en la reserva y en Estancia Guaycolec, donde se encontraron dos colonias en el riacho Pilagá. Emilio White realizó trabajos de campo de forma permanente, como parte del Proyecto Mirikiná, entre 1996 y 1999, y luego, entre 2002 y 2005, en dicha estancia. Allí se encontraron colonias en octubre de 1998 y en diciembre de 2000, lo que constituyó los primeros eventos reproductivos reportados de la Garza Cucharona en Argentina (White 2001). La primera colonia (octubre de 1998) estaba sobre la costa de un bañado dentro de la selva de inundación. La colonia se desarrolló durante un evento extraordinario de lluvias extremas que inundaron la región chaqueña a lo largo de varios meses en 1998. Esta colonia era mixta; estaba integrada además por la Garza Blanca (*Ardea alba*), Garza Mora (*Ardea cocoï*), Mbiguá Mboí (*Anhinga anhinga*) y la Garza Bruja (*Nycticorax nycticorax*) (White E in litt. 2025). Al crepúsculo, estas especies regresaban de los esteros para pernoctar en la colonia y las Garzas Cucharonas comenzaban a abandonarla, dejando algunos pocos adultos como vigías (White E in litt. 2025). Las Garzas Cucharonas regurgitaban importantes cantidades de peces para alimentar a los pichones que emitían un potente castañeteo con el pico pidiendo alimento (White E in litt. 2025). En esta colonia se observaron varios pichones que alcanzaron un desarrollo óptimo y abandonaron los nidos (White E in litt. 2025). Se observó que, debajo de la amplia colonia, se reunían lagartos overos (*Salvator merianae*) a la espera de que cayeran pescados o pichones. En el segundo evento (diciembre de 2000), luego de importantes lluvias en las semanas previas, se encontró esta colonia integrada solo por Garzas Cucharonas que se componía de unos 45 nidos y estaba en la selva costera de inundación del riacho Pilagá (White 2001, White E in litt. 2025). Esta colonia fue abandonada y no hubo éxito de pichones en los nidos, posiblemente debido al rápido descenso de las aguas del riacho y

en la selva de inundación (White E com. pers. 2025). Según E. White, los nidos exitosos estuvieron en sectores con suelos inundados, siendo más sensibles en la elección de los sitios que otras garzas a condiciones de mayores lluvias y, por ende, lugares donde los niveles de agua se mantuvieron altos. En estas colonias se observó que individuos de Urraca Morada (*Cyanocorax cyanomelas*) y Urraca Criolla o Acahé (*Cyanocorax chrysops*) intentaron incursionar en la colonia para depredar huevos (White E in litt. 2025). Para la provincia del Chaco, Moschione (2005) la incluye como nidificante en la Estancia El Cachapé, pero no brinda mayores detalles.

En la provincia de Misiones, en diciembre de 2007, Justo Herrera y Omar Benítez (Herrera J com. pers. 2025), durante una navegación por las aguas del río Iguazú, en el Parque Nacional Iguazú, encontraron una colonia de nidificación de garzas (conocida popu-

larmente como garzal) en una de las islas (25°41'S 54°26'O) del grupo de pequeñas islas en las aguas del río Iguazú, cerca del sector de Garganta del Diablo. Esta isla es conocida localmente como “isla de los pájaros” por la concentración regular de aves acuáticas en el lugar. La colonia estaba integrada por numerosos nidos de la Garza Bruja (*Nycticorax nycticorax*) y de la Garcita Blanca (*Egretta thula*). Los nidos estaban anclados en un alto y denso parche de Takuarusu (*Gua-dua chacoensis*). En el sector observaron por lo menos dos adultos de Garza Cucharona y un individuo pichón que no volaba y que escapó trepando entre las tacuaras desde una altura de 3 metros, ocultándose en los sectores más densos de la vegetación (Herrera J com. pers., 2025). El pichón estaba emplumado, pero aún retenía un notable plumón natal. El acceso es difícil para depredadores terrestres y está alejado del movimiento turístico del sector costero (Herrera J




Figura 1. A. Mapa de localidades con registros de Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearius*) en Argentina. Se indican las localidades con registros históricos (anteriores a 1995; rombos amarillos), con registros históricos y recientes (triángulos naranjas) y solo con registros recientes (desde 1996 hasta 2025; círculos violetas). El sombreado verde indica la distribución de la especie según BirdLife International (2018). B. Detalle de Formosa y Chaco, donde se concentran los registros. C. Detalle del norte de Misiones, donde se concentran los registros del Parque Nacional Iguazú y sus alrededores. Los números corresponden a las localidades detalladas en la Tabla 1.

Figure 1. A. Map of localities with records of the Boat-billed Heron (*Cochlearius cochlearius*) in Argentina. The map shows localities with historical records (prior to 1995; yellow diamonds), locations with both historical and recent records (orange triangles), and locations with only recent records (from 1996 to 2025; purple circles). The green shading indicates the species' distribution according to BirdLife International (2018). B. Detail of Formosa and Chaco, where records are concentrated. C. Detail of northern Misiones, where records are concentrated in Iguazú National Park and its surroundings. The numbers correspond to the locations listed in Table 1.

com. pers. 2025). Este hallazgo permite incorporar a la Garza Cucharona como nidificante en el PN Iguazú y en la provincia de Misiones, donde durante muchos años se especuló con dicha posibilidad (Chebez 2009).

Agrupamiento de individuos y poblaciones de la Garza Cucharona en Argentina

Solo unos pocos registros mencionan la observación de grupos de individuos o de varios individuos en tramos de arroyos. Por ejemplo, 22 individuos fueron observados en la costa y luego en la Isla Grande del río Iguazú superior, en el “Grupo de la Isla Grande del Iguazú Superior”, en la Península de Andresito (eBird: Fariña et al. 2021, Tabla 1). Es probable que estos individuos pasen las horas del día en las islas y durante la noche se dispersen en los alrededores, ya que existen registros recientes de individuos aislados en las cercanías (Tabla 1, eBird 2025).

Un área clave para la Garza Cucharona serían los arroyos (localmente llamados riachos) del sector oriental de la región chaqueña. Existen registros recientes en el río de Oro, en la provincia del Chaco, y en el riacho Pilagá, en la provincia de Formosa (López Lanús & Mencia 2017). Pero el ejemplo que mejor representa esta asociación es lo que se viene observando en el riacho Monte Lindo Grande en la provincia de Formosa. En los últimos 3 años (desde agosto de 2022) se encontró una población importante de Garza Cucharona en el riacho Monte Lindo Grande, en un tramo relativamente corto del mismo conocido como Paso Ghisla (eBird 2025). En este sector fueron observados 13 individuos por D. Almirón y H. Hulsberg el 9 de septiembre de 2022 (eBird: Almirón & Hulsberg 2022). Al día siguiente, FC encontró 18 individuos de Garza Cucharona navegando de noche a lo largo de 6 km del riacho. Los individuos estaban posados en los árboles de la densa selva ribereña del riacho. En este sector, FC encontró con facilidad a la Garza Cucharona ligada a los momentos de bajante del riacho, cuando permitía que los individuos capturaran peces en los bordes de la costa. En los momentos que el nivel del agua crece y la correntada es fuerte los individuos no encuentran lugares en el riacho óptimos para alimentarse. Bajo estas circunstancias, las garzas se alejan del riacho y pueden encontrarse en las selvas de ribera de lagunas internas y de madrejones. En los bordes y sectores playos del riacho donde se observaron individuos buscando presas, FC observó que se alimentaban de Tarariras Natas (*Hoplerhythrinus unitaeniatus*; Erythrinidae), Sábalos (*Prochilus lineatus*;

Prochilodontidae) y Mojarra (*Astyanax eremus*; Characidae). FC notó que cuando el riacho Monte Lindo Grande está bajo y asoman troncos o ramas del agua, es mucho más sencillo observar individuos. En el riacho Monte Lindo Grande, la Garza Cucharona se registró únicamente en sectores con selva costera de cobertura densa. No se registró en sectores con vegetación rala ni en aquellos dominados por palmeras Caranday (*Copernicia alba*) (FC obs. pers.). En invierno la especie se observa con frecuencia. En esta época aumenta la proporción de individuos juveniles o inmaduros, que son notablemente más mansos que los adultos y, a veces, permiten acercarse a una distancia muy corta. Los adultos, en cambio, se comportan de forma arisca sin dejar a los observadores acercarse.

La información disponible apoyaría la idea de la presencia regular de la Garza Cucharona en riachos de la región chaqueña y en el río Iguazú en el extremo norte de Misiones donde nidifica. Las poblaciones del riacho Monte Lindo Grande parecen ser saludables y de importante densidad. La escasa información sugiere la falta de relevamientos intensivos para la búsqueda de la Garza Cucharona. El hábitat donde tendría las mayores densidades ha sido poco prospectado y los hábitos reservados y nocturnos de la Garza Cucharona serían claves para la subvaloración de sus reales densidades locales. Hasta el presente, varios arroyos han recibido poca atención por parte de los investigadores, como el río de Oro, el río Salado, el Guaycurú, el Canguí Grande y el río Negro, en la provincia de Chaco. Un ejemplo que refleja la falta de búsqueda de Garza Cucharona en estos ambientes se infiere a partir de la aparición de un individuo herido en el sector noroeste de la ciudad de Resistencia (barrio Barberán), y es posible que el individuo haya provenido de los remanentes de selva del río Negro o del cercano riacho Salado (EcoRegistros 2025: Fernández 2019, Schreiber 2019, Tabla 1). Lo mismo se puede aplicar a distintos riachos de la provincia de Formosa. La aparición reciente en las selvas de ribera del río Uruguay, en la provincia de Corrientes, sugiere que la especie aún estaría presente en la cuenca de este río en el sur de Misiones. Búsquedas minuciosas en los barreros de arroyos del PN Iguazú, como los arroyos Central, Ñandú, Tacuara, Los Patos, Santo Domingo y Cataratas, serían relevantes para establecer las densidades poblacionales en el norte de la provincia de Misiones.

La compilación de registros e información que realizamos permite confirmar la presencia regular

y el estatus de nidificante de la Garza Cucharona en Argentina. Inclusive extendiendo la distribución de la especie sugerida por BirdLife International (2018) (Fig. 1). El hábitat utilizado por la especie en Argentina sería bosques en buen estado de conservación sobre riachos y arroyos del noreste de Argentina. Prospecciones futuras minuciosas en ambientes poco explorados podrían dilucidar las densidades poblacionales reales de la Garza Cucharona en el país.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Emilio White, José Calo, Justo Herrera, Omar Benítez, Marcelo Rotundo y Marcelo Cavicchia por la valiosa información de sus observaciones de campo. Sugerimos que la información sobre los registros de nidificación aportados por E. White y J. Herrera sea citada como E. White en Bodrati et al. 2026 o J. Herrera en Bodrati et al. 2026. Luis Gerardo Pagano por sus revisiones de museos. Somos gratos con Agustín Zarco por la bibliografía que nos suministró. Los estudios de campo fueron autorizados por el Instituto Misionero de Biodiversidad y el Ministerio de Ecología y RNR de la provincia de Misiones.

REFERENCIAS

- Almirón D, Hulsberg H (2022) eBird Checklist <https://ebird.org/checklist/S117383889> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 15/11/2025
- Bareiro B (2024) eBird Checklist <https://ebird.org/checklist/S198804018> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 15/11/2025
- Bareiro Guñazú L, Bareiro B (2022) eBird Checklist <https://ebird.org/checklist/S123492010> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 15/11/2025
- Belmonte DF, Aronson T (2024) eBird Checklist <https://ebird.org/checklist/S198421516> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 15/11/2025
- Bertoni A de W (1913) Contribución para un catálogo de aves argentinas. *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64–102
- BirdLife International (2018). Species factsheet: Boat-billed Heron (*Cochlearius cochlearius*). <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/boat-billed-heron-cochlearius-cochlearius>. Accedido el 15/11/2025
- Bodrati A, Cockle KL (2012) El Atajacaminos Coludo *Macropsalis forcipata* en Argentina: ¿una especie amenazada o en expansión? *Cotinga* 34: 46–54
- Braslavsky O, Muller G, Chebez JC, Rodríguez LE (2009) Hallazgo de la garza cucharona (*Cochlearius cochlearia*) en el noroeste argentino. *Nótulas Faunísticas* 33: 1–4
- Capovilla P, Meoniz P, Beltrocco E (2022) eBird Checklist <https://ebird.org/checklist/S122796372> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 15/11/2025
- Constable H, Guralnick R., Wicczorek J, Spencer C, Peterson AT, VertNet Steering Committee (2010) VertNet: a new model for biodiversity data sharing. *PLoS Biology* 8: e1000309. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1000309>. Accedido el 15/11/2025
- Contreras JR (1981) Lista preliminar de la avifauna correntina I. No Passeriformes. *Historia Natural* 3: 21–28
- Contreras JR, Berry LM, Contreras AO, Bertonatti CC, Utges EE (1990) *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Chaco. República Argentina. I. No passeriformes*. Cuadernos Técnicos Félix de Azara N°1, Corrientes
- Contreras JR, Agnolin F, Davies YE, Godoy I, Giacchino A, Ríos EE (2014) *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. I. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Chatellenaz ML (2005) Aves del valle del río Paraná en la provincia del Chaco, Argentina: Riqueza, historia natural y conservación. *INSUGEO, Miscelánea* 14: 527–550
- Chebez JC (1992) Notas sobre algunas aves poco conocidas o amenazadas de Misiones. *Boletín científico APRONA* 21: 12–30
- Chebez JC (1994) *Los que se van*. Editorial Albatros, Buenos Aires
- Chebez JC (2009) *Otros que se van*. Especies en peligro. Editorial Albatros, Buenos Aires
- Contreras JR, Agnolin F, Davies YE, Godoy I, Giacchino A, Ríos E (2014) *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina*. 1° Edición. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Di Giacomo AG, White E (2005) Estancia Guaycolec. En: Di Giacomo AS (eds). *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, pp. 193–194
- eBird (2025) eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York (URL: <http://www.ebird.org>). Accedido el 15/9/2025

- EcoRegistros (2025) Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearius*) Ficha de la especie. <https://www.ecoregistros.org/ficha/Cochlearius-cochlearius>. Accedido el 30/9/2025
- Fariña R, Casañas H, Bonano JJ, Lozano D (2021) eBird Checklist <https://ebird.org/checklist/S79098213> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 15/11/2025
- Fernández HB (2019) Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearius*). EcoRegistros: <https://www.ecoregistros.org/site/registro.php?id=933634>. Accedido el 15/11/2025
- Franzoy AV (2018a) La Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearius*) en la provincia de Corrientes, Argentina. *EcoRegistros Revista* 8(5): 14–16
- Franzoy AV (2018b) Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearius*). EcoRegistros: <https://www.ecoregistros.org/site/registro.php?id=828100>. Accedido el 15/11/2025
- Galfione F (2024) eBird Checklist <https://ebird.org/checklist/S263870258> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 15/11/2025
- Hilty SL (2003) *Birds of Venezuela Second Edition*. Princeton University Press, Princeton and Oxford
- López Lanús B (2011) Xeno-canto: <https://xeno-canto.org/107911>. Accedido el 15/11/2025
- López Lanús B, Mencia P (2017) Diversidad, abundancia y estado de conservación de las aves de los riachos Monte Lindo y Pilagá en el este de la provincia de Formosa, Argentina. *Nótulas Faunísticas* 228: 1–29
- Martínez-Vilalta A, Motis A, Kirwan GM (2020) Boat-billed Heron (*Cochlearius cochlearius*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bobher1.01>
- Martins CB, Norris D, Michalski F (2021) The Boat-Billed Heron (*Cochlearius cochlearius*) is not lunar phobic: Multi-year evidence from the eastern Brazilian Amazon. *Waterbirds* 44: 86–92. <https://doi.org/10.1675/063.044.0108>
- MAYDS & AA Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Aves Argentinas (2017) *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). *Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas*, edición electrónica. CABA, Argentina
- Monges P (2016) eBird Checklist <https://ebird.org/checklist/S30821519> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 15/11/2025
- Moschione F (2005) El Cachapé. En: Di Giacomo AS (eds). *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, pp. 90
- Moya SE (2020) Garza cucharona (*Cochlearius cochlearius*) en Parque Nacional Iguazú, Misiones. *Nuestras Aves* 65:67. <https://doi.org/10.56178/na.vi65.147>
- Olrog CC (1979). Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1–324
- Partridge WH (1953) Nuevos hallazgos de la Garza Pico Cuchara en la Argentina. *Hornero* 10: 88–89
- de la Peña MR (2023) *Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución (Actualización)*. Tomo 6 *Spheniscidae, Diomedidae, Procellariidae, Hydrobatidae, Pelecanoididae, Ciconiidae, Fregatidae, Sulidae, Phalacrocoracidae, Anhingidae, Pelecanidae, Ardeidae, Threskiornithidae*. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), Santa Fe
- do Rosário LA (1996) *As Aves em Santa Catarina: Distribuição Geográfica e Meio Ambiente*. FATMA, Florianópolis, Brazil
- Saibene CA, Castelino MA, Rey NR, Herrera J, Calo J (1996) *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. L.O.L.A., Buenos Aires, Argentina
- Salcedo R (2025) eBird Checklist <https://ebird.org/checklist/S242642494> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 15/11/2025
- Santiago PS (2025) eBird Checklist <https://ebird.org/checklist/S257008120> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 15/11/2025
- Schreiber H (2019) Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearius*). EcoRegistros: <https://www.ecoregistros.org/site/registro.php?id=933642>. Accedido el 15/11/2025
- Villafañe L (2025) eBird Checklist <https://ebird.org/checklist/S261522589> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 15/11/2025
- Wetmore A (1965) The birds of the Republic of Panamá: Part 1.—Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). *Smithsonian Miscellaneous Collections* 150: 1–483
- White E (2001) Guaycolec, un refugio muy particular. *Naturaleza y Conservación* 8: 28–31
- Xeno-Canto (2025) Xeno-canto Foundation, Amsterdam (URL: <https://www.xeno-canto.org>) Accedido el 15/9/2025
- Zotta AR (1942) Notas ornitológicas. *Hornero* 8: 171–178