NUESTRAS AVES Número 71 · Diciembre 2026
Artículo
doi.org/10.56178/na.v71i.1215

Este trabajo fue revisado por pares y un comité científico, y ha sido aceptado para su publicación en la revista Nuestras Aves. Sin embargo, aún no ha sido modificado para su publicación final, por lo que esta versión y la final podrían no ser iguales.

EL LECHUZÓN NEGRUZCO (*Asio stygius*): UNA SOMBRA DE POBLADOS Y URBES DEL NORESTE ARGENTINO

THE STYGIAN OWL (*Asio stygius*): A SHADOW OF TOWNS AND CITIES IN NORTHEASTERN ARGENTINA

Alejandro Bodrati[1]*, Nestor Fariña[1,2], Dante G. Moresco[3] & Facundo G. Di Sallo[1,4]

[1]Proyecto Selva de Pino Paraná, San Pedro (3352), Misiones, Argentina
[2]Reserva Natural Provincial Rincón Santa María, Dirección de Parques y Reservas, Corrientes, Argentina
[3]Vasco de la Carretilla 69, Puerto Iguazú, Misiones (3370), Argentina
[4]Instituto de Biología Subtropical, CONICET- Facultad de Ciencia Forestales (Universidad Nacional de Misiones), Tres Fronteras 183, Puerto Iguazú (3370), Misiones, Argentina
*alebodrati@gmail.com

RESUMEN: En Argentina, el Lechuzón Negruzco (*Asio stygius*) ha sido considerado una especie muy rara y poco conocida. A partir de la recopilación de registros y de trabajo de campo, encontramos que su distribución en el noreste argentino es más amplia de lo que se suponía. Sin embargo, su abundancia varía entre regiones: en Corrientes y en la ecorregión Chaqueña la especie sería naturalmente rara, mientras que la mayoría de los registros provienen de Misiones. Dentro de esta provincia, los registros se concentran en áreas urbanas y son escasos en selvas conservadas, lo que sugiere que la especie podría beneficiarse de la transformación de la selva en áreas urbanas, donde los recursos son abundantes y la competencia es baja, ya que su dieta estaría compuesta por aves adaptadas a ambientes altamente modificados. No obstante, en los poblados existen mortandades por personas (compilamos 12 casos) que la cazan esencialmente por creencias que vinculan a las lechuzas con malos augurios. Nuestros resultados sugieren que debería revisarse la categoría "Vulnerable" propuesta para Argentina considerando la información que reportamos.

PALABRAS CLAVE: *áreas urbanas, Argentina, dieta, mortandad, Strigidae, supersticiones*

ABSTRACT: In Argentina, the Stygian Owl (*Asio stygius*) has been considered a very rare and poorly known species. Based on a compilation of records and fieldwork, we found that its distribution in northeastern Argentina is broader than previously thought. However, its abundance varies among regions: in Corrientes and the Chaco ecoregion the species appears to be naturally rare, whereas most records come from Misiones province. Within this province, records are concentrated in urban areas and are scarce in well-preserved forests, suggesting that the species may benefit from the conversion of forest into urban areas, where resources are abundant and competition is low, since its diet would consist of birds adapted to highly modified environments. Nevertheless, in urban areas the species may suffer substantial human-caused mortality (12 compilated cases), as people kill it mainly because of beliefs that associate owls with bad omens. Our results suggest that the "Vulnerable" category proposed for Argentina should be reviewed in light of the information we report in this work.

KEYWORDS: *Argentina, diet, mortality, Strigidae, superstitions, urban areas*

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0

INTRODUCCIÓN

El Lechuzón Negruzco (*Asio stygius*) es un estrígido ampliamente distribuido en el Neotrópico con rango discontinuo o fragmentado (Arizmendi et al. 2020), lo que podría reflejar falta de trabajo de campo en muchos sectores de su inmenso rango (Schmitt et al. 2013). Con seis subespecies, su geonemia abarca desde Texas, en el extremo sudeste de Estados Unidos, el norte de México, y por Centroamérica e Islas del Caribe hasta la porción norte del cono sur de Sudamérica (Rodríguez-Ruiz & Herrera-Herrera 2009). En Sudamérica se distribuye desde Colombia a Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, el este y sudeste de Brasil y norte de Argentina (König & Weick 2010, De la Peña 2025). En Argentina habitarían dos subespecies en el noroeste y noreste. La subespecie *A. s. barberoi* se distribuiría en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa (Bertoni 1930, Nores et al. 1991, Chebez et al. 1999, Bodrati 2004, Bodrati et al. 2006, Coria et al. 2021, De la Peña 2025). La subespecie nominal, *A.* s. *stygius* habitaría el noreste en las provincias de Corrientes y Misiones (Partridge 1954, Bodrati 2004, Chebez 2009, Bodrati et al. 2010, 2012, De la Peña 2025). La validez de la subespecie *A. s. barberoi* es dudosa; Pinto & Camargo (1948) y Partridge (1954) postularon que esta subespecie sería sinónimo de *A. s. stygius.* Sin embargo, esta propuesta de invalidación no ha sido considerada en trabajos posteriores, y consecuentemente su estatus taxonómico aún no ha sido resuelto.

En Argentina, el Lechuzón Negruzco fue considerado durante décadas una especie extremadamente rara y poco conocida (Olrog 1985, Chebez 1994, 2009), y su estado de conservación fue recientemente evaluado, categorizándose como Vulnerable (MAyDS & AA 2017). Esta situación no sería exclusiva del país, donde, a pesar de su gran tamaño, su amplia distribución en las Américas y su presencia en ambientes antrópicos variados, se conoce muy poco sobre su hábitat, dieta y nidificación (Arizmendi et al. 2020).

En este trabajo discutimos la distribución y aspectos de la historia natural como la dieta, reproducción, y la relación y percepciones de las personas hacia este lechuzón en el nordeste de Argentina. Sugerimos que se adaptó y colonizó pueblos y distintas áreas urbanas donde podría evitar la competencia con otros grandes estrígidos que se restringen a ambientes continuos de selva nativa. Comentamos el hallazgo de dos nidos en temporadas consecutivas dentro del ejido urbano del pueblo de San Pedro. Es plausible pensar que allí el Lechuzón Negruzco encuentra sitios aptos para nidificar y abundancia de presas que obtendría con facilidad en ambientes transformados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtuvimos registros e información de historia natural del Lechuzón Negruzco en base a: a) relevamientos ornitológicos generales, b) búsquedas enfocadas con playback, c) revisión de colecciones, literatura y bases de datos. Tanto para los relevamientos como para las búsquedas con playback, realizamos observaciones con prismáticos y grabaciones de audio (grabadoras Marantz PMD-222, y Zoom H4N Pro, con micrófonos Sennheiser ME66).

Para los Relevamientos ornitológicos generales (a) realizamos trabajo de campo en la provincia de Misiones, Argentina, en julio de 1992 (12 días), en febrero y marzo de 1997 (9 días), en febrero de 2000 (10 días) y luego, de forma regular, entre octubre de 2003 y febrero de 2026. Durante este período, abarcamos 3500 días de trabajo de campo dedicados a la búsqueda y observación de aves en más de 70 localidades del norte, centro y sur de Misiones. Realizamos un mayor esfuerzo en sitios principales como el Parque Provincial (PP) Cruce Caballero, la propiedad Forestal Belga (Paraje Las Ratas), el pueblo de San Pedro y el PP Araucaria. AB vivió de forma permanente en el pueblo de San Pedro entre octubre de 2003 y agosto de 2022. GDM y FDS residen en Puerto Iguazú desde 2009 y febrero de 2021, respectivamente. Además, realizamos relevamientos en caminos, áreas rurales y diferentes obrajes de la Reserva de Biosfera Yaboty; sumando áreas protegidas como el PP Caá Yarí, PP Esmeralda, Área Experimental y Reserva de Usos Múltiples Guaraní (AERUM). En el Parque Nacional (PN) Iguazú, DGM realizó relevamientos generales entre junio de 2009 y septiembre de 2025, dedicando unos 4300 días a la observación de aves, principalmente en el límite oeste del parque con enfoque particular en los senderos Yacaratiá y Macuco, en la ex ruta N° 12 camino a Camping Ñandú y la ruta 101. En el PP Cruce Caballero, AB, FDS y otros ornitólogos experimentados con las voces del Lechuzón Negruzco acamparon de septiembre a diciembre durante el período 2006–2019, trabajando principalmente con nidos en cavidades de árboles y buscando aves y nidos en general (Bodrati et al. 2010; Cockle & Bodrati 2017; Cockle et al. 2024).

En la región chaqueña hicimos relevamientos ornitológicos de campo distribuidos de manera hetero-

Aceptado para publicación

génea a lo largo de las estaciones y años entre febrero de 1997 y marzo de 2020 en varios sectores de las provincias de Chaco y Formosa. Los mayores esfuerzos de muestreo se realizaron en el PN Chaco, en los departamentos de Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral (26°47'S, 59°39'O, alrededor de 1000 días de campo), y en el PP Pampa del Indio, en el departamento de Libertador General San Martín (26°15'S, 59°59'O, 100 días de campo). Hicimos relevamientos en la Estancia La Fidelidad, departamento General Güemes (25°03'S, 60°52'O, actualmente PN Impenetrable) entre el 24 al 30 de mayo de 2013 y entre el 25 al 29 de junio 2025; 3 días en Puerto Antequera, departamento 1°de Mayo, valle aluvional de los ríos Paraguay y Paraná (ruta Nicolás Avellaneda RN 16; 27°26'S, 58°51'O; 12 de diciembre de 1998 y 12–13 de noviembre de 1999); 8 días en Estancia Laguna Corá y río Tragadero, límite entre departamentos San Fernando y 1° Mayo (27°25'S, 58°52'O; 6–14 de noviembre de 1999); y 24 días en Isla del Cerrito, departamento Bermejo (27°17'S, 58°37'O; 22–24 de noviembre de 1998, 14–15 de mayo de 1999, 16–19 de enero de 2001, 6–7 agosto 2016, 21–29 enero 2017, 20 diciembre 2018, 12–14 diciembre 2019). Adicionalmente, entre 2016 y 2020 realizamos recorridas esporádicas que involucraron distintos ambientes (palmares, bosques de quebracho, selvas en galería de ríos y riachos) entre las localidades de Las Garcitas (26°36'S, 59°49'O), Capitán Solari (26°45'S, 59°33'O), Resistencia (26°45'S, 58°55'O), San Martín (26°32'S, 59°17'O) y Pampa del Indio (26°15'S, 59°57'O). Realizamos relevamientos de aves durante 12 días en el este de la provincia de Formosa, particularmente en el PN Río Pilcomayo, departamento Pilcomayo (25°28'S, 57°58'O; 10–19 de julio de 1995) y Estancia La Marcela, departamento Pirané (26°17'S, 59°08'O; 28–31 de agosto de 2013).

En la provincia de Corrientes buscamos aves en las localidades de: Yapeyú, y desembocadura del arroyo Guaviraví en el río Uruguay, dpto. San Martín (29°29'S, 56°50'O: 8 h entre el 4 y 5 de diciembre de 2010, 6 h entre el 19 y 20 de octubre de 2011, 18 h del 5 al 7 de octubre de 2017, 15 h del 28 al 30 enero de 2018, 10 h del 14 al 15 de junio de 2018, 10 h del 27 al 28 julio 2018, 14 h del 29 al 31 de enero de 2019, 22 h entre el 19 y el 22 de agosto 2022); Alvear, dpto. General Alvear, (29°06'S, 56°33'O: 3 h el 17 de septiembre de 2016, 4 h el 27 de enero de 2019, 2 h el 24 de junio de 2019), La Cruz, dpto. San Martín (29°11'S, 56°38'O: 3 h el 10 de septiembre de 2016, 2 h el 23 de junio de 2019, 3 h el 20 de enero de 2010); Reserva Natural Municipal Tajy Poty sobre el borde sur de la ciudad de Santo Tomé, dpto. diciembre de 2010, 3 h el 14 septiembre de 2016, 30 min el 28 de febrero de 2010); Colonia Garabí, dpto. Santo Tomé, (28°14'S, 55°46'O: 4 h el 20 de enero de 2008, 3 h el 1 de agosto de 2009, 10 h del 20 al 21 de enero de 2017); Garruchos, dpto. Santo Tomé, (28°10'S, 55°38'O: 15 h del 14 al 16 de septiembre de 2016); arroyo Chimiray, dpto. Santo Tomé, (28°08'S, 55°08'O: 3 h el 13 de septiembre de 2016, 4 h el 16 de septiembre de 2016); Establecimiento Las Marías, dpto. Santo Tomé, (28°05'S, 56°03'O: 23 h entre el 6 y el 8 de abril de 2022). Adicionalmente, incluimos observaciones realizadas en la Isla Apipé Guazú, dpto. Ituzaingó entre el 12 y el 16 de octubre de 1999 (27°33'S, 56°52'O, 35 h). En la Reserva Natural Rincón de Santa María (RNRSM), Ituzaingó (27°31'S, 56°36'W; detalles del área de estudio en Fariña et al. 2018), desde 2009 a 2026, NF residió en el área y está familiarizado con las vocalizaciones del Lechuzón Negruzco, donde llevó a cabo además relevamientos ornitológicos, incluyendo prospecciones nocturnas (Villalba et al. 2024). NF trabajó en campañas nocturnas de captura y anillado de caprimúlgidos durante 687 salidas nocturnas y en 17 años no se registró al lechuzón negruzco en la Reserva (RNRSM).

En relación a (b) Búsquedas enfocadas con playback ad libitum, la metodología no fue consistente a lo largo de los sitios y años de muestreo. Entre 2003 y 2025 hicimos búsquedas en diversos sectores del norte y centro de Misiones, en sectores de selva Atlántica degradada, selva primaria y secundaria, pequeños parches remanentes y selva en buen estado de conservación, usando playback con grabaciones comerciales (Hardy et al. 1999) y de voces grabadas por los autores en Misiones (Bodrati 2011, Bodrati & Di Sallo 2020, Bodrati 2020). En el norte de Misiones, usamos playback del Lechuzón Negruzco en PP Urugua-í y PN Iguazú entre 2007–2011. En el centro de Misiones, usamos playback entre 2003 y 2019. Estas búsquedas en el centro de Misiones las realizamos en muchos sectores de la Reserva de la Biosfera Yaboty: el PP Caá Yarí, Área Experimental y Reserva de Usos Múltiples Guaraní, Reserva Natural Cultural Papel Misionero (RNC), PP Esmeralda y distintos puntos sobre las rutas provinciales 21, 15 y 16. También realizamos playback en PP Cruce Caballero y chacras en áreas rurales del departamento de San Pedro, como el paraje Santa Rosa, paraje Piñeiro, paraje Polvorín, PP de la Araucaria y alrededores del sector urbano de San Pedro (Tabla 1). No realizamos búsquedas orientadas con playback en la región chaqueña. Eventualmente, NF realizó búsquedas con playback de la especie en la RNRSM.

Aceptado para publicación

Tabla 1. Localidades con registros de Lechuzón Negruzco (*Asio stygius*) en el noreste argentino. MACN = Museo Argentino de Ciencias Naturales, LACM = Los Angeles County Museum, INTA = Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, NR = Reserva Natural, PP = Parque Provincial, PN = Parque Nacional, PF = Parque Federal, RC = Reserva Compensatoria, AERUM = Área Experimental y Reserva de Usos Múltiples, RNC = Reserva Natural Cultural, RS = Reserva Nacional, Es = Estación, RP = ruta Provincial, RN = ruta Nacional. Se enumeran las localidades con presencia de Lechuzón Negruzco. Seguidos de cada localidad se listan sus registros ordenados cronológicamente.

Table 1. Localities with records of Stygian Owl (*Asio stygius*) in northeastern Argentina. MACN = Argentine Museum of Natural Sciences, LACM = Los Angeles County Museum, INTA = National Institute of Agricultural Techniques, NR = Natural Reserve, PP = Provincial Park, PN = National Park, PF = Federal Park, RC = Compensatory Reserve, AERUM = Experimental Area and Multiple Use Reserve, RNC = Cultural Natural Reserve, RC = Compensatory Reserve, RS = Reserve National, Es = Station, RP = provincial route, RN = national route. The localities with Stygian Owl presence are listed. Following each locality, its records are listed in chronological order.

N	Localidad, departamento (coordenada geográfica)	Sitio específico	Fecha	Ambiente	Sexo/N° individuos	Observadores/ Tipo y detalles del registro	Fuente
MISIONES							
	"Misiones"		Sin detalles				Dabbene (1910)
1	Tobuna, (San Pedro) 26°27'S 53°54'O		7 febrero 1952	Selva atlántica con Araucaria	♀	Partridge piel (MACN 33511)	Partridge (1954)
			8 febrero 1952	Selva con Araucaria	♂	Partridge piel (MACN 33512)	Partridge (1954)
			6 marzo 1952	Selva con Araucaria	♀	Partridge piel (MACN 33513)	Partridge (1954)
			12 junio 1959	Selva con Araucaria	♂	Partridge piel (LACM 47301)	Vernet: Mertz et al. (2025)
			15 julio 1959	Selva con Araucaria	♂	Partridge piel (LACM 47302)	Vernet: Mertz et al. (2025)
			16 septiembre 1959	Selva con Araucaria	♀	Partridge piel (LACM 47303)	Vernet: Mertz et al. (2025)
			16 septiembre 1959	Selva con Araucaria	♂	Partridge piel (LACM 47304)	Vernet: Mertz et al. (2025)
	Tobuna, (San Pedro) 26°28'S 53°53'O	Remanente de selva	13 y 14 febrero 2005	Remanente de selva con Araucaria, rodeado de chacras	Dos individuos	AB, oídos y observados	Este trabajo
2	Es. INTA y RS San Antonio, (Gral Manuel Belgrano) 26°02'S 53°48'O	Pinar sector administración	1994 y 1996	Araucarias en parquizado y viejas plantaciones de araucaria	2-4 individuos	Fotos, y observaciones	Chebez et al. (1998)
		Araucarias en parquizado	3 al 10 junio 2004	Parquizado con araucarias y plantaciones de araucarias	Hasta 4 individuos a diario	AB, Oídos y observados	Bodrati et al. (2012), este trabajo
		Araucarias en parquizado	7 y 8 enero 2017	Araucarias en parquizado	2 individuos	Moresco DG Oídos y observados	eBird: Moresco (2017)
3	PP Araucaria, (San Pedro) 26 °37'S 54°05'O		11 y 12 marzo 1997	Selva en recuperación con Araucarias emergentes	Un individuo	AB y G Bodrati oído y observado	Bodrati (2004)
			14 mayo 1997	Selva secundaria con Araucarias	Un individuo	J Mazar Barnett grabado	Hardy et al. (1999)
			Septiembre 2000 a abril 2002	Selvas secundarias con Araucarias	Individuos	E Krauczuk, J Baldo	Krauczuk & Baldo (2004)
4	PP Esmeralda, (San Pedro) 26°54'S 53°53'O		15 enero 2001	Selvas secundarias y capuera baja	Dos individuos observados	E Krauczuk	Wioneczak et al. (2021)
5	San Pedro, (San Pedro) 26°37'S 54°06'O	Ejido urbano	octubre 2003 a agosto 2022	Área urbana y periurbana	Parejas, juveniles, nidos	AB, NF, FDS registros reiterados anuales, grabados, fotografiados	Bodrati (2020), Pradier (2017), Wioneczak et al. (2023) Este trabajo

Aceptado para publicación

N	Localidad, departamento (coordenada geográfica)	Sitio específico	Fecha	Ambiente	Sexo/N° individuos	Observadores/ Tipo y detalles del registro	Fuente
5	San Pedro, (San Pedro) 26°37'S 54°06'O	Ejido urbano	25 mayo 2017	Área periurbana con araucarias	Un individuo	Pradier LS grabación	Xeno-canto: Pradier (2017)
		Complejo Der Wald	28 mayo 2017	Área periurbana con araucarias	Un individuo	Wioneczak MJ grabación	Wioneczak et al. (2023), Wioneczak (2025)
6	San Vicente, (Guaraní) 26°59'S 54°28'O	Ejido urbano	10 julio 2004	Área urbana	Un individuo	AB Oído	Este trabajo
		Ejido urbano	26 julio 2023	Periferia de área urbana. Pinar y remanente de selva.	Un individuo	FDS oído y visto	Este trabajo
7	AERUM Guaraní, (Guaraní) 26°56'S 53°13'O	Alrededor casa de Guardaparques	19 julio 2004	Parquizado rodeado de selva secundaria	Un individuo	Oído en vuelo, AB, NF	Este trabajo
			17 y 18 septiembre 2005	Selva secundaria con "enriquecimiento" de exóticas	Dos individuos	AB grabaciones	Este trabajo
8	PP Cruce Caballero, (San Pedro) 26°30'S 53°59'O	Bordes del parque	Registrado de manera esporádica entre 2004 y 2022	Bordes de selva y área rural de la periferia del área protegida	En general 1 individuo	Oído y grabado	Bodrati et al. (2010), este trabajo
9	Reserva Yaguaroundí, (Guaraní) 26°41'S 54°16'O	Sector de entrada de la reserva	28 mayo 2005	Volando sobre capuera, y sectores desmontados del borde de la reserva	Individuo vocalizando	AB, oído	Este trabajo
10	PP Moconá, (San Pedro) 27°09'S 53°54'O	Borde de selva junto a antigua pista de aterrizaje	18 octubre 2005	Selva secundaria	Un individuo oído y grabado	AB, oído	Este trabajo
11	RNC Papel Misionero, (Guaraní) 26°57'S 54°12'O	Borde sur de la reserva	8 febrero 2007	Capuera y borde de selva	Individuo en vuelo	Al crepúsculo, oído en desplazamiento, AB	Este trabajo
12	Colonia La Flor, (Guaraní) 27°00'S 54°08'O	Área rural	9 febrero 2007	Chacras y remanentes forestales nativos	Un individuo	AB, oído	Este trabajo
13	Parque Natural Municipal Monte Seguín (General San Martín) 26°48'S 55°01'O		Entre 2007 y 2012	Asentamientos humanos	Sin detalle	Sin detalle	Martínez Gamba (2014)
14	Eldorado, (Eldorado) 26°22'S 54°36'O	Área periurbana	18 abril 2008	Área Urbana	Dos individuos	AB, oidos	Este trabajo
		Área urbana, Av. San Martín	13 julio 2014	Área urbana	Individuo herido	Torresin J, encontrado herido	Wioneczak et al. (2021)
	26°24'S 54°35'O	Km 10	28 marzo 2024	Área urbana	Un individuo	Grabado por Mariano Lima	Este trabajo
15	Puerto Libertad, (Iguazú) 25°55'S 54°34'O	Área urbana	5 abril 2011	Área residencial	Un individuo	Grabado	Bodrati et al. (2012)
16	Posada Puerto Bemberg, Puerto Libertad, (Iguazú) 25°54'S 54°37'O	Edificios y parquizado costa del río Paraná	7 abril 2011	Remanentes de selva muy reducidos y área de parquizado con pinos exóticos	Un individuo	Oído	Bodrati et al. (2012)
17	PP Caá Yarí, (Guaraní) 26°53'S, 54°14'O		16 mayo 2011	Capuera de cerca de límite del parque	Dos individuos	Oídos y grabados	Este trabajo

Aceptado para publicación

N	Localidad, departamento (coordenada geográfica)	Sitio específico	Fecha	Ambiente	Sexo/N° individuos	Observadores/ Tipo y detalles del registro	Fuente
17	26°52'S 54°13'O	RP 15 (Guaraní)	31 agosto 2025	Sector de amplia capuera	Un individuo	Fotos, Ziruffo & Moya	eBird: Ziruffo & Moya (2025)
18	Santa Ana, (Candelaria) 27°23'S 55°35'O	Ruinas Jesuíticas de Santa Ana)	27 marzo y 7 septiembre 2012	Área antrópica	Uno y dos respectivamente	Sader D Grabados y observados	Wioneczak et al. (2021)
19	Colonia Taranco, (Apóstoles) 27°46'S 55°35'O		2 diciembre 2012	Hilera de pinos exóticos	Un individuo	E Krauczuk & Meller D fotografiado	Wioneczak et al. (2021)
20	Posadas, (Capital) 27°24'S 55°56'O		4 mayo 2015, 12 agosto 2020	Área urbana	Dos individuos capturados	Martínez A Individuo herido y muerto	Wioneczak et al. (2021)
21	Concepción de la Sierra, (Concepción) 28°03'S 55°30'O	Área urbana	10, 11 y 12 septiembre 2016	Poblado	Cuatro individuos	AB & Pagano L, fotografiados	Este trabajo
			12 septiembre 2017	Monocultivo de pinos exóticos	Tres individuos, joven y adultos		Wioneczak et al. (2021)
22	Puerto Azara, (Apóstoles) 28°07'S 55°37'O	Área urbana	17septiembre 2016	Poblado	Un individuo	AB & Pagano L, oído y observado	Este trabajo
23	Puerto Esperanza (Iguazú) 26°17'S 54°39'O	Barrio Industrial	11 enero 2017	Pinar	Un individuo	fotografiado	Martínez (2017)
		Forestación de pino, rumbo al Club de Pesca	11 junio 2025	Pinar	Un individuo	Oído y observado DGM & Bertolini	eBird: Moresco (2025b)
24	Oberá, (Oberá) 27°28'S 55°05'O	Área urbana	30 octubre 2017	Área peri-urbanizada	Dos adultos	AB & Pagano L, grabados	Este trabajo
25	Montecarlo 26°34'S 54°44'O	Área urbana	4 noviembre 2017	Área urbana	Un individuo	AB, L Pagano, oído y observado	Este trabajo
	(Montecarlo) Colonia Itacuruzú	Pinares (*Pinus* sp.)	30 septiembre 2019	Forestación de pino exótico	Un individuo	DGM Oído y observado	eBird: Moresco (2019)
	(Montecarlo) Colonia Guatambú	Parquizado de Instituto de Enseñanza Agropecuaria	16 mayo 2024	Parquizado con árboles dispersos	Un individuo	DGM Oído y observado	eBird: Moresco (2025)
26	Fracrán, (Guaraní) 26°51'S 54°13'O		1 abril 2019	Selva secundaria con araucaria en área periurbana	Un individuo	Wioneczak, Krause LO, fotos, grabaciones	Wioneczak et al. (2021), Wioneczak (2019)
			12 agosto 2020	Área urbana	Individuo	Wioneczak J fotografiado	Wioneczak et al. (2021)
27	Puerto Iguazú, (Iguazú) 25°36'S 54°35'O	Predio de Prefectura, área urbana, calle Tres Fronteras	26 julio 2019	Área urbana, parquizado con árboles altos exóticos y nativos	Un individuo	Oído FDS	Este trabajo
		Área urbana Calle San Lorenzo S/N	23 enero 2020, 16 enero 2024, 14 diciembre 2024	Área urbana	Un individuo	DGM, fotografiado	eBird: Moresco (2020, 2024)
		Calle Primero de mayo 862	25 noviembre 2021	Área urbana	Un individuo	Oído FDS	Este trabajo
		Calle Catamarca 983	6 mayo 2022	Área urbana	Un individuo	DGM Oído y observado	eBird: Moresco 2022
		Av. Libertad	5 febrero 2024	Área urbana, eucaliptal	Un individuo	DGM Oído	eBird: Moresco (2024a, b, c, d)
28	Forestal Belga (Las Ratas) (San Pedro) 26°32'S 53°46'O	Inmediaciones arroyo Persiguero	12 y 14 octubre 2019	Selva ribereña rodeada de capueras y selvas muy degradadas	Un individuo	Vera M & Brunetti A, fotos	López- Lanús et al. (2020)

Aceptado para publicación

N	Localidad, departamento (coordenada geográfica)	Sitio específico	Fecha	Ambiente	Sexo/N° individuos	Observadores/ Tipo y detalles del registro	Fuente
28	Forestal Belga (Las Ratas) (San Pedro) 26°32'S 53°46'O	Arroyo Persiguero	23 octubre 2019	Selva ribereña rodeada de capueras y selvas muy degradadas	Un individuo	López- Lanús grabación	López- Lanús et al. (2020)
		Casco de la propiedad	2019-2021	Sector parquizado con Araucarias grandes	Uno o dos individuos	AB	Este trabajo
29	PN Iguazú (Iguazú) 25°39'S 54°27'O	Salto Arrechea	6 noviembre 2019 y 17 enero 2020	Selva baja y abierta con tacuarales	Un individuo	Oído y observado	Cavicchia & Moresco (2022)
30	PP Teyú Cuaré, (San Ignacio) 27°17'S 55°35'O		12 febrero 2020	Capuera y selva secundaria	Dos individuos	AB, oídos	Este trabajo
31	PF Campo San Juan, (Candelaria) 27°23'S 55°39'O	Sector de acceso al área protegida	13 febrero 2020	Isletas de bosque de Urunday (*Astronium balansae*) inmersas en pastizales	Un individuo	AB, oído	Este trabajo
32	Paraje Tacuaruzú, (Candelaria) 27°37'S 55°37'O		23 febrero 2020	Área periurbana	Un individuo	AB & Pagano L	Este trabajo
33	Reserva Natural Osununú, (San Ignacio) 27°17'S 55°35'O		2 y 23 julio 2020	Selva bien conservada	Un individuo	Grabaciones, Flores R	Wioneczak et al. (2021), Flores (2025)
			23 julio 2020	Selva bien conservada	Un individuo	Grabado por Flores R	Wioneczak et al. (2021)
34	RP 21, Reserva de Biosfera Yaboty (San Pedro) 27°01'S 54°02'O		9 julio 2022	Selva secundaria y Eucaliptal	Un individuos	Hollmand F fotografiado	eBird: Hollmann (2021)
35	Bonpland, (Candelaria) 27°28'S 55°30'	Acceso al cementerio	Agosto 2022	Pinar (*Pinus elliotii*)	Volantón en el piso	Fotografiado por Sebastian Sosa	Este trabajo
			Septiembre 2023	Pinar	Un individuo	Grabado por Jorge Sosa	Este trabajo
36	Camping Don Juan, Campo Grande (Cainguás) 27°12'S 54°59'O		29 agosto 2023	Matriz productiva con yerbales, pinares y remanentes de selva	Un indiviudo	FDS, Oído y visto	Este trabajo
37	RN 12 (Iguazú), 25°50'S 54°33'O	Cartel Arauco	11 enero y 4 agosto 2023, 21 marzo 2025	Faja de selva rodeada de plantaciones exóticas	Un individuo	DGM & Srur Esteche M, Moresco & Bertolini	eBird: Moresco (2023), (Moresco 2025a)
38	Puerto Bossetti, (Iguazú), 25°50'S 54°34'O	Barrio Industrial	24 marzo 2024	Forestación de araucarias	Un individuo	DGM fotos	eBird: Moresco & Esteche (2024)
39	Comandante Andresito, (Gral Belgrano) 27°40'S 54°03'O	Viviendas de Parques Nacionales	16 junio 2025	Área urbana	Un individuo	Fotografiado por Antunez M	Este trabajo
CORRIENTES							
40	RC Isla Apipé Grande, (Ituzaingo) 27°34'S 56°42'O	Sector sudeste	14 octubre 1999	Isleta de selva rodeada por pastizal	Un individuo	AB, oído y observado	Bodrati (2004)
41	Gobernador Virasoro (Santo Tomé) 28°02'S 56°00'O	Área urbana	9 septiembre 2016	Poblado	Un individuo	Pagano L oído y observado	Este trabajo
		Ejido urbano	2 diciembre 2020	Baldío en el poblado	Un adulto aturdido luego de tormenta	Fotografiado	Villordo & Chatellenaz (2025)

Aceptado para publicación

N	Localidad, departamento (coordenada geográfica)	Sitio específico	Fecha	Ambiente	Sexo/N° individuos	Observadores/ Tipo y detalles del registro	Fuente
42	Establecimiento Villa Cándida (Santo Tomé) 27°59'S 56°05'O	15 km al norte de Gobernador Virasoro	27 julio 2018	Posado en un árbol	Un adulto	Fotografiado y filmado	Villordo & Chatellenaz (2025)
43	San Alonso, RN 14 (Santo Tomé) 27°56'S 55°59'O		8 octubre 2024	Isleta de monte rodeada de plantaciones	Un individuo Herido	Alegre fotografiado	eBird: Alegre (2024)
44	Santo Tomé, (Santo Tomé) 28°33'S 56°02'O	Pueblo, Plaza San Martín	13 julio 2025	Área urbana	Un individuo	Regis V, fotos	eBird: Regis (2025)
45	Establecimiento Las Marías, (Santo Tomé) 28°06'S 56°03'O	Sector El Playado	25 octubre 2022	Interior de plantación de Pinus taeda alta y densa	Un adulto	Fotografiado	Villordo & Chatellenaz (2025)
			13 enero 2025	Colisionó con alambrado, quedando enganchado, poco después murió	Juvenil	Fotografiado	Villordo & Chatellenaz (2025)
		Casco	16 octubre 2025 y 3 diciembre 2025	Casco del establecimiento, casas y arboledas	Un adulto y juvenil	Alegre MA fotografiado	eBird: Alegre (2025)
46	Colonia Liebig Ituzaingó 27°54'S 55°49'O	Ejido urbano	Entre 2022 y 2025	Oído reiteradamente en el Poblado	Un individuo	Grabado	Villordo & Chatellenaz (2025)
47	Bosques del Plata, Ruta provincial 40 (Gral Alvear) 28°27'S 56°27'O	Cerca del río Aguapey	12 octubre 2023	Campamento forestal del predio	Dos pichones, vistos incluso un año después	Fotografiados	Villordo & Chatellenaz (2025)
CHACO							
48	Riacho Bermejito, (General Guemes) 25°38'S 60°11'O		julio 1996, foto el 2 agosto 1996	Sector del Impenetrable, derivado al Zoológico de Sáenz Peña	Un adulto, y juvenil muerto	Individuo ingresado en el Zoológico	Chebez et al. (1999)
49	PP Pampa del Indio, (Gral San Martín) 26°15'S 60°00'O	Sector de acampe	29 y 30 noviembre de 1999	Selva en galería riacho Nogueira	Un individuo	AB, oído y observado	Bodrati (2004)
		Sector de acampe	8 diciembre 2022	Sectores de selva ribereña y monte fuerte	Dos individuos	Bareiro Guiñazú L & Got N grabado, fotos	eBird: Bareiro Guiñazú & Got (2022)
	26°12'S 60°00'O		14 octubre 2023	Borde de monte fuerte	Un individuo	Bareiro Guiñazú L & Got N, fotos	eBird: Bareiro Guiñazú & Got (2023)
			8 julio 2016	Borde de monte fuerte	Un individuo	Juszczuk D, foto	eBird: Jusczuk (2016)
50	Estancia Laguna Corá, (San Fernando) 27°24'S 58°53'O		8 diciembre 1999	Angosta selva riparia de Albizia inundata	Un individuo	AB, observado de día	Bodrati (2004)
51	PN Chaco, (Sargento Cabral) 26°45´S 59°36´O		4 agosto 2004	Abras de pastizal, parches de bosque bajo	Un individuo muerto	Fotografiado	Bodrati et al. (2006)
	26°47´S 59°37'O		12 enero 2010	Borde de selva del río Negro y abra com pastizales	Un individuo	Oído y grabado, Pagano L & AB	Este trabajo
	PN Chaco periferia, Establecimiento Los Quebrachos, Capitán Solari (Sargento Cabral) 26°48'S 59°35'O		10 septiembre 2018	Matriz productiva de campos ganaderos y remanentes de selva en galería y quebrachales	Un individuo	FDS, oído y visto	Este trabajo

Aceptado para publicación

N	Localidad, departamento (coordenada geográfica)	Sitio específico	Fecha	Ambiente	Sexo/N° individuos	Observadores/ Tipo y detalles del registro	Fuente
52	Presidencia La Plaza, (Presidencia La Plaza) 27°00'S 59°51'O		5 diciembre 2018	Ejido urbano	Un individuo	FDS, oído y visto	Este trabajo
FORMOSA							
53	PN Río Pilcomayo, (Pilcomayo) 25°10'S 58°07'O	Dos registros, inmediaciones de la seccional Laguna Blanca	14 junio de 1992, y sin detalle	Sabana con isleta de monte y selva en galería	Individuo vocalizando	Moschione F & San Cristóbal J & Ortiz A	López- Lanús (1997), Chebez et al. (1998)
54	Riacho Pilagá, (Pirané) 25°32'S 58°54'O		16 julio 2022	Borde de monte	Un individuo	Candia F, grabación	eBird: Candia (2022)

En cuanto a la revisión bibliográfica (c), revisamos fuentes relevantes sobre ornitología del Neotrópico y consultamos colecciones de museos y bases de datos en línea. Específicamente, revisamos las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y del Museo de La Plata (MLP), y realizamos consultas a la colección de la Fundación Miguel Lillo de Tucumán (FML). Realizamos búsquedas en cuatro bases de datos ornitológicas online: VertNet (Constable et al. 2010; vertnet.org 2026); Xeno-canto Foundation (2026; www.xeno-canto.org); EcoRegistros (2026; www.ecoregistros.org) y eBird (2026; www.ebird.org). Además de aquellas localidades donde registramos al Lechuzón Negruzco mediante trabajo de campo, los registros documentados en bases de datos de ciencia ciudadana, pero sin publicación formal revisada por pares, los incluimos como nuevas localidades. Para todos los casos, utilizamos el término 'localidad' para referirnos a sitios reconocidos como poblaciones, propiedades privadas, áreas protegidas o áreas de colonias bien delimitadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hábitat

En Misiones, detectamos al Lechuzón Negruzco en ciudades y poblados, selvas secundarias, remanentes de selva y capueras rodeadas de selva (Tabla 1, Fig. 1). Encontramos que el Lechuzón Negruzco resultó extremadamente raro, de presencia eventual, y con menores densidades en ambientes de selva primaria o en buen estado de conservación respecto a las demás especies de estrígidos de mayor tamaño (Lechuza Listada *Strix hylophyla*, Lechuza Estriada *Strix virgata*, Lechuzón Mocho Chico *Pulsatrix koeniswaldiana*). En el PPCC durante más de 20 años de estudio entre 2003-2026 observamos al Lechuzón Negruzco en menos de 10 oportunidades, mientras que en el 90% de caminatas en búsqueda de aves nocturnas detectamos Lechuza Listada o Lechuzón Mocho Chico. También en la ruta nacional 101 dentro del PN Iguazú, durante 192 noches entre 2018-2026 DGM no detectó al Lechuzón Negruzco, mientras que en el 80% de las noches oyó Lechuza Estriada, Lechuzón Mocho Chico, Lechuza Listada o Lechuza Negra (*Strix huhula*).

En las sierras del departamento San Pedro, en el centro-este de Misiones, el Lechuzón Negruzco es escaso en los bloques extensos y continuos de selva. En particular, en la Reserva de Biosfera Yaboty, que incluye selvas con distintos grados de conservación, la especie es rara (AB obs. pers.) y tampoco es frecuente en la selva en buen estado de conservación del Parque Provincial Cruce Caballero (Bodrati et al. 2010). En la propiedad Forestal Belga, durante relevamientos intensivos realizados por diez investigadores en el 2019, la especie se encontró en un único sitio, un área parcialmente desmontada en las inmediaciones del arroyo Persiguero, donde fue observada en octubre de 2019 (López-Lanús et al. 2020). En cambio, el lechuzón no fue detectado en transectas nocturnas a lo largo de 52 km de caminos rodeados de selva secundaria dentro de la misma propiedad, aún con el uso de playback (López-Lanús et al. 2020). En 2021 lo registramos en el casco de la misma propiedad, en un ambiente de araucarias maduras y pastizal corto con animales domésticos, junto a una angosta faja remanente de selva riparia.

El Lechuzón Negruzco parece tolerar importantes transformaciones ambientales, ya que utiliza áreas rurales, pequeños remanentes de capueras o bosques secundarios en torno a poblados (Fig. 2). En la provincia de Misiones, habita en forma regular en poblados

Aceptado para publicación

como San Pedro y Bernardo de Yrigoyen (Bodrati et al. 2012). En estas localidades encontramos que es la especie de la familia Strigidae que más se detecta y con mayores números de individuos. Hemos observado parejas y, en ocasiones, hasta 4 o 6 individuos en distintos sectores de los poblados, disputándose territorio. Sus vocalizaciones pueden oírse casi todas las noches entre abril avanzado a mayo y hasta inicios de la primavera. Los individuos vocalizan durante la noche, tanto en vuelo como posados, de manera continua o intermitente. Un patrón similar se registró en el poblado de San Antonio y sus inmediaciones (dpto. General Manuel Belgrano), donde se observaron ejemplares en el casco principal del INTA, un sitio rodeado de plantaciones de especies nativas (*Araucaria angustifolia*) y exóticas (*Pinus* spp.) (Bodrati et al. 2012). También encontramos, de noche, cuatro individuos dentro del ejido urbano de Concepción de la Sierra, en el sudeste de la provincia de Misiones, grabamos un individuo en Puerto Libertad en el noroeste provincial, y lo encontramos en Montecarlo en el oeste de la provincia, de manera similar ocurre en muchos pueblos y ciudades del centro, norte y sur de la provincia de Misiones (Tabla 1, Fig. 1).

Dieta

Aunque la historia natural del Lechuzón Negruzco es escasamente conocida, en los últimos años se han publicado varios trabajos sobre su dieta. La composición de la dieta varía a lo largo de su amplia distribución, pero las aves constituyen el componente principal (Arizmendi et al. 2020), algo especialmente evidente en áreas urbanas y antrópicas. A continuación, se resumen los estudios realizados en Sudamérica, de norte a sur. En Medellín, Colombia (2500 msnm), Borrero (1967) encontró que la dieta incluía murciélagos del género *Artibeus*, Passeriformes, rálidos, palomas y coleópteros (Scarabidae). En áreas urbanas de Quito, Ecuador, las aves representaron el 87% de la dieta y el 13% restante correspondió a mamíferos e insectos (Cadena-Ortíz et al. 2018), donde la Torcaza (*Zenaida auriculata*) constituyó el 90% de las




Figura 1. Localidades con registros del Lechuzón Negruzco (*Asio stygius*) en el noreste de Argentina, enumeradas en la Tabla 1. Círculos amarillos: compilación de registros propios y de terceros.

Figure 1. Localities with records of the Stygian Owl (*Asio stygius*) in north-eastern Argentina, listed in Table 1. Yellow circles represent a compilation of the author's observations and those of other observers.

Aceptado para publicación

aves consumidas.

En Brasil, la especie fue estudiada en tres localidades. En San Carlos, en el estado de São Paulo, se analizaron egagrópilas recolectadas en una plantación de pinos exóticos. Las aves representaron el 90% de las presas, los murciélagos el 6% y los insectos el resto (Motta Junior & Taddei 1992). En el centro del mismo estado, en áreas altamente modificadas, las aves constituyeron el 92% de la dieta y el resto se repartió en proporciones similares entre insectos y mamíferos (Motta Junior 2006). En un área urbana de Rio Grande do Sul, las aves representaron el 85% de la dieta (Dos Santos da Silveira & Suertegaray Fontana 2005). Entre ellas, el 71% fueron Gorriones (*Passer domesticus*), el 20% Pecho Colorado (*Sturnella superciliaris*) y el resto aves de las familias Hirundinidae (2,2%) y Rallidae (2,2%).

En Argentina, los estudios previos se concentran en la ciudad de Tucumán (590.342 habitantes; INDEC 2022), donde en el Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo, un pequeño pulmón verde con vegetación de Yungas, la dieta se reportó casi en un 100% de aves: Passeriformes (85%) y palomas (Columbiformes, 14,7%), completando el resto con invertebrados (Martínez & Echevarría 2018). Luego, en el cementerio del oeste y en el Parque Avellaneda, un área de poco más de 5 ha, la especie consumió principalmente Passeriformes: furnáridos, emberízidos, mímidos, tiránidos y túrdidos (Martínez et al. 2024). Tanto Cadena-Ortíz et al. (2018) como Dos Santos da Silveira & Suertegaray Fontana (2005) consideraron al Lechuzón Negruzco un cazador oportunista de aves. Según estos autores, su dieta se basaría en las especies localmente más abundantes en las ciudades, como la Torcaza en Quito o el Gorrión en Rio Grande do Sul.



Figura 2. Dormidero de Lechuzón Negruzco (*Asio stygius*), de día, en el jardín de una vivienda, en la ciudad de Puerto Iguazú, 23 de enero de 2020. Nótese la alta cobertura de dosel por encima del individuo. Fotografía: Dante Gabriel Moresco.

Figure 2. Roost of the Stygian Owl (*Asio stygius*) during the day in the garden of a house, Puerto Iguazú, January 23, 2020. Note the high canopy coverage above the individual. Photograph: Dante Gabriel Moresco.

En Misiones, el único estudio sobre la dieta del Lechuzón Negruzco se realizó en áreas urbanas y peri-urbanas de San Pedro (Wioneczak et al. 2023). A partir del análisis de egagrópilas, los autores encontraron que las aves fueron el principal alimento en el ejido urbano, mientras que en el sector periurbano los roedores se consumieron en mayor proporción. Este uso flexible de las presas disponibles podría explicar la capacidad de la especie para ocupar ambientes antrópicos, incluso los densamente poblados. Dos registros recientes en San Pedro ilustran este comportamiento. El 25 de diciembre de 2025, por la noche, vecinos del Jardín Botánico Municipal Yvyrá Pyta capturaron a mano un individuo de Lechuzón Negruzco (Fig. 3A). El ave estaba distraída intentando depredar una Pollona Azul (*Porphyrio martinica*) en el suelo (Fig. 3B; Facundo Fariña in litt. 2026). Tras fotografiarlas, ambas aves fueron liberadas en el mismo Jardín Botánico. El 17 de abril de 2026, a las 04:50 h, Eduardo David Dos Santos fotografió a un individuo que había capturado una Garcita Bueyera (*Ardea ibis*) y la estaba ultimando en un camino de tierra (Fig. 3C; Tomas Franzese in litt. 2026). El registro ocurrió en un sector periférico del pueblo, un área rural con remanentes de selva nativa y varias represas artificiales destinadas a la siembra y cría de peces, donde las garzas son frecuentes.

Nidificación

La biología reproductiva del Lechuzón Negruzco es poco conocida (König & Weick 2010). En Misiones y Corrientes se han reportado pichones o juveniles provenientes de nidos en poblados, en su periferia,

Aceptado para publicación

en plantaciones de *Pinus* spp. o en árboles grandes en plazas adyacentes a viviendas humanas (Chebez 2009, Wioneczak et al. 2021, Villordo & Chatellenaz 2025, este trabajo). En el Jardín Botánico Yvyrá Pytá, dentro del poblado de San Pedro, encontramos dos nidos con 3 huevos blancos inmaculados en invierno (agosto), en temporadas consecutivas (2019-2020) (Fig. 4). La postura se realizó en la oquedad, casi sin profundidad (plataforma), de una Araucaria de gran porte, a unos 16,5 m de altura. Los huevos estaban rodeados de bromélias y otras plantas epífitas, cerca de la bifurcación central del árbol. El sitio está en una plaza con árboles nativos grandes y un suelo parquizado de pasto corto. En 2020, realizamos el seguimiento de una pareja de adultos, desde finales de mayo hasta fines de agosto, encontrando la postura el día 23 de agosto. El nido que estudiamos estaba a menos de 20 metros de las viviendas y, a *posteriori,* ambos adultos fueron heridos y desconocemos su paradero. El adulto que no estaba en el nido pasaba el día (dormideros) en un árbol de Laurel Amarillo (*Nectandra lanceolata*) y en un Lapacho (*Handroanthus impetiginosus*) a una distancia del árbol del nido, de alrededor de 50 y 80 m respectivamente. El dormidero del Laurel Amarillo tenía una copa frondosa y una gran cobertura de dosel por encima del individuo. El dormidero del Lapacho tenía un árbol de Cancharana (*Cabralea canjerana*) por encima que le otorgaba también alta cobertura por arriba del sitio donde pasaba el día el individuo. En Cuba, Belice y en el centro de Brasil, se describieron nidos construidos en el suelo y en nidos abandonados que se atribuyeron a aves rapaces (*Elanus leucurus*) o Urracas (*Cyanocorax cristatellus*) (Arizmendi et al. 2020, Lopes et al. 2004). Nuestras observaciones de un nido en una oquedad sin profundidad contrastan con estos sitios de nidificación previamente reportados y estarían indicando plasticidad en la capacidad para utilizar distintos sustratos para nidificar, probablemente en relación con la ecorregión o el ambiente que ocupa el Lechuzón Negruzco.

Uso de áreas urbanas y peri-urbanas por el Lechuzón Negruzco

En Misiones, la capacidad de establecerse en ambientes densamente habitados por humanos evitaría que el Lechuzón Negruzco compita directamente con otros grandes estrígidos presentes en ambientes naturales de selva como la Lechuza Negra, el Lechuzón Mocho Chico, la Lechuza Listada y la Lechuza Estriada, especies frecuentes en selvas nativas. Otros dos estrígidos están presentes en áreas urbanas o peri-urbanas en el noreste de Argentina: la Lechuza de Campanario (*Tyto furcata*) y el Lechuzón Orejudo (*Asio clamator*). Esta última especie está presente en ambientes naturales degradados, en la periferia de los poblados o de plantaciones de especies exóticas. En múltiples estudios se demostró que la Lechuza de Campanario consume pequeños roedores en porcen-




Figura 3. (A) Fotografías de un Lechuzón Negruzco (*Asio stygius*) capturado en el Jardín Botánico Municipal Yvyrá Pyta, San Pedro, Misiones, el 25 de diciembre de 2020, mientras intentaba depredar una Pollona Azul (*Porphyrio martinica*) (B). Ambas aves fueron liberadas sin lesiones en el mismo sitio luego de tomarse fotografías. (C) Individuo de Lechuzón Negruzco, luego de capturar una Garcita Bueyera (*Ardea ibis*) sobre un camino de tierra en un área periurbana de la localidad de San Pedro, 17 de abril de 2026. Fotografía: Eduardo David Dos Santos.

Figure 3. (A) Photographs of a Stygian Owl (*Asio stygius*) that was captured in the Yvyrá Pyta Municipal Botanical Garden, San Pedro, Misiones, December 25, 2020 while trying to prey on a Purple Gallinule (*Porphyrio martinica*) (B); both birds were released without injuries in the same place after taking photographs. (C) A Stygian Owl preying on a Western Cattle Egret (*Ardea ibis*) on a road in a peri-urban area of the town of San Pedro on April 17, 2026. Photograph: Eduardo David Dos Santos.

Aceptado para publicación

tajes que van del 70% al 100% (Taylor 1994), y es probable que ocupe parcialmente otro nicho trófico que el Lechuzón Negruzco.

Es de interés destacar que WH Partridge obtuvo solo siete ejemplares entre febrero de 1952 y septiembre de 1959, todos en la localidad de Tobuna (depositadas en distintos museos del mundo, Partridge 1954, Tabla 1), a pesar de realizar prospecciones minuciosas e intensivas durante 14 años (1949 a 1962) en localidades que abarcan todos los distritos de la selva Atlántica interior, los campos del sur de la provincia y la mayor parte de la provincia de Corrientes. El ambiente de la localidad de Tobuna, en aquellos años, estaba cubierto por la selva del distrito del Laurel, Guatambú y Araucaria, una conífera nativa emergente (Cabrera 1976). En este distrito, es posible que, en aquellos años, el Lechuzón Negruzco tuviera densidades menores que las actuales y que, con la transformación de la selva y la instalación y el crecimiento de los poblados, la especie se viera favorecida y su densidad poblacional se incrementara.

Por otro lado, los ambientes "humanos" podrían funcionar como una "trampa ecológica", que se produce cuando individuos de una especie son atraídos e identifican, paradójicamente, como apto un hábitat que resulta perjudicial para su sostenibilidad (Battin 2004). Este fenómeno puede ocurrir en paisajes en transición o en rápida transformación (Battin 2004). Sería importante estudiar el caso de la especie que nos ocupa. No obstante, es posible que el Lechuzón Negruzco no sea parte de una trampa ecológica y, a pesar de que individuos mueran por el accionar de personas, sus poblaciones se mantengan estables o hayan aumentado.



Figura 4. Nidada de 3 huevos blancos de Lechuzón Negruzco (*Asio stygius*), el 23 de agosto de 2020, en el Jardín Botánico Yvyrá Pytá, en la localidad de San Pedro. Fotografía: Facundo Di Sallo.

Figure 4. A clutch of three white eggs of the Stygian Owl (*Asio stygius*), 23 August 2020, Yvyrá Pytá Botanical Garden in the town of San Pedro. Photograph: Facundo Di Sallo.

Amenazas y percepciones de las personas hacia el Lechuzón Negruzco

Wioneczak et al. (2021) comunican que cinco individuos fueron heridos o muertos por el uso de gomeras o armas de fuego en áreas urbanas o periurbanas de distintas localidades de la provincia de Misiones (Eldorado, Posadas, Concepción, San Pedro); uno de estos especímenes se encuentra depositado en el Museo de La Plata, Buenos Aires. Nosotros tenemos conocimiento de ocho individuos de Lechuzón Negruzco que fueron heridos o muertos por personas en el ejido urbano de San Pedro en un lapso de 20 años (incluido el depositado en el MLP y mencionado por Wioneczak et al. 2020). Entre estos, dos juveniles que aparentemente acababan de abandonar el nido. Además, es frecuente que en las áreas urbanas los estrígidos sufran accidentes como colisiones con vehículos, cableado, alambrados y edificios (Ortiz 2016, Villordo & Chatellenaz 2025). Bauni et al. (2017) encontraron que el Lechuzón Negruzco fue la especie de ave amenazada que sufrió mayores casos de atropellamiento sobre un tramo de la Ruta Nacional 12 estudiado en el norte de Misiones.

Muchos individuos son abatidos por diversión o curiosidad, pero charlas casuales no estructuradas con distintos pobladores nos indican que son cazados esencialmente por el temor que proviene de las creencias. Los hábitos nocturnos de los lechuzones y lechuzas les confieren un aire de misterio, que suele asociarse con fuerzas sobrenaturales, malignas, de mal agüero o relacionadas con la brujería y lo demoníaco. Los sonidos emitidos por algunas especies de lechuzas o atajacaminos (Caprimulgidae) se interpretan como predictores de muerte o enfermedad cuando se encuentran cerca de viviendas humanas (Bodrati & Cockle 2012, Laprovitta 2016). Incluso en la actualidad, los estrígidos se perciben como un mal presagio y, como resultado, son asesinados por los pobladores (Bodrati et al. 2006; Bodrati & Cockle 2012). En particular, el epíteto específico del Lechuzón Negruzco, *stygius* en latín, proviene del griego *stygios*: de mal agüero, infernal, siniestro, odioso, horrible (Mouchard 2019). En la mitología, Styx (Estige) era el río de los infiernos, o, por extensión, el mismo infierno, que atravesaba una zona pantanosa (la laguna Estigia), donde arribaban los muertos para el juicio final

Aceptado para publicación

(Mouchard 2019). Además, pobladores de San Pedro nos han comunicado que temen que los lechuzones puedan depredar sus animales domésticos, como gatos pequeños.

Sin embargo, este misterio que rodea a los estrígidos, en ocasiones, les confiere admiración. En la cultura Guaraní, la Lechucita de las Vizcacheras (*Athene cunicularia*) es considerada como protectora celestial que impide la proliferación descontrolada de murciélagos que llevaría al fin de los tiempos (Laprovitta 2016, Bodrati et al. 2017). En esta cultura, la posesión de amuletos con derivados de distintas especies de lechuzas, como los cabure-í (género *Glaucidium*), transmitiría dones de fuerza o poderes al poseedor. Estas creencias están todavía fuertemente arraigadas en el noreste argentino y en los países vecinos (Laprovitta 2016), y serían una fuente importante de mortandad para muchas especies de estrígidos en zonas rurales y urbanas (Bodrati et al. 2017). En la cosmovisión guaraní, las lechuzas y los búhos son percibidos como observadores celestiales, enviados por el Dios Ñamandú para juzgar a quienes son dignos de un lugar en los cielos (Micó 2001).

CONCLUSIONES

Desconocemos el impacto de la mortandad en las áreas urbanas sobre las poblaciones del Lechuzón Negruzco. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los registros provienen de poblados y ciudades a lo largo de la provincia de Misiones (Tabla 1). En sectores cubiertos por selvas nativas, la especie está presente en bajas densidades o ausente. Incluso con la escasa información disponible, se podría inferir que, antiguamente, cuando las selvas cubrían la mayor parte de la región, el Lechuzón Negruzco presentaba densidades inferiores a las que se registran actualmente en los poblados. Son necesarios estudios enfocados en evaluar la trayectoria de estas poblaciones y el impacto que tiene el accionar de las personas para determinar si los poblados de Misiones están funcionando como trampas ecológicas para la especie.

En el noreste de Argentina, fuera de la provincia de Misiones, el Lechuzón negruzco parece ser una especie naturalmente rara. Logramos obtener escasos registros de la especie en la región chaqueña y en la provincia de Corrientes (Tabla 1, Fig. 1). Esto podría deberse a que nuestro esfuerzo de muestreo se centró en áreas naturales protegidas donde la especie no tendría abundancias altas. Sin embargo, contamos con algunos registros que también podrían indicar la asociación del Lechuzón Negruzco con poblados. Como ejemplo, detectamos, y existen datos de terceros (Tabla 1), en Presidencia de la Plaza (Chaco), Establecimiento Las Marías, Gobernador Virasoro (Corrientes) y en varios pueblos del nordeste de Corrientes y sur de Misiones (Villordo & Chatellenaz 2025). El único registro documentado y recientemente publicado en la provincia de Santiago del Estero ocurrió en el Jardín Botánico de la ciudad capital (Coria et al. 2021). A pesar de los escasos registros en la región chaqueña, consideramos que la especie tendría una distribución continua en el norte de Argentina, lo que apoyaría la invalidación de la subespecie *A. s. barberoi* (Pinto & Camargo 1948, Partridge 1954). Son necesarias búsquedas exhaustivas en la ecorregión chaqueña, especialmente en su porción occidental, para confirmar la presencia del Lechuzón Negruzco en este sector.

König & Weick (2010) mencionan que la especie podría enfrentar amenazas por la destrucción de las selvas en distintas áreas. Nuestros relevamientos extendidos en el tiempo en el noreste de Argentina, que aquí presentamos, contrastarían con estos argumentos. En el país, debería revisarse la categoría actual de Vulnerable, que no se justificaría por la abundancia y los ambientes muy transformados que el Lechuzón Negruzco colonizó.

AGRADECIMIENTOS

Los estudios de campo fueron autorizados por el Instituto Misionero de Biodiversidad y por el Ministerio de Ecología y RNR de la provincia de Misiones. Agradecemos a Kristina Cockle y a Luis Pagano por las discusiones y los aportes de ideas. Agradecemos a los vecinos del Jardín Botánico Yvyrá Pyta y a Tomás Franzese, quienes nos enviaron las fotografías y nos relataron su encuentro con el Lechuzón Negruzco en San Pedro.

REFERENCIAS

Arizmendi MD C, Rodríguez-Flores CCI, Soberanes-González CA, Schulenberg TS (2020) Stygian Owl (*Asio stygius*), version 1.0. En: Birds of the World, Schulenberg TS (ed.). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.styowl1.01

Alegre MA (2024) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S198065355. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New

Aceptado para publicación

York. Accedido el 22/02/2026

Alegre MA (2025) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S279772686. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 22/02/2026

Bareiro Guiñazú L, Got N (2022) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S123857531. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 22/02/2026

Bareiro Guiñazú L, Got N (2023) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S152268260. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 22/02/2026

Battin J (2004) When good animals love bad habitats: ecological traps and the conservation of animals population. *Conservation Biology* 18: 1482–1491. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2004.00417.x

Bauni V, Anfuso J, Schivo F (2017) Wildlife roadkill mortality in the Upper Paraná Atlantic forest, Argentina. *Ecosistemas* 26(3): 54-66. https://doi.org/10.7818/ECOS.2017.26-3.08

Bertoni A de W (1930) Sobre ornitología del Chaco Paraguayo. Aves colectadas por Félix Posner en la colonia "Monte Sociedad", hoy Benjamín Aceval (Villa Hayes). *Revista de la Sociedad Científica Paraguaya* 2: 241–257

Bodrati A (2004) Nuevos aportes a la distribución del lechuzón negruzco (*Asio stygius*) en el noreste argentino. *Nuestras Aves* 47: 26–28. https://doi.org/10.56178/na.vi47.573

Bodrati A (2011) Xeno-canto: https://www.xeno-canto.org/1082021. Accedido el 14/2/2026

Bodrati A (2020) Xeno-Canto: https://www.xeno-can-to.org/1000903. Accedido 14/2/2026

Bodrati A, Cowper Coles P, Meyer N (2006) Nuevo registro documentado del lechuzón negruzco (*Asio stygius*) en la provincia del Chaco, Argentina. *Nuestras Aves* 51: 31–32. https://doi.org/10.56178/na.vi51.516

Bodrati A, Cockle K, Segovia JM, Roesler I, Areta JI, Jordan E (2010) La avifauna del Parque Provincial Cruce Caballero, provincia de Misiones, Argentina. *Cotinga* 32:41–64

Bodrati A, Cockle KL (2012) El Atajacaminos Coludo *Macropsalis forcipata* en Argentina: ¿una especie amenazada o en expansión? *Cotinga* 34:46–54

Bodrati A & Di Sallo F (2020) Xeno-canto: https://www.xeno-canto.org/1082021. Accedido el 14/2/2026

Bodrati A, Areta JI, White E (2012) La avifauna de la Posada y Reserva Puerto Bemberg, Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 63–79. https://doi.org/10.56178/na.vi57.370

Bodrati A, Smith P, del Castillo H, Trejo A (2017) The Owls of Paraguay. En: Enriquez PL (ed.) *Neotropical Owls*. Springer, Cham, pp: 619-632. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57108-9_18

Borrero JIH (1967) Notas sobre hábitos alimentares de *Asio stygius robustus*. *El Hornero* 10(4): 445–447. https://doi.org/10.56178/eh.v10i4.1307

Cabrera AL (1976) *Enciclopedia Argentina de agricultura y jardinería.* 2nd ed. Tomo II. Fascículo I. *Regiones fitogeográficas Argentinas*. Editorial Acme S. A. C. I., Buenos Aires, Argentina

Cadena-Ortíz H, Bedoya J, Pozo-Zamora GM, Watson J, Brito J (2018) Notas sobre la dieta, desarrollo de jóvenes y distribución del Búho Estigio *Asio stygius* (Strigiformes: Strigidae) en Ecuador. *Revista Ecuatoriana de Ornitología* 3: 20–31

Candia F (2022) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S115493532. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Cavicchia M, Moresco G (2022) Lechuzón negruzco (*Asio stygius*) en el Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 67: 141–142. https://doi.org/10.56178/na.vi67.37

Chebez JC (1994) *Los que se van*. *Especies argentinas en peligro*. Editorial Albatros, Buenos Aires

Chebez JC (2009) *Otros que se van*. *Especies en peligro*. Editorial Albatros, Buenos Aires

Chebez JC, Rey NR, Babarskas M, Di Giacomo AG (1998) *Las aves de los Parques Nacionales de la Argentina.* Administración de Parques Nacionales de la Argentina y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial LOLA 12, Buenos Aires

Chebez JC, Braslavsky O, Derwiduee T, Soria A (1999) Novedades Ornitogeográficas Argentinas V. *Nuestras Aves* 40: 5–6

Cockle KL, Bodrati A (2017) Divergence in nest placement and parental care of Neotropical foliage-gleaners and treehunters (Furnariidae: Philydorini). *Journal of Field Ornithology* 88: 336–348. https://doi.org/10.1111/jofo.12227

Cockle KL, Gómez MR, Ferreyra CA, Di Sallo FG, Bodrati A (2024) Lesser Woodcreepers excavate nest cavities in trees. *Ornithology* 141: ukad060. https://doi.org/10.1093/ornithology/ukad060

Constable H, Guralnick R., Wieczorek J, Spencer C, Peterson AT, VertNet Steering Committee (2010) VertNet: a new model for biodiversity data sharing. *PLoS Biology,* 8:e1000309. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1000309

Coria OR, Quiroga OB, Navarro JL, Heredia J, Torres R, Lima J (2021) Lista actualizada de Santiago del Estero. *Acta Zoológica Lilloana* 65 (1): 42–143

Dabbene R (1910) Ornitología Argentina. Catálogo sistemático y descriptivo de las aves de la República Argentina. *Anales Museo Nacional de Buenos Aires,* 18:1–513

De la Peña MR (2025) *Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución (Actualiza-*

Aceptado para publicación

ción). Tomo 7 Cathartidae, Pandionidae, Accipitridae, Tytonidae, Strigidae, Trogonidae, Alcedinidae, Momotidae, Galbulidae, Bucconidae, Ramphastidae, Picidae, Cariamidae, Falconidae, Psittacidae, Thamnophilidae, Melanopareiidae, Conopophacidae, Grallariidae, Rhinocryptidae, Formicariidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie), Santa Fe

Dos Santos da Silveira T, Suertegaray Fontana C (2005) Análise dos componentes da dieta de um mocho-diabo (*Asio stygius*) observado em área urbana no Rio Grande do Sul, Brasil. Resúmenes, XI Reunión Argentina de Ornitología, Buenos Aires, 7 al 10 de septiembre, página 157

eBird (2025) eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York (URL: http://www.ebird.org). Accedido el 20/2/2026 (20/02/2026)

EcoRegistros (2026) Lechuzón Negruzco (*Asio stygius*). Ficha de la especie https://www.ecoregistros.org/ficha/Asio stygius. Accedido el 24/02/2026

Fariña N, Villalba O, Pagano L, Bodrati A, Cockle KL (2018) Vocalizaciones, sonidos mecánicos y despliegues del Atajacaminos Ala Negra (*Eleothreptus anomalus*) en Argentina. *Ornitología Neotropical* 29: 117–127. https://:/doi.org/10.58843/ornneo.v29i1.375

Flores R (2025) Xeno-canto: https://www.xeno-canto.org/580275

Hardy JW, Coffey JR, Reynard GB (1999) *Voices of the New World Owls.* edition (Cassettes). Revised by Terry Taylor. Bioacoustic Laboratory of the Florida Museum of Natural History. ARA Records. Gainnesville, Florida

Hollmann F (2021) eBird Checklist: https://ebird.org/argentina/checklist/S91702494. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 18/02/2026

INDEC (2022) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires. https://www.indec.gob.ar. Accedido el 17/10/2026

Jusczuk D (2016) eBird Checklist: https://ebird.org/argentina/checklist/S30683364. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 22/02/2026

König C, Weick F (2010) *Owls of the world*. A&C Black, London, UK

Krauczuk ER, Baldo JD (2004) Contribuição para o conhecimento da avifauna de um fragmento de floresta com araucária em Misiones, Argentina. *Atualidades Ornitológicas* 119: 6

Laprovitta F (2016) *Guyra: Reminiscencias míticas desde la fauna guaraní*. El Argos, Corrientes

Lopes LE, Goes R, Souza SM, Ferreira RM (2004) Observations on a nest of the Stygian Owl (*Asio stygius*) in the central Brazilian cerrado. *Ornitología Neotropical* 15(3): 427–431

López-Lanús B (1997) *Inventario de las aves del Parque Nacional "Río Pilcomayo" Formosa, Argentina*. Monografía Especial. L.O.L.A. Buenos Aires

López-Lanús B, Barbar F, Encabo M, Bodrati A, Dodyk L, Pugnali G, Ramírez Llorens R, González Táboas F, Costa MG, Gil G, Bosso A (2020) *Diversidad y abundancia de aves*. En: Gil G, Bosso A (compiladores). Línea de base de fauna. Forestal Belga. Programa NEA-Bosque Atlántico y Gran Chaco. Aves Argentinas, Buenos Aires, pp 47-76

Martínez G (2017) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S33715823. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 22/02/2026

Martínez Gamba R (2014) Lista de aves del Parque Natural Municipal Monte Seguín, provincia de Misiones, Argentina. *Nótulas Faunísticas* 163: 1-10

Martínez MV, Echevarria AL (2018) Primer registro de *Asio stygius* (Aves: Strigidae) y análisis de dieta en el Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 62 (2): 51–56

Martínez MV, Echevarria AL, Fanjul ME (2024) Las presas consumidas por el lechuzón negruzco (*Asio stygius*) y el lechuzón orejudo (*Asio clamator*) en espacios verdes urbanos de Tucumán, norte de Argentina. *Revista Chilena de Ornitología* 30(2): 106–111

MAyDS & AA (2017) *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. C. A. Buenos Aires

Mertz W, Ludt W, Clardy T, Robson S, Camacho N (2025) LACM Vertebrate Collection. Version 18.19. Natural History Museum of Los Angeles County. Occurrence dataset. https://gbif.org/occurrence. Accedido el 18/10/2025 https://doi.org/10.15468/77rmwd

Micó TL (2001) *Aves en la mitología Guaraní*. Servilibro, Asunción

Moresco DG (2017) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S105424008. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Moresco DG (2019) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S60453742. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Moresco DG (2020) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S63714589. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Moresco DG (2022) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S109153441. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Moresco DG (2023) eBird Checklist: https://ebird.org/

Aceptado para publicación

checklist/S146449906. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Moresco DG (2024a) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S180094972. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Moresco DG (2024b) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S205405690. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Moresco DG (2024c) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S159093784. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Moresco DG (2024d) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S175265216. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Moresco DG (2025a) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S251049139. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Moresco DG (2025b) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S220324248. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Moresco DG, Esteche M (2024) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S165891189. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 20/02/2026

Motta Junior JC, Taddei VA (1992) Bats as prey of Stygian Owls in Southeastern Brazil . *Journal of Raptor Research* 26(4): 259–260

Motta Junior JC (2006) Relações tróficas entre cinco Strigiformes simpátricas na região central do Estado de São Paulo, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 14: 359–377

Mouchard A (2019) *Etimología de los nombres científicos de las aves de Argentina: su significado y origen.* Fundación de Historia Natural Félix de Azara, CABA

Nores M, Yzurieta D, Salvador SA (1991) *Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina*. Boletín Academia Nacional Científica de Córdoba 59: 157–196

Olrog CC (1985) Status of wet forest raptors in northern Argentina. En: Newton I and Chancellor RA (eds.). Conservation studies on raptors. ICBP Technical Publication 5, Cambridge, UK, pp. 191–197

Ortiz D (2016) Recaptura de un lechuzón negruzco (*Asio stygius*), rehabilitado y liberado por el centro de rehabilitación de aves rapaces (CERAR), de la reserva experimental Horco Molle, Tucumán, Argentina. *EcoRegistros Revista* 6: 24–26

Partridge WH (1954) Estudio preliminar sobre la colección de aves de Misiones. *Revista Instituto Nacional de Investigaciones de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"* Zoología 3: 87–153

Pinto OM, Camargo EA (1948) Sobre uma coleção de aves do Río Das Mortes (Estado de Mato Grosso). *Papéis Avulsos De Zoologia* 8: 287-336. https://doi.org/10.11606/0031-1049.1948.8p287-336

Pradier LS (2017) Xeno-canto: https://www.xeno-canto.org/509386. Accedido el 20/2/2026

Regis V (2025) eBird Checklist; https://ebird.org/checklist/S259722078 An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 22/02/2026

Rodríguez-Ruiz ER, Herrera-Herrera JR (2009) A un siglo del registro del búho cara oscura (*Asio stygius*) en el centro de Tamaulipas y notas sobre su distribución en México y los Estados Unidos de América. *Huitzil* 10: 56–60

Schmitt CJ, Valqui T, Witt CC (2013) The expanding known range of Stygian Owl (*Asio stygius*) in the Andes. *Boletín UNOP* 8(2): 37–45

Taylor IR (1994) Barn Owls: Predator-prey relationships and conservation. Cambridge University Press, Cambridge, UK

Villalba OE, Fariña N, Cardinale L, Giraudo AR (2024) Anfibios de la Reserva Natural Provincial Rincón de Santa María (Corrientes, Argentina) y especies prioritarias para su conservación. *Cuadernos de Herpetología* 38(1): 27–41 https:// www.cuadernosdeherpetologia.com/index.php/CdH/article/view/162

Villordo MG, Chatellenaz ML (2025) Distribución del lechuzón negruzco *Asio stygius* (Strigiformes: Strigidae) en la provincia de Corrientes, Argentina. Nótulas Faunísticas 392: 1-6

Wioneczak MJ (2019) Xeno-canto: https://www.xeno-canto.org/550297. Accedido el 2/2/2026

Wioneczak MJ (2025) Xeno-canto: https://www.xeno-canto.org/590386. Accedido el 20/2/2026

Wioneczak M, Krauczuk ER, Meller DA, Sader D, Martínez A, Torresin JA, Ramírez R, Flores R (2021) Nuevos registros del lechuzón negruzco (*Asio stygius*) en el centro y sur de la provincia de Misiones. *Nuestras Aves* 66: 11–16. https://doi.org/10.56178/na.vi66.44

Wioneczak MJ, Barroso G, Bertarini PF, Wioneczak GI (2023) Datos Sobre la Alimentación del Lechuzón Negruzco (*Asio stygius*) en la Provincia de Misiones, Argentina. *Spizaetus. Boletín de la Red de Rapaces Neotropicales* 36: 9–16

Xeno-Canto Foundation (2026) Xeno-canto Foundation, Amsterdam https://www.xeno-canto.org. Accedido el 20/2/2026

Ziruffo R, Moya S (2025) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S271608778. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 22/02/2026

Aceptado para publicación