NUESTRAS AVES Número 71 · Diciembre 2026
Registro Novedoso
doi.org/10.56178/na.v71i.1216

Este trabajo fue revisado por pares y un comité científico, y ha sido aceptado para su publicación en la revista Nuestras Aves. Sin embargo, aún no ha sido modificado para su publicación final, por lo que esta versión y la final podrían no ser iguales.

NUEVOS REGISTROS DE GALLINETA OVERA (*Pardirallus maculatus*) Y CUCLILLO PICO AMARILLO (*Coccyzus americanus*) PARA LA PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA

NEW RECORDS OF SPOTTED RAIL (*Pardirallus maculatus*) AND YELLOW-BILLED CUCKOO (*Coccyzus americanus*) FOR CATAMARCA PROVINCE, ARGENTINA

Mateo Quevedo[1]*, Lourdes M. Inga Quarín[1] & Gonzalo Martinez[2]

[1]Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca. Belgrano 300, (4700) Catamarca, Argentina
[2]Club de Observadores de Aves de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina
*quevedomateo786@gmail.com

RESUMEN: Se reporta un nuevo registro de Gallineta Overa (*Pardirallus maculatus*) obtenido mediante grabaciones en el río Paclín (departamento Valle Viejo). Asimismo, se documenta fotográficamente un Cuclillo Pico Amarillo (*Coccyzus americanus*) en Alijilán (departamento Santa Rosa), en la Selva Pedemontana. Ambos hallazgos aportan documentación certera y amplían el conocimiento sobre la distribución de estas especies en Catamarca.

PALABRAS CLAVE: *Coccyzus americanus, distribución, nuevos registros, Pardirallus maculatus, Yungas*

ABSTRACT: A new record of the Spotted Rail (*Pardirallus maculatus*) obtained through audio recordings in the Paclín River (Valle Viejo department) is reported. Additionally, a Yellow-billed Cuckoo (*Coccyzus americanus*) is photographically documented from Alijilán (Santa Rosa department), in Premontane Forest. Both findings provide reliable documentation and expand the distributional knowledge in Catamarca.

KEYWORDS: *Coccyzus americanus, distribution, new records, Pardirallus maculatus, Yungas*

La Gallineta Overa (*Pardirallus maculatus*) habita humedales con vegetación densa desde México hasta el centro de Argentina (Taylor 2020; De la Peña 2025). Para Catamarca existían dos antecedentes: un espécimen de Las Pirquitas (Camperi & Darrieu 2001) y registros fotográficos en El Pantanillo, río del Valle (Barrionuevo et al. 2009), donde carece de registros en plataformas como iNaturalist y EcoRegistros. El 27 de septiembre de 2025 a las 13:21h obtuvimos un nuevo registro documentado en La Salamanca, departamento Valle Viejo (28°30'S, 65°39'O, 588 msnm.; Fig. 1), en un sector léntico del río Paclín dominado por totora (*Typha dominguensis*) y chilca (*Baccharis salicifolia*). El registro se obtuvo mediante grabaciones del canto en respuesta a playback (Xeno-canto: Martínez 2025; eBird: Martínez 2025). Dado que el río Paclín desemboca en el río del Valle a la altura de El Pantanillo, es probable que la cuenca del río del Valle albergue un

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0

hábitat apropiado para que la especie se distribuya de forma dispersa a lo largo del cuerpo de agua.

El Cuclillo Pico Amarillo (*Coccyzus americanus*) es un migrante neotropical (Hughes 2020; García de la Puente Orozco et al. 2025) presente en diversas provincias argentinas (De la Peña 2025). Para Catamarca existía solo una cita previa sin fecha, localidad ni documentación respaldatoria (Carma 2009), donde tampoco está registrado en plataformas de ciencia ciudadana. El 5 de abril de 2026 registramos y fotografiamos un ejemplar en Alijilán, departamento Santa Rosa (28°19'S, 65°46'O, 752 msnm.; Fig. 2), en Selva Pedemontana con presencia de cebil (*Anadenanthera colubrina*) y lapacho rosado (*Handroanthus impetiginosus*) (Oyarzabal et al. 2018). El individuo se observó en vegetación arbustiva y su identificación se basó en el distintivo maxilar inferior amarillo (Narosky & Yzurieta 2013). Este hallazgo, ubicado a unos 100 km de registros conocidos en Tucumán y Santiago del Estero, permite añadir con certeza a *C. americanus* al listado de avifauna de Catamarca.

REFERENCIAS

Barrionuevo C, Ortiz D, Castillo M (2009) Presencia y distribución de algunas aves de ambientes acuáticos de la provincia de Catamarca, Argentina. *Xolmis* 4: 27–33

Camperi AR, Darrieu CA (2001) Avifauna de Catamarca: lista comentada de especies (No Passeriformes). *Physis, Sección C* 58: 67-78

Carma MI (2009) *Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca*. Consejo Federal de Inversiones, Buenos Aires

De la Peña MR (2025) *Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución. (Actualización). Tomo 2: Phoenicopteridae, Podicipedidae, Columbidae, Cuculidae*. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie), Santa Fe

De la Peña MR (2025) *Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución. (Actualización). Tomo 4: Aramidae, Rallidae, Heliornithidae, Charadriidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, Chionidae, Pluvianellidae*. Comunicaciones del Museo




Figura 1. Mapa de la provincia de Catamarca, que muestra la ubicación del registro de Gallineta Overa (*Pardirallus maculatus*).
Figure 1. Map of the province of Catamarca, showing the location of the record of the Spotted Rail (*Pardirallus maculatus*).

Aceptado para publicación




Figura 2. A) Ubicación del registro de Cuclillo Pico Amarillo (*Coccyzus americanus*) en la provincia de Catamarca. B) Ejemplar de Cuclillo Pico Amarillo en la localidad de Alijilán. Fotografía: Quevedo M.

Figure 2. A) Record location of the Yellow-billed Cuckoo (*Coccyzus americanus*) in Catamarca Province. B) Yellow-billed Cuckoo individual in Alijilán. Photograph: M. Quevedo

Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie), Santa Fe

García de la Puente Orozco JE, Albores Barajas YV, Serrano Hernández D, Ramirez Perez JS, Ojeda Ruiz MA, Hernández Plata E, Montes Barrios N (2025) Modelado de hábitat potencial del Cuclillo pico amarillo *Coccyzus americanus* en Baja California Sur. *Ecosistemas* 34(1): 2849. https://doi.org/10.7818/ECOS.2849

Hughes JM (2020) Yellow-billed Cuckoo (*Coccyzus americanus*), version 1.0. En: Birds of the World, Rodewald PG (ed.). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.yebcuc.01. Accedido el 10/10/2026

Martínez G (2025) eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S279055017. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 10/10/2026

Martínez G (2025) Xeno-Canto: https://xeno-canto.org/1050836. Accedido el 10/10/2026

Narosky T, Yzurieta D (2013) *Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires

Oyarzabal M, Clavijo J, Oakley L, Biganzoli F, Tognetti P, Barberis I, Maturo HM, Aragón R, Campanello PI, Prado D, Oesterheld M, León RJC (2018). Vegetation units of Argentina. *Ecología Austral* 28: 40–63

Taylor B (2020) Spotted Rail (*Pardirallus maculatus*), version 1.0. En: Birds of the World, del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J, Christie DA, de Juana E (eds.). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.sporai.01. Accedido el 10/10/2026

Aceptado para publicación