

REGISTROS NOVEDOSOS

ARAÑERO ESTRIADO (*Setophaga striata*)  
EN LA PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA

BLACKPOLL WARBLER (*Setophaga striata*) IN THE PROVINCE OF MISIONES, ARGENTINA

MALENA RUZAK & SERGIO E. MOYA<sup>1</sup>\*

<sup>1</sup> Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Misiones, CONICET. Oberá (3360), Misiones Argentina.

\*sergio.e.moya@gmail.com

RESUMEN: Presentamos el séptimo registro del Arañero Estriado (*Setophaga striata*) para Argentina. El individuo fue fotografiado en la provincia de Misiones.

PALABRAS CLAVE: Arañero Estriado, *Setophaga striata*, nuevo registro, Misiones, Argentina.

ABSTRACT: We report the seventh record of Blackpoll Warbler (*Setophaga striata*) in Argentina. The individual was photographed in the province of Misiones.

KEYWORDS: Blackpoll Warbler, *Setophaga striata*, new record, Misiones, Argentina.

El Arañero Estriado (*Setophaga striata*) nidifica en Norteamérica, migrando hacia Sudamérica en el invierno boreal, abarcando diversos países. Entre ellos, Argentina como el país más austral (Erize 2008). El 25 de mayo del 2019, a las 8:22 h, observamos y fotografiamos un macho solitario de Arañero Estriado (Ridgely & Tudor 1989) en Leandro N. Alem, provincia de Misiones (27°35'S, 55°16'O). El mismo se hallaba a 100 m de la Ruta Nacional 14 a la altura del km 853, vocalizando activamente y en movimiento sobre una rama de un Timbó Colorado (*Enterolobium contortisiliquum*). El individuo presentaba plumaje reproductivo caracterizado por la cabeza negra y mejillas blancas (Fig. 1). Los registros previos de Arañero Estriado en Argentina son seis: uno en Corrientes (Erize 2008) y cinco en Misiones. En particular, en Misiones, estos registros fueron en enero de 1958, en mayo de 1959 (Partridge 1961), dos individuos en enero de 1987 (Saibene et al. 1996), y otro en el año 2010 (Bodrati 2012). Dado el escaso número de registros en Argentina y la antigüedad de la mayoría de ellos, este registro es de importancia pues evidencia la subsistencia de las rutas migratorias utilizadas por estas aves en el continente americano.

REFERENCIAS

- BODRATI A. (2012). Avistaje de Arañero Estriado (*Dendroica striata*) en San Pedro, Misiones, Argentina. *Nuestras Aves*, 57:13-14.
- ERIZE JF. (2008). Primer Avistaje de Arañero Estriado (*Dendroica striata*) en la provincia de Corrientes, Argentina. *Nuestras Aves*, 53:44.

PARTRIDGE WH. (1961). Aves de Misiones nuevas para Argentina. *Neotrópica*, 7: 25-28.

RIDGELY R & TUDOR G. (1989). *The birds of South America. Volume I: The oscine passerines.* University Of Texas Press, Texas.

SAIBENE CA, CASTELINO MA, REY NR, HERRERA J & CALO J. (1996). Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. Pp. 687. Editorial L.O.L.A. Monografía N°9, Buenos Aires.



Figura 1: Macho adulto de Arañero Estriado (*Setophaga striata*) fotografiado el 25 de mayo de 2019 en Leandro N. Alem, Misiones, Argentina. Fotografía: Ruzak M.