



**Figura 1.** Comparación de pico normal de la hembra (A) con el pico deforme del macho (B) de Catita Serrana Chica (*Psilopsiagon aurifrons*), capturados el 12 de julio de 2012 a orillas del río Yavi (Dpto. Yavi, Jujuy). Fotografías: OB Quiroga.

BORIS M (2011) *Enfermedades que afectan el pico de las aves*. Club Ornitológico Palentino, España [URL: <http://uefo.foroactivos.net/t260-enfermedades-que-afectan-el-pico-de-las-aves>]

DONELEY B (2010) *Avian medicine and surgery in practice*. Manson Publishing Ltd, London

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ J & DEL CAMPO VELASCO M (2014) *Patologías más frecuentes del pico de las aves*. Sociedad Española de Odontología y Cirugía Maxilofacial Veterinaria

y Experimental, España [URL: [http://seove.com/articulos/patologias\\_mas\\_frecuentes\\_pico\\_aves](http://seove.com/articulos/patologias_mas_frecuentes_pico_aves)]

OSCAR D (2012) Aberraciones y malformaciones en el género *Turdus*. *EcoRegistros Revista* 2(2):1-9

VIDOZ F & BIELSA B (1994) Observación de un Zorzal Patagónico con pico aberrante. *Nuestras Aves* 30:33

Recibido: septiembre 2015 / Aceptado: abril 2016 / Publicado: mayo 2016

Nuestras Aves 61: 15-16, 2016

## EL AGUILUCHO COLA CORTA (*Buteo brachyurus*) EN LAS SIERRAS DE CÓRDOBA, ARGENTINA

*Javier Heredia<sup>1</sup> y Marcelo Molas<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>Ecosistemas Argentinos, Av. Kennedy 791, La Falda (5172), Córdoba, Argentina. Correo electrónico: [javierheredianatu@yahoo.com.ar](mailto:javierheredianatu@yahoo.com.ar)

<sup>2</sup>Av. Edén 618, La Falda (5172), Córdoba, Argentina

El Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*) tiene una amplia distribución desde el extremo sur de Estados Unidos, a través de América Central, hasta el centro-este de América del Sur (Ferguson-Lees & Christie 2001). En Argentina, la especie ha sido mencionada para las pro-

vincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones y sur de Buenos Aires (Contreras 1990, Nores et al. 1996, Roesler 2003, Di Giacomo 2005, Seipke & Clark 2008, Seipke 2009, de la



**Figura 1.** Individuo juvenil de Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*) volando en las cercanías de la localidad de Villa Giardino, Córdoba, Argentina, 9 de julio 2015. Fotografía: M Molas.

Peña 2015). Los registros de la especie en la provincia de Córdoba incluyen una cita para las Sierras del Norte de Córdoba (al este de Simbolar) en abril de 1989 (Miatello 2009), un adulto al este de El Rodeo en mayo de 1995 (Miatello 2009), y tres observaciones en las cercanías de la localidad de Miramar (30°55'S, 62°41'O): 7 de febrero de 1990, 30 de abril de 2000 y 4 de agosto de 2004 (Torres et al. 2006).

En mayo de 2015 JH observó un adulto de Aguilucho Cola Corta morfo claro en cercanías de la localidad de Charbonier (30°76'S, 64°53'O) volando a gran altura, que luego descendió sobre un bosque de orco quebrachos (*Schinopsis haenkeana*). El 29 de junio de 2015 en los faldeos del cerro La Banderita, La Falda (31°04'S, 64°30'O; 1000 msnm) JH observó un adulto solitario morfo claro, volando en dirección norte-sur. El 9 de julio de 2015 en la periferia de Villa Giardino (31°03'S, 64°48'O) solo a 7 km de la observación anterior, JH y MM observaron y fotografiaron otro individuo de morfo claro en horas del mediodía y durante unos 30 min. En este último caso, el color canela en la cara interior de las alas denotaría que se trata de un individuo juvenil (Fig. 1).

Cabe destacar que ésta sería la primera observación fotografiada de la especie para la provincia de Córdoba, aunque ha sido citada con anterioridad (Torres et al. 2006, Miatello 2009) en las regiones del Chaco Seco o Chaco Serrano. Los registros de La Merced, en Catamarca (Seipke 2009), y de la ruta 16 en Santiago del Estero (Seipke & Clark 2008) han sido acompañados con fotografías tal como el que aquí presentamos.

Agradecemos a Fernando Angulo Protolongo y a Sergio Salvador por la bibliografía aportada y los comentarios. Y especialmente a Gisela Costa por su colaboración en la redacción del manuscrito.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CONTRERAS JR (1990) Nuevos datos acerca de la distribución y status de conservación de *Buteo brachyurus* (Viellot 1816) en la República Argentina (*Accipitridae*). *Resúmenes del III Encuentro Argentino-Paraguayo de Ornitología, Corrientes, Argentina*
- DE LA PEÑA M (2015) *Aves argentinas: nidos y huevos. Tomo 1*. Ediciones Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral y Eudeba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- DI GIACOMO A (2005) Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en: DI GIACOMO AG & KRAPOVICKAS SF (eds) *Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, provincia de Formosa, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
- FERGUSON-LEES J & CHRISTIE DA (2001) *Raptors of the world*. Houghton Mifflin, New York
- MIATELLO R (2009) Aves cuya presencia es poco común en la provincia de Córdoba, Argentina. Pato Crestudo (*Sarkidornis melanotos*), Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*), Águila Solitaria (*Harpyhaliaetus solitarius*), Fio Fio Plomizo (*Elaenia strepera*) y Jilguero Oliváceo (*Sicalis olivascens*). *Biológica* 10:72–74
- NORES M, YZURIETA D, SALVADOR S & SALVADOR L (1996) Nuevos registros de aves para Formosa. *Nuestras Aves* 33:31–32
- ROESLER I (2003) El Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*) en la región chaqueña argentina. *Hornero* 18:123–126
- SEIPKE S (2009) Listado actualizado de las rapaces diurnas en Catamarca, Argentina. *Nuestras Aves* 54:15–20
- SEIPKE S & CLARK W (2008) Primer registro documentado de Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*) en Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves* 53:35
- TORRES R, MICHELUTTI P, LEÓN J, BRUNO G & CEJAS W (2006) Nuevas citas y comentarios sobre rapaces en la región central de Argentina (provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero). *Nuestras Aves* 52:13–16

Recibido: septiembre 2015 / Aceptado: mayo 2016 / Publicado: mayo 2016