



**EL GAVIOTÍN NEGRO (*Chlidonias niger*)  
Y EL BURRITO COMÚN (*Laterallus melanophaius*)  
EN SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA**

**Oscar B. Quiroga<sup>1,2</sup>, Oscar R. Coria<sup>1,3</sup>, Norberto Gómez<sup>1</sup>, Graciela Chimino<sup>1</sup>, Fabián Jorge<sup>1</sup>, Lilia M. Rojas<sup>1</sup>,  
Jorge E. Llugdar<sup>1</sup> y Martín Alcalde<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>COA Kakuy, Independencia 1856, (4200) Santiago del Estero, Argentina. Correo electrónico: oscarqui595@hotmail.com

<sup>2</sup>Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina.

<sup>3</sup>Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Av. Belgrano sur 1912, Santiago del Estero (4200), Santiago del Estero, Argentina.

<sup>4</sup>Colegio Secundario Villa Figueroa, Ruta Nacional N° 2 s/n, Villa Figueroa, Santiago del Estero (4353), Santiago del Estero, Argentina.

En esta nota presentamos registros para dos especies de aves que no fueron reportadas para Santiago del Estero ni por Nores et al. (1991) ni por de la Peña (2013) en sus trabajos de revisión y que representarían entonces nuevas especies para la avifauna de la provincia.

El Gaviotín Negro (*Chlidonias niger*) es una especie paleártica. La subespecie de Norteamérica, *C. n. surinamensis*, nidifica en el interior de Canadá y Estados Unidos y durante el invierno visita las costas de Centroamérica y norte de Sudamérica (Blake 1977). En Chile y Argentina es considerado accidental con registros en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza y San Luis (Blake 1977, de la Peña 2013). Los registros más cercanos a Santiago del Estero son los de la desembocadura del río Segundo en Mar Chiquita (Nores & Yzurieta 1980) y Laguna de Mar Chiquita (Canevari et al. 1991) en Córdoba, sur de Puerto Vilela (León & Díaz Neto 1988) y el río Paraná en Chaco (Chatellenaz 2005).

El 24 de noviembre de 2012, a las 17:23h, en un estero salobre a orillas de la ruta provincial N° 5 en Cuyo (27° 40' S, 64° 07' O, Departamento Banda), OBQ y MA observamos durante 15 s, un Gaviotín Negro adulto en vuelo rasante sobre el agua, antes que desaparezca en el horizonte volando hacia el oeste. El individuo mostraba plumaje de reposo color blanco con corona y nuca negruzcas, partes dorsales y laterales del pecho gris.

El Burrito Común (*Laterallus melanophaius*) se distribuye casi de manera continua desde Nicaragua hasta el centro y este de Argentina (Olrog 1968, Blake 1977, Navas 1991). En nuestro país ha sido citado para las provincias de la mitad norte, a excepción de Santiago del Estero (14 provincias en total que incluyen Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, San Luis, San Juan y Tucumán; Olrog & Pescetti 1991, Carma et al. 2008, de la Peña 2013).

A orillas del río Dulce en el dique frontal de Termas de Río Hondo (27°30' 54'' S 64° 52' 43'' O, Departamento Río Hondo), JL fotografió un adulto el 27 de octubre de

2011 (Fig. 1A). En la Reserva Isla Tara Inti (27°30' 54'' S 64°52' 43'' O, Departamento Río Hondo), encontramos al burrito en tres oportunidades: NG fotografió dos adultos que forrajearon en la vegetación y la arena, el 26 de junio de 2013 (Fig. 1C). Todos los autores observamos, el 10 y el 19 de agosto de 2013, dos grupos de adultos, uno de tres y otro de dos individuos que se mantuvieron activos toda la mañana hasta el mediodía, momento en el cual se refugiaron entre la vegetación (Fig. 1B). En el tramo 0 del dique Figueroa, sobre bañados del río Salado (27°04' 57'' S, 63°36' 29'' O, Departamento Figueroa), OBQ y MA observamos un adulto forrajearo entre la vegetación flotante (*Hydrocharis morsus-ranae*), el 16 de julio de 2014, 14:31 h.

Agradecemos a Patricia Capllonch, Ada L. Echevarría, Martín R. de la Peña, Diego Ortiz y Ramiro S. Arrieta por sus aportes bibliográficos y personales. A María Eugenia Layus Ruiz por guiarnos en el circuito de la Reserva Isla Tara Inti.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BLAKE ER (1977) *Manual of Neotropical Birds. Vol. 1.* The University of Chicago Press, Chicago and London
- CANEVARI M, CANEVARI P, CARRIZO GR, HARRIS G, RODRÍGUEZ MATA J & STRANECK RJ (1991) *Nueva guía de las Aves Argentinas. Tomo I.* Fundación ACINDAR, Buenos Aires
- CARMA MI, PALMIERI CN, QUIROGA A, RODRÍGUEZ P, RAMOS I & ALDERETE E (2008) *Relevamiento de Aves de la provincia de Catamarca. Colección Flora y Fauna de la provincia de Catamarca.* Consejo Federal de Inversores, Buenos Aires
- CHATELLENAZ ML (2005) Aves del Valle del Río Paraná en la provincia del Chaco, Argentina: riqueza, historia natural y conservación. *INSUGEO, Miscelánea* 14:527-550
- DE LA PEÑA MR (2013) *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: edición ampliada.* Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7. Ediciones Biológica, Santa Fe
- LEÓN OD & DÍAZ NETO SH (1988) Observaciones del Gaviotín negro *Chlidonias niger surinamensis* (Gmelin, 1789) (Aves, Sternidae) en el departamento San Fernando, Chaco, Argentina. *Nótulas Faunísticas* 12:1-2



**Figura 1.** Burritos comunes (*Laterallus melanopahius*) fotografiados en (A) dique frontal de Termas de Río Hondo, 27 de octubre de 2011, foto: J.E. Llugdar; (B) Reserva Isla Tara Inti, 10 de agosto de 2013, foto: O.R. Coria; y (C) Reserva Isla Tara Inti, 26 de junio de 2013, foto: N. Gómez. Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

NAVAS JR (1991) *Fauna de agua dulce de la Republica Argentina. Vol. XLIII Fasc. 3. Gruiformes.* FECIC, Buenos Aires  
NORES M & YZURIETA D (1980) *Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina.* Sec. de Estado de Agricultura y Ganadería. Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, Córdoba  
NORES M, YZURIETA D & SALVADOR S (1991) Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba* 59:157—196

OLROG CC (1968) *Las Aves Sudamericanas. Una Guía de Campo.* Instituto Miguel Lillo, Tucumán  
OLROG CC & PESCECETTI EA (1991) *Las Aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo.* Centro Regional de Investigaciones Científicas y Ecológicas, Mendoza

Recibido: julio 2013 / Aceptado: febrero 2015