



REGISTROS DEL MARTÍN PESCADOR ENANO (*Chloroceryle aenea*) Y DEL GAUCHO COMÚN (*Agriornis micropterus*) EN LOS ESTEROS DEL IBERÁ, CORRIENTES, ARGENTINA

Emilio Gonzales¹ y Alejandro R. Giraudo²

¹ Calle 40, Colonia Carlos Pellegrini (3471), Corrientes Argentina

² Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL), Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL), Ciudad Universitaria, (3000) Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: alejandrogiraudo@hotmail.com

El Martín Pescador Enano (*Chloroceryle aenea*), contiene dos subespecies: *stictoptera*, que se distribuye desde el sur de México hasta el centro de Costa Rica, y *aenea*, desde el centro de Costa Rica, norte de Colombia, por el oeste de los Andes hasta Ecuador, y por el este de los Andes a través de Colombia, Venezuela, las Guyanas, Trinidad, este del Ecuador y de Perú, Brasil (hasta el estado de Santa Catarina), norte de Bolivia, Paraguay, con registros en el extremo nordeste de Argentina (Woodall 2001). En Argentina fue registrado por primera vez en el Parque Nacional Iguazú

el 28 de julio de 1988, mediante el hallazgo de un macho muerto (Castelino 1990). Posteriormente fue observado en el mismo parque el 24 de septiembre de 1993 y el 16 de marzo de 1997 (Mazar Barnett & Pearman 2001).

El 27 de marzo de 2012 a las 18:45 h se observó durante unos 30 minutos y se fotografió (Fig. 1), un ejemplar macho de Martín Pescador Enano en la Laguna Iberá, en el sector denominado arroyo Corriente (28°32'18"S, 57°12'04"O). Posaba en perchas constituidas por vegetación acuática arraigada, desde donde vigilaba el agua libre. En un momento se tiró desde la vegetación y capturó un pez pequeño del cual se alimentó (Fig. 1). Otro ejemplar de la misma especie fue observado alejándose del lugar, y posteriormente pudo comprobarse que se trataba de una hembra. La pareja fue observada durante la semana siguiente en reiteradas oportunidades en el área, y luego de ese lapso no fue nuevamente registrada. Este es el registro más austral de la especie, extendiendo así su distribución unos 450 km hacia el sur (Castelino 1990, Mazar Barnett & Pearman 2001).

El 12 de junio de 2012, entre las 10:15 y 10:30 h, se observó y fotografió (Fig. 2) un ejemplar de Gaucho Común (*Agriornis micropterus*), posado en la copa de un árbol solitario de curupí (*Sapium haematospermum*) en un pastizal a unos 20 m de la ruta 40, 15 km al sudoeste de Colonia Carlos Pellegrini (28°38'3.85"S, 57°17'29.46"O). La especie fue diferenciada del Gaucho Chico (*Agriornis murina*) por su tamaño mayor (similar al de un benteveo), las líneas gulares negras más marcadas y los flancos no acanelados. El Gaucho Común contiene dos subespecies, *andecola*, que se distribuye por los Andes, desde el sur del Perú, oeste de Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina (hasta Tucumán y Catamarca); y *micropterus*, que se reproduce en la Patagonia al este de los Andes, desde Santa Cruz hasta Neuquén, sur de La Pampa y sur de Buenos Aires, migrando hacia el norte durante el invierno, donde alcanza el sur de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, el oeste de Paraguay, y llegando ocasionalmente hasta Bolivia (Cochabamba) (Ridgely & Tudor 1994, Guyra Paraguay 2004, Fitzpatrick 2004). Esta última subespecie podría ser la que llega a Corrientes durante el invierno. El registro se ubica 230 km más al este de la localidad de Santa



Figura 1. Martín Pescador Enano (*Chloroceryle aenea*) macho. Laguna Iberá, Corrientes, Argentina, 27 de marzo de 2012. A) Posando y B) habiendo capturado un pequeño pez con escamas. Fotos: E Gonzales.



Figura 2. Gaucho Común (*Agriornis micropterus*). Ruta 40, 15 km al sudoeste de Colonia Carlos Pellegrini, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina. Foto: AR Giraudo.

Fe más cercana (Lanteri) (de La Peña 2011), a unos 320 km al sudeste de la localidad de la Reserva El Bagual en Formosa (Di Giacomo 2005) y a unos 400 km más al norte de la localidad más cercana en Entre Ríos (Departamento Colón) (de La Peña 2006).

A pesar de que existe una importante cantidad de literatura sobre la composición de las aves de Corrientes (Contreras 1981, 1986a, 1986b, 1987, Contreras & Contreras 1984, Darrieu & Martínez 1984, Darrieu 1986, 1987, Darrieu & Camperi 1988, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997, Giraudo & Sironi 1992, Baldo et al. 1995, Giraudo 1996), ambas especies son reportadas y documentadas por primera vez para la avifauna de la provincia de Corrientes en general y de los Esteros del Iberá en particular (Giraudo et al. 2003, 2006). Estos nuevos registros brindan evidencia sobre la necesidad de más inventarios en la provincia para conocer con mayor precisión su avifauna.

Agradecemos a Vanesa Arzamendia por su colaboración en las campañas, a los revisores por sus sugerencias y a los proyectos Iberá+10 (UNNEC), PIP2011-355 (CONICET) y PICT2013 (FONCyT) por el financiamiento.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BALDO JL, ORDANO M, ARZAMENDIA Y & GIRAUDO AR (1995) Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Corrientes, República Argentina. *Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral* 26:55–59
- CASTELINO MA (1990) Un ave nueva para la República Argentina y segunda mención para otra. *Nótulas Faunísticas* (21): 1-2.
- CONTRERAS JR (1981) Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No Passeriformes. *Historia Natural* 2:21–28
- CONTRERAS JR (1986a) Acerca del Milanito Blanco, *Gampsonyx swainsoni swainsoni* Vigors, 1835, en la Argentina (Aves, Accipitridae). *Historia Natural* 6:83–84
- CONTRERAS JR (1986b) Sobre la presencia del halconcito gris, *Spi-ziapteryx circumcinctus* (Kaup) en la provincia de Corrientes, Argentina (Aves, Falconidae). *Historia Natural* 6:91–92
- CONTRERAS JR (1987) Lista preliminar de la avifauna correntina. II. Passeriformes. *Historia Natural* 7:61–70
- CONTRERAS JR & CONTRERAS AO (1984) Addenda de la lista de aves no Passeriformes de la provincia de Corrientes, Argentina. *Historia Natural* 3:248
- DARRIEU CA (1986) Estudios sobre la avifauna de Corrientes. III. Nuevos registros de aves Passeriformes (Dendrocolap- tidae, Furnariidae, Formicariidae, Cotingidae y Pipridae) y consideraciones sobre su distribución geográfica. *Historia Natural* 6:93–99
- DARRIEU CA (1987) Estudios sobre la avifauna de Corrientes. IV. Nuevos registros de aves (Passeriformes, Tyrannidae) y consideraciones sobre su distribución geográfica. *Neotrópica* 33:29–36
- DARRIEU CA & CAMPERI AR (1988) Estudios sobre la avifauna de Corrientes. V. Passeriformes poco citados (Parulidae, Thraupidae). *Neotrópica* 36:133–137
- DARRIEU CA & CAMPERI AR (1990) Estudio de una colección de aves de Corrientes. I. (Dendrocolaptidae – Furnariidae). *Hornero* 13:138–146
- DARRIEU CA & CAMPERI AR (1991) Estudio de una colección de aves de Corrientes. II. (Formicariidae, Cotingidae, Pipridae). *Neotrópica* 37:75–80
- DARRIEU CA & CAMPERI AR (1993) Estudio de una colección de aves de Corrientes. IV. (Phytotomidae a Parulidae). *Neotró- pica* 39:83–92
- DARRIEU CA & CAMPERI AR (1994) Estudio de una colección de aves de Corrientes: Thraupidae e Icteridae. *Neotrópica* 40:49–55
- DARRIEU CA & CAMPERI AR (1996) Estudio de una colección de aves de Corrientes (Emberizidae y Fringillidae). *Neotrópica* 42:69–75
- DARRIEU CA & CAMPERI AR (1997) Estudio de una colección de aves de la provincia de Corrientes (Rheidae a Picidae). *Physis Sección C* 55:5–15
- DARRIEU CA & MARTINEZ MM (1984) Estudios sobre la avifauna de Corrientes. I. Nuevos registros de aves (No Passeres). *Revista del Museo de La Plata, Nueva Serie, Zoología* 13:257–260
- DE LA PEÑA MR (2006) *Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos*. Editorial LOLA, Buenos Aires
- DE LA PEÑA MR (2011) *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Santa Fe, Argentina*. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 4. Santa Fe
- DI GIACOMO AG (2005) Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en: Di Giacomo AG & Krapovickas SF (eds) *Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área del Chaco Húmedo*. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas, Buenos Aires
- FITZPATRICK JW (2004) Family Tyrannidae (Tyrant-Flycatchers). Pp. 170–463 en: DEL HOYO J, ELLIOTT A & SARGATAL J (eds) *Handbook of the birds of the world. Volume 9. Cotingas to pipits and wagtails*. Lynx Edicions, Barcelona
- GIRAUDO AR (1996) Adiciones a la avifauna de la Provincia de Corrientes, Argentina y zonas limítrofes del Paraguay. *Facena* 12: 25–30
- GIRAUDO AE, CHATELLENAZ ML, SAIBENE C, ORDENO M, KRAUCZUK E, ALONSO J & DI GIACOMO A (2003) Avifauna del Iberá: composición y datos sobre su historia natural. Pp. 273–303 en ÁLVAREZ BB (ed) *Fauna del Iberá*. EUDENE, Corrientes
- GIRAUDO AR & SIRONI M (1992) Registro de *Pteroglossus castanotis australis* Cassin, 1867 y de *Baillonius bailloni* (Vieillot, 1819) (Aves: Ramphastidae) en el noreste de la Provincia de Corrientes, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 25:1–2



GUYRA PARAGUAY (2004) *Lista comentada de las aves de Paraguay/Annotated checklist of the birds of Paraguay*. Guyra Paraguay, Asunción

MAZAR BARNETT J & PEARMAN, M. 2001. *Lista comentada de las aves argentinas*. Lynx Edicions, Barcelona.

RIDGELY RS & TUDOR G (1994) *The birds of South America. Volume 2*. University of Texas Press, Austin

WOODALL PF (2001) Family Alcedinidae (kingfishers). Pp. 130–249 en: DEL HOYO J, ELLIOTT A & SARGATAL J (eds) *Handbook of the birds of the world. Volume 3. Hoatzin to auks*. Lynx Edicions, Barcelona

Recibido: noviembre 2013 / Aceptado: febrero 2014

Nuestras Aves 59: 11, 2014

PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO DE ERMITAÑO CANELA (*Phaethornis pretrei*) EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Fernando Bernasconi

CUAMBI (Custodios del Ambiente y la Biodiversidad), Casa 168, B° Gral. Belgrano, Ituzaingó (3302), Corrientes, Argentina.
Correo electrónico: bernasconiff@gmail.com

El género *Phaethornis* está representado en la Argentina por dos especies, el Ermitaño Canela (*P. pretrei*) y el Ermitaño Escamado (*P. eurynome*). El Ermitaño Canela es abundante en el este y centro de Brasil, y también ocurre en Bolivia, Paraguay y norte de Argentina (Sick 1997). En Argentina cuenta con registros en Salta, Jujuy y Santiago del Estero (de la Peña 2012). En Misiones hay registros desde 1988, cuando un ejemplar fue encontrado atropellado en una ruta en las afueras de Puerto Iguazú (Castelino & Moreyra 1989).

El 14 de agosto de 2013 a las 11:45 h observé un Ermitaño Canela libando de una rosa china (*Hibiscus rosa-sinensis*) en la vereda de una vivienda dentro del ejido urbano de la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes (27°34'58.62"S, 56°40'51.78"O, 78 msnm). El 16 de septiembre de 2013, pude fotografiar (Fig. 1) a un individuo libando en bebederos para picaflores en el jardín de mi

domicilio particular, también en Ituzaingó (27°34'35.87"S, 56°40'42.58"O). Tal vez ambas observaciones se refieran a un mismo ejemplar. Luego de esto he constatado visitas de manera irregular a los bebederos antes mencionados hasta el 23 de octubre de 2013. Estos son los primeros registros documentados y observaciones del Ermitaño Canela en la provincia de Corrientes.

Ituzaingó dista unos 100 km en línea recta perpendicular al límite sur de su distribución actual en el Paraguay, en el departamento Misiones (Guyra Paraguay 2005). Esto, complementado con registros obtenidos en Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil (Damiani 2009), podría indicar que la especie está experimentando una expansión hacia al sur.

Agradezco especialmente a Luis G Pradier y a Lisando Cardinale por la revisión de la versión previa y por el tiempo, conocimientos, sugerencias y datos que me brindaron para poder realizar este trabajo. También a Adrian Di Giacomo y Alejandro Bodrati por los datos aportados y revisión de la versión final del presente trabajo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CASTELINO MA & MOREYRA PA (1989) Sobre el Picaflor Ermitaño Canela (Lesson & Delattre, 1839) en la provincia de Misiones, Argentina (Aves, Trochilidae). *Nótulas Faunísticas* 16:1–2
- DAMIANI RV (2009) Primeiro registro de *Phaethornis pretrei* (Aves, Trochilidae) para o Rio Grande do Sul, Brasil. *Revista Biotemas* 22:199–202
- DE LA PEÑA MR (2012) *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: informe preliminar*. Ediciones Biológica, Santa Fe
- GUYRA PARAGUAY (2005) *Atlas de las aves de Paraguay*. Guyra Paraguay, Asunción
- SICK H (1997) *Ornitología Brasileira*. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro



Figura 1. Adulto de Ermitaño Canela (*Phaethornis pretrei*), Ituzaingó, Corrientes, Argentina. 16 de septiembre 2013. Foto: F Bernasconi.

Recibido: noviembre 2013 / Aceptado: febrero 2014