



COMENTARIOS SOBRE AVES PAMPEANAS Y OTRAS ESPECIES DE INTERÉS EN UN 'NUEVO' SITIO DE INTERÉS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LA ESTANCIA RINCÓN DE COBO

James C. Lowen¹ y Juan Mazar Barnett²

¹Rioja 3730, (1636) La Lucila, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: lowen.james@gmail.com

²Plaza 2407 2° A, (1430) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: juanmbarg@gmail.com

La estancia Rincón de Cobo (36°51'S, 56°40'O) se ubica entre Mar de Ajó y Pinamar, partido de la Costa, centro-este de Buenos Aires, Argentina. Tiene una superficie de 5000 ha, bordeando la costa atlántica e incluye pastizales nativos en buen estado de conservación, así como áreas de pastizales secos, inundables, médanos costeros, pequeñas lagunas, bañados y parches de bosque de flora exótica.

Realizamos estudios de campo en agosto de 2007, en cada estación del año en 2008 (21–22 febrero, 23–24 abril, 6–7 agosto y 10–11 diciembre) y en abril de 2009. Cada visita fue de dos días completos de campo: concentramos el trabajo en áreas de hábitat que consideramos más interesantes a nivel ornitológico durante los horarios de temperaturas más benignas, después del amanecer y antes del anochecer, con los relevamientos de las zonas de menor importancia efectuados durante las horas más calurosas. También realizamos en forma limitada trabajo de campo nocturno. Damos más detalles sobre el sitio, la vida silvestre y recomendaciones para su conservación en Lowen y Mazar Barnett (2009).

Según nuestros estudios, Rincón de Cobo parece ser un sitio importante para la conservación de las aves pampeanas. Aquí brindamos información sobre el estatus en de seis especies pampeanas en el sitio, entre ellas algunas que están amenazadas y/o de distribución limitada. Publicamos nueva información sobre otra especie pampeana interesante, Doradito Copetón *Pseudocolaptes sclateri*, en otro lugar (Lowen *et al.* 2009). Además ofrecemos comentarios sobre otras siete especies, todas raras a nivel global (BirdLife International 2008) y/o a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008) entre las que se incluyen cuatro aves marinas, dos playeros y una gaviota.

En total, hemos registrado 142 especies de aves en Rincón de Cobo (ver Tabla 1). Estas incluyen: dos tinámidos, nueve especies de garza/cuervillos/cigüeña, siete de patos y cisne, 11 aves rapaces, 17 chorlitos, 11 gaviotas y gaviotines, ocho furnáridos, 14 tiránidos y siete especies de icteridos.

Registramos 53 especies en tres o más visitas (es decir, en tres o más estaciones), y consideramos probable que sean residentes en o alrededor de la propiedad. Otras 24

especies sólo durante agosto (2007 y/o 2008) y consideramos que son posiblemente visitantes invernales. Registramos 35 especies de aves sólo en primavera/verano (diciembre y/o febrero) y consideramos que probablemente sean visitantes estivales. Registramos siete especies que BirdLife International clasifica como Amenazadas o Casi Amenazadas a nivel global (BirdLife International, 2008). Estas especies están destacadas en la Tabla 1.

Aves pampeanas de interes

Curutié Ocráceo (*Cranioleuca sulphurifera*)

En Buenos Aires es residente y nidificante pero escaso, con una distribución principalmente en la zona ribereña (Narosky y Di Giacomo 1993). En Rincón de Cobo registramos un individuo en febrero, pero por lo menos 30 en abril de 2008, un mínimo de ocho en agosto, y 10 en un sólo lugar en abril de 2009. No se lo registró en diciembre. En ambas visitas en abril, el Curutié Ocráceo fue una de las aves más comunes en los pastizales. Estas diferencias en la detectabilidad son difíciles de explicar. Una posibilidad es que las aves se encontraran criando en febrero, siendo por lo tanto poco conspicuas. Registramos tanto jóvenes como adultos en abril, lo que apoya esta teoría. Otra posibilidad es que esta especie sea principalmente un visitante de invierno en la estancia. La falta de registros en diciembre puede apoyar esta teoría.

Espartilero Pampeano (*Asthenes hudsoni*)

Vulnerable a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). Residente y nidificante pero, escaso y 'vulnerable' en Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo 1993). Cuenta con sólo tres registros en Brasil (Zimmer y Whittaker 2009) y 10 registros en Uruguay (R Clay *in litt.* 2009), y podría ser considerada una especie rara a nivel global. En Rincón de Cobo fue registrado todos los días durante el trabajo de campo en cinco lugares de la estancia, por lo que parece estar presente durante todo el año. Los números son mayores, o la especie más conspicua, en verano. En febrero, cinco individuos cantando fueron contados en un día. En diciembre registramos dos parejas y tres individuos.



Consideramos que tal vez hasta doce parejas pueden estar habitando el área.

Espartillero Enano (*Spartonoica maluroides*)

Casi Amenazada (BirdLife International 2008) y Vulnerable a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). Residente y nidificante pero escaso en Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo 1993). En Rincón de Cobo observado en febrero (por lo menos 20 individuos, la mayoría juveniles y a menudo en pequeños grupos), en abril (dos individuos) y agosto (dos individuos). No se registraron en diciembre a pesar de las intensas búsquedas. Se registraron en tres lugares distintos, pero la gran mayoría estaba en un sólo área.

No nos queda claro su estatus en Rincón de Cobo. El gran número de aves, en particular juveniles, visto en febrero sugiere que algunas parejas nidifican en el sitio. Pero el hecho de que no la encontramos en diciembre va contra esta idea y parece indicar que nidifican en otra área y que utilizan Rincón de Cobo durante su dispersión posterior a la cría. Sin embargo, esta especie es tímida y poco conspicua mientras nidifica y por eso es bastante probable que críen en Rincón de Cobo, pero simplemente no fueron detectadas. Los bajos números en invierno no son sorpresivos ya que hay por los menos movimientos locales (Remsen 2003) y que aparece en invierno en las provincias de Chaco (A Bodrati *in litt.* 2010) y Formosa (A Di Giacomo com. pers. 2007).

Tachurí Canela (*Polystictus pectoralis*)

Casi Amenazada (BirdLife International 2008) y Vulnerable a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). Rara y nidificante en Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo 1993). En Rincón de Cobo registramos un juvenil en febrero 2008. No nos es claro si había nacido en Rincón de Cobo o si usaba el sitio como parte de su dispersión, habiendo nacido en otro lugar (por ej. más al sur en la provincia de Buenos Aires). La especie migra al norte en invierno (Narosky y Di Giacomo 1993, Collar y Wege 1995), por lo que es natural que no la halláramos en abril ni agosto.

Ratona Aperdizada (*Cistothorus platensis*)

Residente, nidificante y escasa en Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo 1993). La especie es común en Rincón de Cobo, específicamente en pastizales en buen estado de conservación. Pensamos que al menos 15 parejas están presentes en el área de estudio, con por lo menos 20 individuos vistos en una fecha en febrero. Se confirmó su nidificación con la presencia de grupos familiares que incluían juveniles.

Especies amenazadas de interés

Aquí brindamos información sobre nuestros registros de otras siete especies que están amenazada a nivel global (BirdLife International 2008) o nacional (AA/AOP & SAyDS 2008). No incluimos nuestro registro del Chorlito

Cenicento *Pluvianellus socialis* que fue publicado por separado (Lowen *et al.* 2009).

Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*)

Casi Amenazada a nivel global (BirdLife International 2008) y Vulnerable a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). Aparece de forma regular, principalmente en invierno, en la costa marina de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo 1993). En Rincón de Cobo un inmaduro fue observado en el mar en agosto de 2008.

Petrel Gigante Común (*Macronectes giganteus*)

A nivel global, fue considerado Casi Amenazada hasta 2008, pero desde entonces es listado como de Preocupación Menor (BirdLife International 2008) y Vulnerable a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). En costas de Buenos Aires es considerado escaso (Narosky y Di Giacomo 1993) o registrado 'ocasionalmente' (Chebez 2008). En Rincón de Cobo lo observamos mar adentro en ambas visitas de agosto y en abril 2009, lo que sugiere que la especie es rara pero que visita regularmente en otoño e invierno la zona.

Petrel Barba Blanca (*Procellaria aequinoctialis*)

Vulnerable a nivel global (BirdLife International 2008) y a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). Ocasionalmente observado en Buenos Aires, en los alrededores de la Reserva Albufera de Mar Chiquita (Chebez 2008), y escaso en la provincia (Narosky y Di Giacomo 1993). En Rincón de Cobo tres observados desde la costa volando hacia el sur en abril de 2009. Sería interesante establecer si esta especie rara ocurre regularmente en el área. En la cercana Reserva Provincial Punta Rasa la especie es frecuente en invierno, y aún en primavera-verano se observan individuos (I Roesler com. pers.).

Albatros Ceja Negra (*Thalassarche melanophrys*)

En Peligro a nivel global (BirdLife International, 2008) y Vulnerable a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). Considerado 'escaso' en Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo 1993). En Rincón de Cobo bastante común en alta mar en agosto de 2008, con un máximo de 30 individuos vistos cada día. Algunos llegando cerca de la playa. Cuatro individuos por día fueron observados en abril de 2009.

Playero Rojizo (*Calidris canutus*)

En Peligro a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). En Buenos Aires, es considerado escaso (Narosky y Di Giacomo 1993). La población de la subespecie *Calidris canutus rufus* está en rápido declino (http://www.birdlife.org/news/news/2007/08/red_knot_report.html). En Rincón de Cobo, un ave hallada en la playa en febrero 2009 y dos en la playa en abril 2009.

**Chorlito Pecho Colorado (*Charadrius modestus*)**

Vulnerable a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). En Rincón de Cobo, sólo contamos con un registro de cinco individuos en la playa en agosto de 2007. Sin embargo, creemos que puede ser un visitante invernal regular, como sucede en áreas cercanas de la provincia (I Roesler com. pers.)

Gaviota Cangrejera (*Larus atlanticus*)

Vulnerable (BirdLife International 2008) y Amenazada a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). Escasa en Buenos Aires, nidificante en el sur de la provincia (Narosky y Di Giacomo 1993). Un subadulto visto volando sobre los pastizales y en la playa en ambas fechas en abril 2008, no fue vista asentada en la playa. Sólo dos juveniles en la playa en dos fechas de abril 2009. Nos sorprendió no haber encontrado esta gaviota en más ocasiones. Un gran número de gaviotas y gaviotines utilizan las playas alrededor de Rincón de Cobo, y ese sector de la costa de la provincia de Buenos Aires es uno de los bastiones para esta gaviota como sitio de invernada y permanencia de individuos no reproductivos (I Roesler com. pers.).

Conservación

Hemos aplicado de manera preliminar y a juicio personal los criterios de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs) utilizados por Di Giacomo (2005) en relación a Rincón de Cobo. Debido a sus poblaciones de Espartillero Enano, Curutié Ocráceo y Espartilero Pampeano, pensamos que existe la posibilidad de que Rincón de Cobo califique como AICA bajo las Categorías A1, A3 y/o D2.

Cabe destacar que el AICA BA13 Reserva Provincial Laguna Salada Grande está muy cerca de Rincón de Cobo y tiene hábitats y aves en común. En nuestra opinión, su proximidad al AICA BA13 Reserva Provincial Laguna Salada Grande implica que sería lógico extender los límites de esta última para poder incluir los pastizales de Rincón de Cobo.

Creemos importante mencionar que el gerente de Rincón de Cobo está interesado en crear una reserva natural privada en la estancia y actualmente está investigando opciones con la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Agradecemos a Matías Montoreano (Rincón de Cobo) para su ayuda y apoyo de nuestros estudios de campo. Mark Pearman compartió sus avistajes de diciembre 2008. Sharon Lowen nos acompañó en dos salidas. Andrés Bosso nos ayudó con una referencia, y Rob Clay con datos de Uruguay. Ignacio Roesler, Alejandro Bodrati y Luis Pagano aportaron importantes mejoras al manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2008) *Threatened birds of the world 2008*. CD-ROM. BirdLife International, Cambridge.
- CHEBEZ JC (2008) *Los que se van, 2. Fauna Argentina amenazada*. Editorial Albatros, Buenos Aires.
- COLLAR NJ & WEGE DC (1995) The distribution and conservation status of the Bearded Tachuri *Polystictus pectoralis*. *Bird Conservation International* 5:367–390.
- DI GIACOMO AS (ed) *Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- AVES ARGENTINAS/AOP & SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (2008) *Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación*. Aves Argentinas/AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires.
- LOWEN JC & MAZAR BARNETT J (2009) Una evaluación del potencial ecoturístico de la Estancia Rincón de Cobo, provincia de Buenos Aires. Informe inédito.
- LOWEN JC, MAZAR BARNETT J & PEARMAN M (2009) Nueva información sobre la distribución del Chorlito Ceniciento (*Pluvianellus socialis*) y del Doradito Copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*) en la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 54:69–71.
- NAROSKY T & DI GIACOMO AG (1993) *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A., Buenos Aires.
- REMSEN JV (2003) Family Furnariidae (ovenbirds). Pp. 162–357 en: DEL HOYO J, ELLIOTT A & CHRISTIE DA (eds) *Handbook of the birds of the world. Volumen 8*. Lynx Edicions, Barcelona.
- ZIMMER KJ & WHITTAKER A (2009) Records of Hudson's Canastero *Asthenes hudsoni* from Rio Grande do Sul, Brazil. *Cotinga* 31:44–46.

Recibido: septiembre de 2009 / Aceptado: junio de 2010



Tabla 1. Lista de especies registradas en Rincón de Cobo con una evaluación de su estatus.

ESPECIE	ESTATUS	ESPECIE	ESTATUS
Colorada <i>Rhynchotus rufescens</i>	E	Gallareta Ligas Rojas <i>Fulica armillata</i>	E
Inambú Común <i>Nothura maculosa</i>	R	Ostrero Común <i>Haematopus palliatus</i>	R
Macá Común <i>Rollandia rolland</i>		Tero-real <i>Himantopus mexicanus</i>	I
Macá Grande <i>Podiceps major</i>	I	Tero Común <i>Vanellus chilensis</i>	R
Pingüino Patagónico <i>Spheniscus magellanicus</i>	I, CA, vu	Chorlo Pampa <i>Pluvialis dominica</i>	
Petrel Barba Blanca <i>Procellaria aequinoctialis</i>	VU, vu	Chorlito Palmado <i>Charadrius semipalmatus</i>	E
Petrel Gigante Común <i>Macronectes giganteus</i>	I, vu	Chorlito de Collar <i>Charadrius collaris</i>	I
Albatros Ceja Negra <i>Thalassarche melanophrys</i>	I, EN, vu	Chorlito Doble Collar <i>Charadrius falklandicus</i>	
Biguá <i>Phalacrocorax brasilianus</i>	I	Chorlito Pecho Colorado <i>Charadrius modestus</i>	I, vu
Garza Bruja <i>Nycticorax nycticorax</i>	E	Chorlo de Magallanes <i>Pluvianellus socialis</i>	I, CA, en
Chiflón <i>Syrigma sibilatrix</i>	R	Becasina Común <i>Gallinago paraguaiæ</i>	
Garcita Blanca <i>Egretta thula</i>		Playero Trinador <i>Numenius phaeopus</i>	E
Garza Blanca <i>Casmerodius albus</i>	I	Pitotoy Grande <i>Tringa melanoleuca</i>	
Garcita Bueyera <i>Bubulcus ibis</i>	E	Pitotoy Chico <i>Tringa flavipes</i>	
Garcita Azulada <i>Butorides striatus</i>	E	Playero Rojizo <i>Calidris canutus rufus</i>	E, en
Cuervillo de Cañada <i>Plegadis chihi</i>	E	Playerito Blanco <i>Calidris alba</i>	I
Espátula Rosada <i>Platalea ajaja</i>	E	Playerito Rabadilla Blanca <i>Calidris fuscicollis</i>	I
Cigüeña Americana <i>Ciconia maguari</i>	R	Playerito Unicolor <i>Calidris bairdii</i>	I
Chajá <i>Chauna torquata</i>	R	Salteador Chico <i>Stercorarius parasiticus</i>	E
Cisne Cuello Negro <i>Cygnus melanocorypha</i>	I	Gaviota Capucho Gris <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	
Pato Cuchara <i>Anas plataea</i>		Gaviota Capucho Café <i>Chroicocephalus maculipennis</i>	R
Pato Capuchino <i>Anas versicolor</i>	R	Gaviota Cangrejera <i>Larus atlanticus</i>	VU, am
Pato Overo <i>Anas sibilatrix</i>	I	Gaviota Cocinera <i>Larus dominicanus</i>	R
Pato Barcino <i>Anas flavirostris</i>	I	Gaviotín Pico Grueso <i>Sterna nilotica</i>	E
Pato Maicero <i>Anas georgica</i>		Gaviotín Real <i>Sterna maxima</i>	R
Pato Picazo <i>Netta peposaca</i>		Gaviotín Pico Amarillo <i>Sterna (sandvicensis) eurygnatha</i>	E
Milano Blanco <i>Elanus leucurus</i>	R	Gaviotín Elegante <i>Sterna elegans</i>	E, CA
Caracolero <i>Rostrhamus sociabilis</i>	E	Gaviotín Sudamericano <i>Sterna hirundinacea</i>	I
Gavilán Planeador <i>Circus buffoni</i>	R	Gaviotín Golondrina <i>Sterna hirundo</i>	
Gavilán Ceniciento <i>Circus cinereus</i>		Gaviotín Lagunero <i>Sterna trudeaui</i>	R
Esparvero Común <i>Accipiter striatus</i>		Gaviotín Chico Común <i>Sterna supercilii</i>	
Aguilucho Alas Largas <i>Buteo albicaudatus</i>		Paloma Doméstica <i>Columba livia</i>	
Águila Mora <i>Geranoetus melanoleucus</i>	E	Paloma Picazuro <i>Columba picazuro</i>	R
Taguató Común <i>Buteo magnirostris</i>	R	Paloma Manchada <i>Columba maculosa</i>	I
Carancho <i>Caracara plancus</i>	R	Torcaza <i>Zenaida auriculata</i>	R
Chimango <i>Milvago chimango</i>	R	Yeruti Común <i>Leptotila verreauxi</i>	R
Halconcito Colorado <i>Falco sparverius</i>	E	Cotorra <i>Myiopsitta monachus</i>	R
Chiricote <i>Aramides cajanea</i>	R	Cuclillo Canela <i>Coccyzus melacoryphus</i>	E
Gallineta Común <i>Pardirallus sanguinolentus</i>	R	Pirincho <i>Guira guira</i>	R
Pollona Pintada <i>Gallinula melanops</i>	E	Lechuza de Campanario <i>Tyto alba</i>	I
Gallareta Escudete Rojo <i>Fulica rufifrons</i>		Lechucita Vizcachera <i>Athene cunicularia</i>	



ESPECIE	ESTATUS	ESPECIE	ESTATUS
Lechucita Vizcachera <i>Athene cunicularia</i>		Estornino Pinto <i>Sturnus vulgaris</i>	
Lechuzón de Campo <i>Asio flammeus</i>	I	Estornino Crestado <i>Acridotheres cristatellus</i>	
Picaflor Común <i>Chlorostilbon aureoventris</i>	R	Cachirla Pálida <i>Anthus hellmayri</i>	R
Picaflor Garganta Blanca <i>Leucochloris albicollis</i>	R	Pitayumi <i>Parula pitayumi</i>	
Carpintero Real <i>Colaptes melanochloros</i>	R	Cachilo Canela <i>Donocospiza albifrons</i>	R
Carpintero Campestre <i>Colaptes campestris</i>	R	Corbatita Domino <i>Sporophila collaris</i>	
Remolinera Común <i>Cinclodes fuscus</i>		Jilguero Dorado <i>Sicalis flaveola</i>	
Hornero <i>Furnarius rufus</i>	R	Misto <i>Sicalis luteola</i>	R
Curutié Ocráceo <i>Cranioleuca sulpherifera</i>	R	Verdón <i>Embernagra platensis</i>	R
Espartilero Pampeano <i>Asthenes hudsoni</i>	R, vu	Chingolo <i>Zonotrichia capensis</i>	R
Espintero Pecho Manchado <i>Phacellodomus striaticollis</i>	R	Varillero Ala Amarilla <i>Thilius thilius</i>	R
Espartilero Enano <i>Spartonoica maluroides</i>	R, CA, vu	Varillero Congo <i>Chrysomus ruficapillus</i>	E
Junquero <i>Phleocryptes melanops</i>	R	Pecho Amarillo Chico <i>Pseudoleistes virescens</i>	R
Leñatero <i>Anumbius annumbi</i>	R	Tordo Músico <i>Agelaioides badius</i>	E
Piojito Gris <i>Serpophaga nigricans</i>	R	Tordo Renegrido <i>Molothrus bonariensis</i>	
Piojito Común <i>Serpophaga subcristata</i>	I	Tordo Pico Corto <i>Molothrus rufoaxillaris</i>	E
Tachurí Sietecolores <i>Tachuris rubrigastra</i>	R	Pecho Colorado <i>Sturnella supercilialis</i>	
Tachurí Canela <i>Polystictus pectoralis</i>	E, CA, vu	Verderón <i>Carduelis chloris</i>	E
Doradito Copetón <i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	E	Cabecitanegra Común <i>Carduelis magellanica</i>	R
Doradito Común <i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	E	Gorrión <i>Passer domesticus</i>	R
Churrinche <i>Pyrocephalus rubinus</i>	E		
Dormilona Cara Negra <i>Muscisaxicola macloviana</i>	I		
Sobrepuesto Común <i>Lessonia rufa</i>			
Pico de Plata <i>Hymenops perspicillatus</i>	R		
Picabuey <i>Machetornis rixosus</i>	R		
Suirirí Real <i>Tyrannus melancholicus</i>	E		
Tijereta <i>Tyrannus savana</i>	E		
Benteveo Común <i>Pitangus sulphuratus</i>	R		
Golondrina Doméstica <i>Progne chalybea</i>	E		
Golondrina negra <i>Progne modesta</i>	E		
Golondrina Parda <i>Progne tapera</i>	E		
Golondrina Ceja Blanca <i>Tachycineta leucorhoa</i>	E		
Golondrina Patagónica <i>Tachycineta meyeni</i>			
Golondrina Tijereta <i>Hirundo rustica</i>	E		
Ratona Aperdizada <i>Cistothorus platensis</i>	R		
Ratona Común <i>Troglodytes aedon</i>	R		
Tacuarita Azul <i>Poliophtila dumicola</i>			
Zorzal Colorado <i>Turdus rufiventris</i>	R		
Zorzal Chalchalero <i>Turdus amaurochalinus</i>	I		
Calandria Común <i>Mimus saturninus</i>	R		
Calandria Real <i>Mimus triurus</i>	I		

REFERENCIAS

R = especie probablemente residente en Rincón de Cobo y alrededores
I = especie probablemente sólo visitante invernal en Rincón de Cobo
E = especie probablemente visitante estival en Rincón de Cobo
CA = especie clasificada como Casi Amenazada a nivel global (BirdLife International 2008)
VU = especie clasificada como Vulnerable a nivel global (BirdLife International 2008)
EN = especie clasificada como En Peligro a nivel global (BirdLife International 2008)
en = especie clasificada como En Peligro a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008)
am = especie clasificada como Amenazada a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008)
vu = especie clasificada como Vulnerable a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008)