



## PRIMER REGISTRO DEL MILANO TIJERETA (*Elanoides forficatus*) EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS Y NUEVA OBSERVACIÓN PARA EL NORDESTE DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Pablo G. Grilli<sup>1</sup> y María Luz Arellano<sup>2</sup>

<sup>1</sup>División Vertebrados, Sección Ornitología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata (UNLP). Paseo del Bosque (1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: pablogrilli@gmail.com

<sup>2</sup>CONICET. Instituto de Botánica Carlos Spegazzini – calle 53 n° 477 (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: mluzarellano@yahoo.com.ar

En la Argentina, el milano tijereta (*Elanoides forficatus*) habita las selvas del nordeste y noroeste, aunque esporádicamente puede ser registrado fuera de su área de distribución (Narosky y Yzurieta, 1987; Sferco y Baldo, 1992; Mazar Barnett y Pearman, 2001) llegando hasta la provincia de Buenos Aires de manera ocasional (Dabbene, 1920; Narosky y Di Giacomo, 1993; Olrog, 1979; GORA, 1991; Roesler, 2001). Según De la Peña (1997), la especie no cuenta con registros para la provincia de Entre Ríos.

El día 25 de noviembre de 2005, en horas del mediodía, pudieron observarse tres individuos de la especie planeando a unos 60 metros de altura sobre el río Paraná, en la localidad de La Paz (30° 44,6413' S – 69° 39,0384' W), en el departamento homónimo, Entre Ríos. Los milanos se encontraban aprovechando una térmica que también utilizaba un jote cabeza negra (*Coragyps atratus*).

Además, durante la mañana del 27 de febrero de 2007, se observó un individuo de esta especie sobrevolando el lago artificial del Parque Zoológico y Botánico de La Plata (34° 54,370' S – 57° 56,078' W), en el partido homónimo del nordeste de la provincia de Buenos Aires.

Esta comunicación da cuenta de un nuevo registro de la especie para el nordeste bonaerense, y el primero para la provincia de Entre Ríos, aunque su presencia en esta última era un hecho altamente probable, dado que se encuentra en una situación geográfica intermedia entre sus áreas de distribución habitual y los sitios más meridionales donde resulta ocasional.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. LOLA. Buenos Aires, 126 páginas.
- DABBENE, R. 1920. Miscelánea ornitológica. Hornero, 2: 133-136.
- Grupo de Observadores Ribereños de Aves (GORA). 1991. Ñacurutú, Milano Tijereta y Boyero Negro en el partido de Berisso. Garganchillo, 11: 13-15.
- MAZAR BARNETT, J. y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de las aves argentinas. Lynx Edicions. Barcelona, 164 páginas.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA, 127 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324
- ROESLER, I. 2001. Tres especies poco comunes en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves, 42: 30.
- SFERCO, G. D. y L. BALDO. 1992. Presencia del milano tijereta (*Elanoides forficatus*) en la provincia de Córdoba. Nuestras Aves, 27: 29.

Recibida: mayo 2006