



ARTICULOS

Revista Nuestras Aves, 53:23-24

NUEVOS REGISTROS DEL AGUILUCHO LANGOSTERO (*Buteo swainsoni*) PARA EL NORDESTE DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

Roberto Pereyra Lobos y Leonardo Muñoz

Departamento de Áreas Naturales Protegidas. Dirección de Recursos Naturales Renovables. Boulogne sur mer s/n Parque General San Martín (5500) Mendoza, provincia de Mendoza. Correo electrónico: pereyralobos@yahoo.com.ar

En esta nota presentamos nuevos avistajes de aguilucho langostero (*Buteo swainsoni*) registrados entre noviembre y febrero de los años 2004-2005 y 2005-2006 en cuatro sitios del departamento Lavalle, provincia de Mendoza, Argentina:


1. Ruta Nacional 142, Reserva Natural Bosques Telteca (32° 23' S, 67° 54' O) (Figura 1, punto 1) declarado Sitio prioritario para la conservación de las aves (Pescetti, E. en A. S. Di Giacomo, 2005). Esta zona corresponde a la Provincia fitogeográfica del Monte, con estepas de arbustos de Zigofiláceas (*Larrea* sp.), la estepa edáfica de halófitas y un estrato arbóreo de tipo edáfico azonal dominado por algarrobo (*Prosopis flexuosa*) (Villagra *et al.*, 2002). La fisonomía de este ambiente es la de un bosque muy abierto, llegando a superar a veces los 10 metros de distancia entre copas (Álvarez, 2002). Los aguiluchos

fueron observados casi a diario, en grupos generalmente de hasta cinco individuos, tanto volando como posados sobre algarrobos.

2. La Asunción (32° 34' S, 68° 16' O) (Figura 1, punto 2). Esta es un área similar a la anterior pero con estepas halófitas dominantes y mucho más empobrecida por efecto de modificaciones humanas. En este sitio se los observó generalmente posados sobre alambrados y en algunos casos sobre árboles secos que les servían de percha.

3. Inmediaciones del río Mendoza (32° 35' 29.9'' S, 68° 18' 12.5'' O) (Figura 1, punto 3), posados sobre alambrados de la Ruta Nacional N° 142. Esta área antropizada corresponde al límite entre el secano y el oasis del departamento Lavalle. Se los observó cazando insectos en el suelo.

Figura 1. Sector del departamento Lavalle (Mendoza, Argentina) con ubicación de las localidades con registros del aguilucho langostero.





4. El Retamo (32° 33' S, 67° 25' O) (Figura 1, punto 4). Sitio cercano al río Desaguadero, con una vegetación similar a la observada en la Reserva Telteca pero con algarrobos de menor porte y con mayor presencia de estepa arbustiva halófito. Se observaron individuos volando en grupos y posados sobre algarrobos generalmente secos.

El aguilucho langostero es una especie migratoria que cría en Norteamérica y pasa el invierno boreal en Sudamérica, principalmente en las provincias del centro de la Argentina (England *et al.*, 1997). Mencionada para Cuyo por Fontana (1908), aunque sin precisar localidad. Roig (1965) la cita para el departamento Santa Rosa y como ocasional para el este provincial. Con estos nuevos datos aportados se amplía el número de observaciones para la provincia de Mendoza y se dan a conocer los primeros registros para el departamento Lavalle. La presencia de la especie durante dos temporadas estivales parece indicar que el aguilucho langostero podría ser un residente estival del nordeste mendocino.

Agradecemos a José H. Sarasola por las sugerencias a este trabajo y a Flavio Martínez por la ayuda en la elaboración del mapa.

BIBLIOGRAFÍA CITADA:

- ÁLVAREZ, J. A. 2002. Estructura forestal y estado de conservación del bosque de algarrobos (*Prosopis flexuosa*) del noreste de la Provincia de Mendoza y su aplicación al manejo. Tesis de Grado. Universidad de Congreso, 67 páginas.
- ENGLAND, A. S., M. J. BECHARD y C. S. HOUSTON. 1997. Swainson's hawk (*Buteo swainsoni*) en A. Poole y F. Gill (editores), "The birds of North America": 1-28. The Academy of American Ornithologists Union. Washington, DC.
- FONTANA, J. L. 1908. Enumeración Sistemática de las aves de la Región Andina (Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca). Escuela Nacional de Industrias Químicas de San Juan. Buenos Aires, 16 páginas.
- PESCETTI, E. 2005. Reserva Forestal Florística y Faunística Bosques Telteca. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las Aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la Biodiversidad: 267-269. Temas de naturaleza y conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, 514 páginas.
- ROIG, V. 1965. Elenco Sistemático de los Mamíferos y Aves de la provincia de Mendoza. Notas sobre su distribución geográfica. Boletín de Estudios Geográficos, 49 (12): 175-227.
- VILLAGRA, P. E., M. A. CONY, N. G. MANTOVÁN, B. E. ROSSI, M. M. GONZÁLEZ LOYARTE, R. VILLALBA y L. MARONE. 2004. Ecología y manejo de los algarrobales de la provincia Fitogeográfica del Monte: 1-32 en M. F. Arturi, J. Frangi y J. Goya (editores) "Ecología y manejo de Bosques Nativos de Argentina". Editorial Universidad Nacional de la Plata.

Recibida: junio de 2006