



PICAFLOR COMETA (*Sappho sparganura*), PICAFLOR RUBÍ (*Sephanoides sephanioides*) Y PICAFLOR GARGANTA BLANCA (*Leucochloris albicollis*) EN ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA

César Alejandro Giarduz

Ricardo Gutiérrez 320 (2000) Rosario, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: hebipack@citynet.net.ar

Se comenta el hallazgo de picaflor cometa (*Sappho sparganura*), picaflor rubí (*Sephanoides sephanioides*) y picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*), visitando libadores de picaflores situados en el patio de una casa (32°52'49.1" S, 60°41' 21.5" O), del barrio La Florida de Rosario, departamento homónimo, provincia de Santa Fe. Dicho barrio, próximo al río Paraná, se caracteriza por poseer una abundante arboleda. Los libadores son mantenidos, desde hace cinco años y son visitados frecuentemente por picaflor común (*Chlorostilbon aureoventris*) y picaflor bronceado (*Hylocharis chrysura*). La proporción de agua y azúcar utilizada en los mismos es de 1+3 (una parte de azúcar más tres partes de agua).

Picaflor cometa (*Sappho sparganura*)

El 3 de mayo de 2006, apareció lo que creí en un principio que se trataba de una hembra de picaflor cometa en el jardín de mi casa. El ejemplar poseía la cola algo corta, los vexilos externos ventrales de las timoneras blancos, el lomo apenas tonalizado de carmín, y el ápice de las timoneras negro, lo cual permite concluir que era un macho joven. Visitó continuamente el lugar, permaneció gran parte del día alimentándose en los comederos, vocalizando y posándose en árboles próximos. Fue fotografiado en varias ocasiones.

El 10 de junio del mismo año fue observado por Martín Manassero y Horacio Luna en el mismo domicilio. Este individuo permaneció en la zona hasta mediados de septiembre. Durante la primavera y el verano de ese año el individuo no volvió a ser visto.

A principios de junio de 2007 aparece un ejemplar macho adulto. Su actitud hacia los libadores (de extrema confianza) y la rapidez con que tomó posesión de su territorio, además de observar en fotos del año anterior la existencia de una mancha negra gular, hace sospechar que se trata del mismo individuo que visitó el lugar el año pasado.

Esta especie se distribuye por las sierras y cordones montañosos de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza,

Córdoba, San Luis, Neuquén y ocasionalmente llega a La Pampa y Buenos Aires (De la Peña, 1999). En Santa Fe, tiene una cita para el departamento 9 de Julio (Giai, 1950). Este dato se considera antiguo y requeriría ser confirmado con citas modernas (De la Peña, 1997). En Buenos Aires tiene pocos registros (Pereyra, 1938; Barrios *et al.*, 1992). Realizaría desplazamientos irregulares hacia el este, durante el otoño e invierno (Olrog, 1979).

Picaflor rubí (*Sephanoides sephanioides*)

Desde el 6 de junio de 2006, un macho visitó los libadores de la casa, por varios días consecutivos, en forma esporádica (ver fotos).

Los días 19 y 28 de agosto del 2007 se observa nuevamente un individuo de esta especie realizando vuelos a muy poca altura (aparentemente cazando insectos) pero sin libar de los bebederos.

La especie se distribuye por el sudoeste del país, habitando el bosque andino patagónico y sus márgenes, desde Mendoza hasta Tierra de L Fuego, realizando desplazamientos hacia el este, durante el invierno, hasta Córdoba y Buenos Aires (De la Peña, 1999). No tendría citas para Santa Fe (De la Peña, 1997, 1999 y 2006). En Buenos Aires, es ocasional y tiene pocas citas (Narosky y Di Giacomo, 1993), el registro publicado más reciente correspondería a la localidad de Carhué, partido de Adolfo Alsina, realizado en julio de 1998 (Maugeri, 2002).


Picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*)

Desde mayo de 2007, visita regularmente los alimentadores un ejemplar de picaflor garganta blanca. Lo hace en horas tempranas de la mañana y en el ocaso, coincidentemente con el horario en que no está el picaflor cometa. Al mismo tiempo aparece un picaflor bronceado, con el cual no hay disputas. Pudo ser fotografiado. Si bien se halla dentro de su área de distribución es la primera vez que lo observamos en esta zona.

Se distribuye en Misiones, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires (De la Peña, 1999),



ARTICULOS



Las dos fotos superiores muestran el ejemplar macho de picaflor cometa juvenil observado en mayo de 2006. Foto izquierda: Raquel Morales, foto derecha: César Giarduz.



Estas tres imágenes ilustran el ejemplar que se acercó a los libadores en junio de 2007. Fotos: Raquel Morales.

además La Pampa (Chebez *et al.*, 1998). En Santa Fe fue observado en Villa Gobernador Gálvez por M. Manassero y H. Luna. Raro, se desconoce su residencia y nidificación local (De la Peña, 2006, Manassero *et al.*, 2006).

En todos los casos se observa gran agresividad del picaflor cometa hacia las otras especies de picaflores.

Cuando éste se encuentra en la zona de libadores las otras especies están ausentes y si alguna aparece, el primero las ahuyenta con una larga persecución.

Se agradece a Martín Manassero y Horacio Luna, por sus comentarios y facilitar bibliografía. También a Alejandro Bodrati, por sus aportes.



> ARTICULOS



En las dos fotos superiores, macho de picaflor rubí, especie característica del Bosque Andino Patagónico, fotografiado en Rosario. Foto izquierda: Raquel Morales, foto derecha: César Giarduz. A la derecha, picaflor garganta blanca. Foto: Raquel Morales

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BARRIOS, I., H. POVEDANO Y F. N. MOSCHIONE. 1992. Nuevas aves para la Reserva de Punta Lara III. Garganchillo, 12: 10-11.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía LOLA, 12. Buenos Aires, 126 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. L.O.L.A. Monografía N° 15. Buenos Aires, 126 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves Argentinas. Lista y distribución. L.O.L.A. Monografía N° 18. Buenos Aires, 244 páginas.
- GIAI, A. 1950. Notas de viajes. El Hornero, 9 (2): 121-164.
- MANASSERO, M.; H. LUNA y L. ACQUAVIVA. 2006. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte II. Nuestras Aves, 51: 29-31.
- MAUGERI, F. G. 2002. Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves, 44: 16-19.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 127 páginas.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.
- PEREYRA, J. A. 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. Memorias del Jardín Zoológico de La Plata, 9: 1-304.

Recibida: julio de 2006