



NUEVOS REGISTROS DE ÁGUILA CRESTUDA NEGRA (*Spizaetus tyrannus*) PARA LA PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA

Julián Baigorria, Facundo Barbar, Marcelo Cavicchia, María Verónica Gil Suárez y Agustín Quaglia

Gestión Águilas Crestadas. Grupo Especies en Peligro y Áreas Protegidas, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Centro de Estudios en Ciencias Naturales y Antropología (CECNA), Universidad Maimónides. Valentín Virasoro 732 (C1405BDB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Teléfono/fax: 4905-1228. Correo electrónico: julianbaigorria@gmail.com

Durante dos campañas realizadas por integrantes de la Gestión Águilas Crestadas (FHN "Félix de Azara") fueron observados en dos oportunidades, ejemplares de águila crestuda negra (*Spizaetus tyrannus tyrannus*).

Se trata de una rapaz de hábitos sigilosos y plumaje oscuro. Resulta difícil su detección en la entramada vegetación selvática. Por estos motivos, es posible que esté subobservada en muchos puntos de su distribución.

En la Argentina se encuentra en la provincia de Misiones, con escasos registros (Chebez y Anfuso, 2008) y para la provincia de Formosa con un único registro (Salvador y Narosky, 1987).

Dentro del área de observación, la única especie que podría generar confusión, por tamaño y coloración, es el águila negra (*Buteogallus urubitinga*). Pero los registros fueron lo suficientemente claros, como para distinguir las características que diferencian, claramente a campo, a las dos especies: en el águila crestuda negra un barrado ventral claro en las alas y en la cola, y la posición de las alas en vuelo. Éstas forman una concavidad tal que si se proyecta una línea imaginaria entre los dos puntos más adelantados de las alas, la cabeza queda por debajo de la misma (Seipke, 2004).

El área de nuestros avistajes presenta un relieve ondulado. Los sectores con pendiente mayor a 30° y en las márgenes de los cursos de agua están cubiertas por vegetación característica del distrito de las selvas, provincia fitogeográfica Paranaense (Cabrera, 1976). Las partes de menor pendiente, se encuentran forestadas con pinos exóticos (*Pinus taeda* y *P. ellioti*), de aproximadamente 13 a 17 años de edad. En la región detectamos cuadrillas de monos caí (*Cebus nigritus*) de más de 20 individuos, así como también pavas de monte (Cracidae), tucanes (Ramphastidae) y diversos marsupiales (Didelphidae), los que serían presas potenciales para esta águila (Ferguson-Lees y Christie, 2001).

El 26 de marzo de 2004 desde las 18:15 hasta las 18:35 fue obtenido el primer registro (J. B. y F. B.). Se observaron dos adultos sobrevolando una amplia

zona (26°01' 31,5" S y 54°37' W) en el departamento General Belgrano. Realizaban vuelos en círculo, elevándose levemente para luego avanzar aleteando de tanto en tanto, a una altura aproximada de 60 metros. Ambos individuos efectuaban un recorrido semicircular que abarcó una distancia aproximada de cuatro kilómetros, sobre un valle angosto con vegetación selvática y luego una zona forestada. No se registró vocalización de los ejemplares.

El día 22 de septiembre de 2004 a las 13:00 en los 26°01' 01,8" S, 54°07' 35,3" W, en el mismo departamento, se obtuvo el segundo registro, también de dos adultos, una hembra y un macho (A.Q., com pers.). Se desplazaban aproximadamente a 90 metros de altura (en esta ocasión tampoco se detectaron vocalizaciones). Ambos serían los primeros registros para el departamento General Belgrano, Misiones.

Teniendo en cuenta que en los dos casos se observaron dos adultos de ambos sexos, presumiblemente parejas, y que el área circundante cumple con los requerimientos mínimos para el asentamiento de una pareja reproductiva (Ferguson-Lees y Christie, 2001), sería oportuno confirmar la presencia de un nido activo en las inmediaciones de los sitios de avistajes.

Agradecemos a Jorge Anfuso, Juan Carlos Chebez, Marcos Debarba, Luis Sáenz y Lucas Rodríguez por sus aportes.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CABRERA, A. 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Editorial Acme, Bs. As.
- CHEBEZ, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Editorial Albatros. Buenos Aires, 604 páginas.
- CHEBEZ, J. C. y J. ANFUSO. 2008. Águila crestuda negra. En J. C. Chebez. "Los que se van. Fauna argentina amenazada". Tomo 2: 208-210. Albatros. Buenos Aires, 416 páginas.
- FERGUSON-LEES, J. y D. A. CHRISTIE. 2001. Raptors of the world. Houghton Mifflin Company, Boston, Massachusetts.
- SALVADOR, S y T. NAROSKY. 1987. Nuevos registros para aves argentinas. Nuestras Aves, 13: 9-11.
- SEIPKE, S. H. 2004. Identificación de campo de rapaces amenazadas en Argentina. Libro de Actas de SAICR I. La Plata.

Recibida: agosto de 2006