



Pampa. Esta observación constituye el primer registro de reproducción de la especie en La Pampa.

Agradecemos a Federico Bruno, Gabriel Rodríguez y Andrés Pautasso por el aporte bibliográfico.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BLENDINGER P, DE LUCCA E & SAGGESE M (1987) Nidificación otoño-invernal del Lechuzón Orejudo. *Nuestras Aves* 12:19.
- FRAGA RM (1984) Casos de nidificación otoño-invernal en algunas rapaces (*Tyto alba*, *Asio clamator*, *Elanus leucurus*) en Lobos, Buenos aires. *Hornero* 12:193–195.
- HOLT DW, BERKELEY R, DEPPE C, ENRIQUEZ ROCHA PL, OLSEN PD, PETERSEN JL, RANGEL SALAZAR JL, SEGARS KP & WOOD KL (1999) Family Strigidae (Typical owls). Pp. 152–242 en: DEL HOYO J, ELLIOT A & SARGATAL J (eds) *Handbook of the birds of the world. Volumen 5*. Lynx Edicions, Barcelona.
- ISACCH JP, BÓ MS & MARTÍNEZ M (2000) Food habits of the Striped Owl (*Asio clamator*) in Buenos Aires province, Argentina. *Journal of Raptor Research* 34:235–237.
- MACEDA JJ & KIN MS (2001) Lista de las aves de la Facultad de Agronomía de Santa Rosa (La Pampa) y sus alrededores. *Revista de la Facultad de Agronomía- UNLPam*. 12:21–30.
- MACEDA JJ, MERO MI, RIESCO H & DOLSAN M (2001) Lista de las aves de la reserva Parque Luro, La Pampa. *Revista de la Facultad de Agronomía- UNLPam* 12:47–59.
- MARTÍNEZ M, ISACCH JP & DONATTI F (1996) Aspectos de la distribución y biología reproductiva de *Asio clamator* en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Ornitología Neotropical* 7:157–161.
- NAROSKY T & DI GIACOMO AG (1993) *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA, Buenos Aires.
- PAUTASSO AA & DE LA PEÑA MR (2001) Observaciones sobre la biología reproductiva de *Asio clamator* en el centro de Argentina. *Hornero* 16:43–46.
- SIEGENTHALER GS, TIRANTI SI & FIORUCCI EA (1999) Relevamiento de los Vertebrados de la provincia de La Pampa. Informe final. Resumen VII, Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales. *COPROCNA*: 61.

Recibido: noviembre 2006 / Aceptado: noviembre 2009

Nuestras Aves 54: 33-35, 2009

MIGRACIÓN DEL AGUILUCHO COMÚN (*Buteo polysoma*) EN TAFÍ DEL VALLE, TUCUMÁN, ARGENTINA

Patricia Capllonch y Diego Ortiz

Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205 (4000), Tucumán, Argentina. Correo electrónico: cenaar@yahoo.com.ar.

El valle de Tafí (26°49'20"S, 65°43'16"O) es parte de una ruta migratoria de varias especies de aves (Olrog 1949, Handford 1983, Rumboll *et al.* 2005, Trejo *et al.* 2007), que se desplazan desde el sur de Argentina a través de los contrafuertes de valles andinos y subandinos. Este valle con ubicación norte-sur, de 30 km de largo y elevado a 2000 msnm, se encuentra entre el Aconquija y las Cumbres Calchaquies, dos macizos montañosos de más de 150 km de largo y 5000 msnm. Los vientos del sur son orientados entre los dos cordones montañosos adquiriendo mayor velocidad al atravesar el valle. La vegetación del valle está conformada por un mosaico de pastizales húmedos de altura, bosques de queñoas (*Polylepis australis*), bosques de aliso (*Alnus acuminata*), y en el fondo del valle campos cultivados y la villa de Tafí con huertas y jardines. A los 3000 msnm los dos cordones rodean la angostura El Infiernillo (Fig. 1), con altos pajonales de *Festuca*. Luego de este angostamiento, el paisaje cambia drásticamente hacia los

desérticos y cálidos valles Calchaquies. Esta sucesión de valles secos con vegetación de monte y prepuna comunica el valle de Tafí directamente con la puna de Salta, Jujuy y sur de Bolivia.

El Aguilucho Común (*Buteo polysoma*) es residente en Tafí, donde sólo algunos pocos individuos adultos se observan durante el verano. En este trabajo reportamos observaciones que muestran que a partir de los primeros días de abril aumenta el número de individuos jóvenes, haciéndose más notorio este aumento en mayo y junio.

Durante varios años observamos Aguiluchos Comunes mientras realizábamos anillado de aves en El Infiernillo. Entre el 11 y el 17 de junio de 2005, recorrimos en varias oportunidades la ruta 307 entre los 2500 y 2800 msnm, entre La Quebradita y el km 78. Los días 12 y 13 de junio llegó un frente frío y la temperatura pasó de 18°C a 3°C el día 14 de junio (y hasta -2°C durante la noche). Luego de la llegada del frente frío, observamos aproximadamente



un Aguilucho Común cada 300 m, posados en postes de alambrado a los costados de la ruta, en el suelo y en rocas dispersas en pastizales (Fig. 1). En 10 km de recorrido avistamos 40 aguiluchos, y todos eran jóvenes con manchas canelas en la garganta, cuello, pecho y vientre, y bigoterías y cejas claras. Durante los días 15 y 16 de junio de 2005 la mayoría de los aguiluchos ya no estaban en el lugar, y el 17 solamente observamos un individuo. Colectamos un ejemplar macho juvenil sin mudas en el plumaje, cuyas medidas eran: longitud total: 450 mm, ala: 350 mm, cola: 250 mm, tarso: 91 mm, culmen: 30 mm, y su peso 600 g. El espécimen fue depositado en la colección de aves de la Fundación Miguel Lillo (Fig. 1). Todos los individuos eran sumamente mansos; era posible acercarse hasta unos 5 m. Los observamos capturando ratones e insectos, y especialmente se alimentaban de langostas. Observamos varias agresiones intra e interespecíficas, por ejemplo, en una ocasión un Aguilucho Común fue perseguido por un Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*), y en otra un adulto en El Infiernillo atacó a un joven que permanecía sobre una piedra. Además de las observaciones anteriormente mencionadas, el día 6 de abril de 2006 observamos 5 individuos en el km 78 de

la ruta 307 y el 5 de mayo de 2006, recorrimos el mismo camino que en el 2005, avistando unos 30 individuos, pero también otros ejemplares en varios lugares del valle, nuevamente la mayoría jóvenes.

Los desplazamientos del Aguilucho Común ya han sido mencionados para el sur de Chile y Argentina (Humphrey *et al.* 1970, Jiménez 1995). Por esto se ha sugerido que las poblaciones del sur de Argentina migrarían en el invierno hacia el norte (Olrog 1959, 1968). La mayor parte de la población del Aguilucho Común se ausenta durante el otoño en la provincia de Santa Cruz (Imberti 2005), quedando sólo algunos individuos residentes. Así también la ausencia de jóvenes en Tierra del Fuego durante el otoño ha sido reportada (Humphrey *et al.* 1970). Jiménez (1995) observó que las abundancias disminuyen en Chile central durante el invierno. Paralelamente, se ha registrado el aumento en la abundancia en otoño en la provincia de Córdoba, centro de Argentina (Nores *et al.* 1983). Estos datos sugieren la existencia de una ruta migratoria en Argentina occidental. Esta ruta migratoria también es usada por otras rapaces que crían en el extremo sur del continente como *Buteo albigula*, *Falco peregrinus cassini* y *Milvago chimango temucoensis*, que bordearían



Figura 1. Foto panorámica del Valle de Tafí. En las fotos pequeñas, Aguiluchos Comunes (*Buteo polyosoma*) en migración en el El Infiernillo, Tucumán. A) juvenil colectado, B) y C) juveniles migrantes.



en invierno la cordillera de los Andes por el oeste hasta el norte de Argentina, Chile, Bolivia y Perú (Olrog 1963, Olrog y Capllonch 1986, Trejo *et al.* 2007). Es importante destacar la importancia de los frentes fríos, como el registrado en junio, que actúan como “viento de cola” (Olivo 2005) favoreciendo el vuelo de las aves planeadoras.

Agradecemos a Sergio Seipke por identificar el material fotográfico y por sus valiosas opiniones, a Ignacio Ferro por las fotografías y a dos revisores anónimos por sus sugerencias y comentarios.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- HANDFORD P (1983) Breves notas sobre las aves del Valle de Tafi, Provincia de Tucumán. *Neotrópica* 29:97–105.
- HUMPHREY PS, BRIDGE D, REYNOLDS PW & PETERSON RT (1970) *Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego)*. Smithsonian Institution, Washington DC.
- IMBERTI S (2005) *Aves de Los Glaciares. Inventario ornitológico del Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz, Patagonia, Argentina*. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata & Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires.
- JIMÉNEZ JE (1995) Historia natural del Aguilucho (*Buteo polyosoma*): una revisión. *Hornero* 14:1–9.
- NORES M, YZURIETA D & MIATELLO R (1983) Lista y distribución de las aves de Córdoba. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba* 56:1–114.
- OLIVO C (2005) Cold fronts and raptor migration in Bolivia. *Ornitología Neotropical* 16:109–115.
- OLROG CC (1949) Breves notas sobre la Avifauna de la Aconquija. *Acta Zoológica Lilloana* 7:139–159.
- OLROG CC (1959) *Las aves argentinas: una guía de campo*. Instituto Miguel Lillo, Tucumán.
- OLROG CC (1963) Lista y distribución de las aves argentinas. *Opera Lilloana* 9:1–377.
- OLROG CC (1968) *Las aves sudamericanas: una guía de campo*. Instituto Miguel Lillo, Tucumán.
- OLROG CC & CAPLLONCH P (1986) Biornitología Argentina. *Historia Natural* 2:1–41.
- RUMBOLL M, CAPLLONCH P, LOBO R & PUNTA G (2005) Sobre el anillado de aves en Argentina: recuperaciones y avistajes. *Nuestras Aves* 50:21–24.
- TREJO A, CAPLLONCH P & SYMPSON L (2007) Migratory status of the White-Throated Hawk (*Buteo albigula*): What do we know up to now? *Ornitología Neotropical* 18:11–19.

Recibido: diciembre 2006 / Aceptado: enero de 2010

Nuestras Aves 54: 35-36, 2009

NIDIFICACIÓN DE LA GOLONDRINA TIJERITA (*Hirundo rustica*) EN EL PARTIDO DE PUÁN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Alejandro Morici

Cacique Pincén 513, Bordenave (8187), Puán, provincia de Bs. As, Argentina. Correo electrónico: plumaspurpuras@yahoo.com.ar

La Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*) es un migrante neártico que cuenta con registros de nidificación en el sudeste de la provincia de Buenos Aires desde la década del 80. Las menciones conocidas hasta el presente provienen de los partidos de Mar Chiquita (Martínez 1983), Balcarce, San Cayetano, Monte Hermoso (Narosky y Di Giacomo 1993), Necochea y Lobería (Fiameni 2001) (ver también Petracci y Delhey 2004).

A raíz de recorridas periódicas del partido de Puán (37°32'38"S, 62°46'02"O) se hallaron cuatro nidos (Tabla 1) ubicados en diferentes alcantarillas de hormigón armado debajo de la ruta provincial 76. El 29 noviembre de 2006, a 3,5 km al SE de Darregueira, encontramos 2 nidos (N1, N2) en principio de construcción. El 17 de diciembre se midieron los nidos ya terminados, y el 2 de enero 2007 se registraron 5 y 4 pichones respectivamente, observándose un grado mayor de desarrollo en los de N2. El 3 de di-

ciembre de 2006 hallamos un nido (N3) a 4,5 km al SE de Bordenave, y otro en 17 de Agosto, a 3 km de Bordenave (N4). El 30 de diciembre de 2006 el N3 se encontró vacío, pero no había rastros de depredación animal o humana, y el N4 presentaba 2 pichones con canutos oscuros, a pesar que en la zona se había registrado un incendio.

Estos registros amplían cerca de 150 km hacia el SO el rango conocido de nidificación de la Golondrina Tijerita. Cabe aclarar que el único nido en el que no se hallaron pichones (N3) estaba en una alcantarilla bastante amplia (2x2,25 m), con poca vegetación que tapara sus bocas.

Agradezco de manera especial a Elio Massoia (*in memoriam*) que siempre está. A mi hermano Christian, inseparable compañero, ahora en bicicleta, de recorridas y hallazgos, a Silvina, a Juan Carlos Chebez, Federico Bruno y a toda la gente que nos abre sus puertas y corazones.