Bibliografía Citada

Aves Argentinas/AOP & Secretaría de Ambi ente y Desarrollo Sustentable (2008) *Categorización de las aves argentinas según su estado de conservación.* Aves Argentinas/AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires.

Acerbo PE (2000) *Aves del Río Neuquén*. Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, Neuquén.

Chebez J, Rey N, Babarskas M & Di Giacomo A (1998) *Las aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial N°12 LOLA, Buenos Aires.

Christie M, Ramilo E & Bettinelli M (2004) *Aves del Noroeste Patagónico: Atlas y Guía.* Sociedad Naturalista Andino-Patagónica. LOLA, Buenos Aires.

del Valle A, Gader R, Funes M & Cuerpo de Guardafaunas (1989) *Aves y mamíferos de la provincia del Neuquén. Listados actualizados.* Dirección de Ecología, Neuquén.

Di Giacomo AS (ed) (2005) *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.* Temas de Naturaleza y conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Fjeldså J & Krabbe NK (1990) *Birds of the high Andes*. Zoological Museum, University of Copenhagen y Apollo Books, Svendborg.

Gregory P (1994) Notes on new and scarce birds on the Falkland Islands 1988-1990. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 114:12–20.

Henry A (1994) Recent bird records from the islands. *Warrah* 5:12.

Kirwan G (2002) Nuevos registros de Garza Azul (*Egretta caerulea*) y la Golondrina Zapadora (*Riparia riparia*) en el sur argentino. *Nuestras Aves* 44:11.

Narosky T & Di Giacomo AG (1993) *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus.* Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA, Buenos Aires.

Olrog CC (1979) Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* 27: 1–324.

Veiga J, Babarskas M & Acerbo P (2002) Nuevas observaciones de aves para la provincia de Neuquén, Argentina. *Nuestras Aves* 44:10–11.

Veiga J (2005a) Área Natural Protegida Auca Mahuida. Pp. 326–328 en: Di Giacomo AS (ed) *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.* Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Veiga J (2005b) Parque Provincial Copahue-Caviahue. Pp. 331–332 en: Di Giacomo AS (ed) *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.* Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Veiga J, Filiberto F, Babarskas M & Savigny C (2005) *Aves de la Provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución*. Editorial RyC, Buenos Aires.

Vuilleumier F, Capparella P & Lazo I (1993) Two notable bird records from Chilean Patagonia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 113:85–87.

Vuilleumier F (1995) Components of biodiversity in the avifauna of patagonian steppes. *Southern Connection Newsletter* 7:6–17.

Wrende M & Albarracín D (1991) Presencia de la golondrina parda chica (*Riparia riparia*) y el dragón (*Pseudoleistes virescens*) en La Pampa. *Nuestras Aves* 25:27.

Recibido: agosto 2006 / Aceptado: marzo 2010

Nuestras Aves 54: 81-87, 2009

COMENTARIOS SOBRE LAS AVES DE LA SIERRA DE PAILEMÁN, RÍO NEGRO, ARGENTINA

Sergio A. Lambertucci[1], Facundo Barbar[2], Carlos Cabrera[3] y Maximiliano Bertini[4]

[1]Laboratorio Ecotono, Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue - INIBIOMA/CONICET. Quintral 1250 (8400), Bariloche, Río Negro. Correo electrónico: slambertucci@crub.uncoma.edu.ar

[2]Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, República de la India 3000 (1425), Capital Federal, Buenos Aires. Correo electrónico: oroaetus85@yahoo.com.ar

[3] Thames 968 1° A, CP (1414), Capital Federal, Buenos Aires.

[4] Lafinur 3383 14º A (1425), Capital Federal, Buenos Aires.

El centro y este de la provincia de Río Negro han sido poco estudiados en relación a la avifauna que los habita. La mayor información existente proviene de aves costeras (ver El Hornero 20, Número Especial) y sólo existen algunos trabajos con información sobre la Meseta de Somuncurá (Bettinelli y Chebez 1986, Navas y Bó 1990, Canevari *et al.* 1992, Vuilleumier 1994). Esta meseta es un área de numerosos endemismos de otros taxa (Chebez 2005), aunque continúa siendo un área poco explorada en cuanto a la avifauna (Di Giácomo y Coconier 2005). El trabajo de Bettinelli y Chebez (1986) agregó por ejemplo un punto completamente aislado en la distribución de varias espe-

cies de dormilonas (*Muscisaxicola* spp.), lo que denota la escasa información que se tiene de esta región.

La zona de estudio se encuentra en la sierra Pailemán (45º11'S, 65º46'O, 450 msnm) ubicada a unos 12 km al este del borde oriental más cercano de la Meseta de Somuncurá, por fuera del Área Protegida Meseta de Somuncurá, provincia de Río Negro (Fig. 1 y 2). El sitio se encuentra aproximadamente a 100 km al este de los lugares relevados con anterioridad por Bettinelli y Chebez (1986), y corresponde a la Provincia Fitogeográfica del Monte, Monte Austral típico. La vegetación está caracterizada por una estepa arbustiva con varios estratos, donde el superior llega hasta unos dos metros de altura. La zona está dominada por varias especies de jarillas *Larrea* spp., acompañadas por especies de *Lycium*, *Chuquiraga*, *Prosopis*, *Ephedra*, *Baccharis* y *Verbena*, entre otros (León *et al.* 1998). El paisaje se encuentra salpicado de piquillín (*Condalia microphylla*), mata sebo (*Monttea aphylla*) y alpatacos (*Prosopis alpataco*). Si bien hay una cercanía con la Meseta de Somuncurá, la fisonomía florística posee ciertas diferencias (ver León *et al.* 1998), lo cual podría significar diferencias en la avifauna. La temperatura media anual es de unos 14º C y la precipitación ronda los 200 mm por año (Paruelo *et al.* 1998).

La Sierra de Pailemán se destaca en una amplia planicie. Desde ella sólo se observa la Sierra Grande, hacia el sudeste, y la Meseta de Somuncurá, hacia el oeste, como sobresalientes en el paisaje. El conjunto de rocas que la conforman servirían de refugio o zona de nidificación para un buen número de aves, como ha sido comprobado en otros roquedales del mundo (Larson *et al.* 2000).

En campañas realizadas entre enero de 2004 y enero de 2006 relevamos las aves de la Sierra de Pailemán y sus alrededores en un radio de 4 km. Las campañas se realizaron a lo largo de todo el año pero principalmente en primavera-verano, cuando se detecta un mayor número de especies. Cada mañana y atardecer se caminó entre el borde exterior de la sierra y su interior. Además, se realizaron recorridas de día entero cubriendo prácticamente la totalidad del área de aproximadamente 5.000 ha.

En este trabajo presentamos el resultado de los relevamientos en la Sierra de Pailemán, incluyendo algunas aves de interés que se encontraron en las cercanías de este sitio. Por último, analizamos las aves presentes según los criterios que deben cumplir para poder ser propuesta como un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA).

Comprobamos la presencia de alrededor del 70% de las aves que deberían hallarse en este sitio en base a las distribuciones y ambientes utilizados por cada especie (Ridgely y Tudor 1989, Fjeldså y Krabbe 1990, Canevari *et al.* 1991, de la Peña 1999, Narosky y Babarskas 2000, Mazar Barnett y Pearman 2001, Couve y Vidal 2003, Narosky e Yzurieta 2003). Encontramos un total de 82



Figura 1. Mapa del norte de la Patagonia mostrando la ubicación de la Sierra de Pailemán, en la provincia de Río Negro, Argentina.

Figura 2. Vista de la Sierra de Pailemán. Foto: S Lambertucci.

especies distribuidas en 14 órdenes y 28 familias, entre las cuales hay avistajes novedosos (Tabla 1).

Algunas especies de particular interés son comentadas a continuación:

Cormorán Imperial (*Phalacrocorax atriceps*)

Un ejemplar apareció volando a mediados de marzo de 2004, durante el mediodía, desde el sureste y se posó en la cima de la sierra y en breve continuó hacia el oeste. La especie presenta poblaciones en la costa patagónica. La colonia del Cormorán Imperial más cercana al sitio de estudio es Punta León, Chubut (Frere *et al*. 2005) a una distancia de unos 230 km en línea recta de la Sierra de Pailemán. El individuo observado se alejó unos 60 km de la costa argentina. Si bien la colonia de nidificación más cercana es la ya apuntada, se observan ejemplares de la especie durante todo el año en la costa de la provincia. Se conoce el desplazamiento de un ejemplar juvenil de la especie en el Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa, donde fue fotografiado. Para los detalles de este registro ver Chebez *et al*. (1998).

Cóndor Andino (*Vultur gryphus*)

Las observaciones de esta especie en la Sierra de Pailemán y en la zona de Somuncurá corresponden a ejemplares liberados. El Cóndor Andino fue registrado por última vez para la costa noreste de la Patagonia hace más de 100 años (ver revisión en Jácome *et al.* 2005). Si bien es muy reciente la reaparición de la especie para esta zona, ya que las primeras aves fueron liberadas en el año 2003 (Jácome *et al.* 2005), en caso de mantenerse esta población, este nuevo punto en su distribución deberá ser tenido en cuenta como parte de su geonemia. El Cóndor Andino está considerado a nivel internacional como Casi Amenazado y está incluido en el Apéndice I de CITES (BirdLife 2004). La especie se encuentra categorizada como Vulnerable a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008).

Cacholote Pardo (*Pseudoseisura gutturalis*)

Se lo observa en los alrededores de la sierra aunque no es muy común. Sus nidos típicos son abundantes. La gente del lugar lo llama Coperote y lo culpa de la predación sobre huevos y por ello los matan, atacándolos principalmente en sus nidos o envenenando huevos. Se lo observó comiendo la carroña de un cordero recién carneado. Se trata de una especie endémica de la Argentina (Mazar Barnett y Pearman 2001).

Gaucho Serrano (*Agriornis montanus*)

Se ve regularmente durante la primavera y el verano en el sector sudeste de la sierra. Si bien ha sido observado en

la meseta de Somuncurá (Bettinelli y Chebez 1986), en los cerros Merlo y Corona Grande, nuestros registros están a más de 100 km al este, y a unos 55 km en línea recta desde el mar Argentino. Comprobamos además su nidificación en la sierra. Se trataría de la población conocida más oriental de la especie en la Patagonia, la cual no está citada para la franja este de la provincia de Río Negro (Narosky y Babarskas 2000, Narosky e Yzurieta 2003).

Dormilona Chica (*Muscisaxicola maculirostris*)

Durante varios días a fines de noviembre de 2005, en horas de la mañana y del mediodía, fueron observados dos ejemplares de Dormilona Chica sobre la Sierra de Pailemán. Realizaban vuelos nupciales desde la cima de la sierra, que muchas veces terminaban en su base. Probablemente nidifique en el lugar. Esta especie se encuentra distribuida por todo el oeste de la Argentina (Narosky e Yzurieta 2003) y se ha observado en el cerro Corona Chico en la Meseta de Somuncurá (Bettinelli y Chebez 1986). No obstante, el registro presentado en este trabajo es el más oriental para la especie y está a más de 100 km al este.

Viudita Chica (*Knipolegus hudsoni*)

El 2 de diciembre de 2005 se observó a unos 2 km hacia el sur del pie de la Sierra de Pailemán, un ejemplar hembra de esta especie en horas del mediodía. Esta tenía aspecto general canela, dorso pardo canela, con 2 filetes blanco crema en las alas un poco más oscuras, cola rufa con mitad apical negra, pico claro con la mitad apical oscura, ventral grisáceo con leves estrias pardas, y vientre blancuzco en degradé al grisáceo del pecho. Estaba posada a un metro del suelo sobre una jarilla (*Larrea divaricata*), al lado de un Chingolo (*Zonotrichia capensis*), con el cual se pudo comparar en tamaño, comprobándose que la Viudita Chica era sólo 1 ó 2 cm más grande que el Chingolo. Si bien se encontró una población numerosa de Viudita Común (*Knipolegus aterrimus*) asociada a la sierra, hasta finales del muestreo no se había podido observar a la Viudita Chica. Por lo tanto, la abundancia de esta especie en el sitio es realmente escasa. Se trata de una especie con muy baja probabilidad de detección y catalogada como en Peligro de Extinción en la Patagonia (Narosky y Babarskas 2000) y como Vulnerable a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). Además, se trata de una especie de distribución restringida y casi endémica a nivel nacional (Di Giácomo 2005).

Zorzal Chiguanco (*Turdus chiguanco*)

Observamos a esta especie durante los dos años de muestreo asociado a la sierra. En general lo escuchamos y vimos en un cañadón que entra a la sierra por un valle pequeño. Este sitio se trata de uno de los únicos sectores con algunas vertientes que se secan hacia fines del verano. También se lo ve casi constantemente en la cumbre de la sierra en su ladera este, entrando y saliendo de grietas angostas. Lo vimos comiendo alrededor de ovejas muertas. Además de agregar un nuevo dato para la distribución del Chiguanco, lo interesante del registro es que esta especie se encontró en el medio de una sierra distanciada a 3 km del primer puesto de campo y sin ningún pueblo o ciudad en las cercanías inmediatas. No obstante, también la observamos entre tamariscos (*Tamarix sp.*) y sauces (*Salix* sp.) a orillas de una arroyo y en un mallín en el pueblo de Pailemán (41º11'S, 65º58'W), 20 km hacia el oeste en línea recta desde la sierra homónima, ya sobre el borde de la meseta de Somuncurá. También registramos a la especie en zonas aledañas a las ciudades de San Antonio Oeste y Las Grutas.

Su distribución abarca desde Ecuador por el oeste pasando por Perú, oeste de Bolivia, norte de Chile y entrando por el noroeste y zona central de la Argentina hasta el sur de Mendoza, La Pampa y el límite con Río Negro (Chebez *et al.* 1993, 1998, Acerbo 2000, Narosky e Yzurieta 2003). Recientemente se la observó más al sur en Chubut (Pérez *et al.* 2006, Gelain y Diez Peña 2006). Los ejemplares observados en sitios distantes entre sí y durante los dos años de muestreo, sumado al hecho de que se trata de una especie conspicua, sugeriría que estaría en clara expansión de su distribución. Estas observaciones reforzarían la idea de que algunos zorzales están ampliando su geonemia y esto podría estar favorecido por su capacidad de convivencia con el ser humano. El uso de plantas frutales y ornamentales con bayas podría favorecer la dispersión del Chiguanco (Christie *et al.* 2004), aunque en el paisaje árido de la Sierra de Pailemán no existe una implantación de este tipo y solo podrían asociarse a las bayas de especies autóctonas.

Piquitodeoro Común (*Catamenia analis*)

Se lo observó habitualmente durante la primavera-verano de 2004 y 2005 siempre cercano a la pared de la sierra (Fig. 3). Estuvo en pareja o en grupos menores realizando vuelos cortos entre arbustos. Se lo fotografió y filmó en dos oportunidades realizando su canto típico. Esta especie se distribuye en manchones discontinuos desde el noroeste de Sudamérica entrando por el noroeste de la Argentina hasta el centro de nuestro país (Ridgely y Tudor 1989, Fjeldså y Krabbe 1990). Como límite sur de su distribución Narosky e Yzurieta (2003) ubican una pequeña área al sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Sierra de la Ventana. Narosky y Babarskas (2000) no lo citan para la Patagonia. Para Neuquén, ha sido registrado un macho sobre el río Traful que según sus autores fue accidental (Christie *et al.* 2004). La especie fue citada recientemente para Río Negro (Pérez *et al.* 2006) y fue indicada para Lihué Calel, La Pampa, como nidificante (Chebez *et al.* 1998). Nuestra observación sería una nueva

Figura 3. Piquitodeoro Común *(Catamenia analis)* fotografiado en la Sierra de Pailemán en noviembre de 2004. Foto: S Lambertucci.

cita, algo más al sur, de esta especie en la provincia de Río Negro. El número de aves observadas y la permanencia durante los dos años de muestreo descarta la posibilidad de que sean individuos ocasionales.

Yal Carbonero (*Phrygilus carbonarius*)

Narosky y Babarskas (2000) indican que la especie posee una baja probabilidad de observación en la Patagonia y cierto grado de peligro. Se trata de una especie endémica de la Argentina (Mazar Barnett y Pearman 2001). En nuestra área de trabajo se observaron cantidades importantes de Yal Carbonero en los alrededores de la sierra. Realizamos transectas de 3 km entre el límite externo del área monitoreada y la sierra, utilizando un ancho de observación de 50 m hacia cada lado del camino. Estas transectas se realizaron durante la primavera de 2005, en plena época de cortejo de la especie. Fue fácil reconocer al Yal Carbonero por su típico vuelo nupcial con las alas hacia arriba. Las densidades preliminares encontradas fueron de alrededor de 1 macho por hectárea, lo que denota la abundancia de la especie en la zona. Observamos incluso una cantidad mayor en los alrededores de la sierra y al Yal Negro (*Phrygilus fruticeti*) habitando el borde y dentro de la misma sierra. Comprobamos la depredación de pichones en nidos por la yarará ñata (*Bothrops ammodytoides*).

Cardenal Amarillo (*Gubernatrix cristata*)

A lo largo de la ruta nacional 3 y en campos aledaños hemos observado a esta especie entre San Antonio Oeste, Las Grutas y el cruce de la ruta 23. También, dentro de la estancia La Bombilla (40º57'S, 65º21'O; Arena com. pers). Está declarado a nivel internacional como En peligro (BirdLife International 2004) y a nivel nacional como Vulnerable (AA/AOP y SAyDS 2008). Los hallazgos en esta zona se ubican levemente más al sur de lo registrado por la bibliografía (de la Peña 1999, Narosky y Babarskas 2000, Narosky e Yzurieta 2003).

En base a nuestros resultados los nuevos mapeos de aves deberán incluir a especies anteriormente registradas a grandes distancias de la Sierra de Pailemán, como el Zorzal Chiguanco, el Piquitodeoro Común y el Cóndor Andino, entre las más destacadas.

Teniendo en cuenta sólo las aves encontradas dentro del área, se cumplieron cuatro de los criterios utilizados para seleccionar un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA), con tres especies en el criterio A1 que por sí solo acredita para la aceptación del área. En un área relativamente pequeña encontramos un alto nivel de especies endémicas de Argentina (el 31% de las citadas para la Argentina, de acuerdo a Mazar Barnett y Pearman 2001) y endémicas de biomas. El sitio está cerca de una AICA ya existente de gran tamaño, como lo es el Área Natural Protegida Meseta de Somuncurá (RN06, Chebez 2005), pero no se encuentra incluido dentro de esta. Por lo tanto, los resultados presentados en este trabajo nos llevan a proponer una extensión o rediagramación del AICA RN06 con el fin de incluir dentro de ella a la Sierra de Pailemán. Además, entre la Meseta de Somuncurá y la Sierra de Pailemán aparecen pequeños humedales, en los que se ha observado un ensamble de aves que difiere de las vistas en la sierra, el cual sería incluido si se unificaran las áreas.

Por encuestas a pobladores y observación en alambrados y puestos de campo, comprobamos el uso de cebos tóxicos, trampas y cacería para alimentación y por deporte. Detectamos altos niveles de presión sobre la fauna silvestre. Esto refuerza el interés en buscar alternativas de conservación para este sector de la Patagonia. Creemos que el desarrollo de un plan educativo y de divulgación en puestos y escuelas sería una herramienta fundamental para detener grandes matanzas de fauna autóctona y promover su conservación.

Agradecemos a la Fundación Bioandina Argentina y el Zoológico de Buenos Aires que facilitaron la realización de estos relevamientos. A Segundo "Pocholo" Franco y Andresito Botana por su colaboración en el campo. M Betinelli, A Di Giácomo, JC Chebez, D Olivera y E Haene hicieron recomendaciones que mejoraron esta nota. Finalmente agradecemos a las familias Botana y Catriel por permitirnos trabajar dentro de sus campos y por mostrarnos todo lo que sabían.

Tabla 1. Listado de las aves observadas en la Sierra de Pailemán en el período 2004-2006. N (especies en las que se comprobó la nidificación), DN (distribución novedosa), M (en migración o desplazamiento), NT (cercano a la amenaza, categorización internacional), V (vulnerable, categorización nacional), y EA (endemismo de Argentina).

Nombre común	Nombre científico	Observaciones
Choique	*Rhea pennata*	N, NT,
Inambú Común	*Nothura maculosa*	
Martineta Común	*Eudromia elegans*	N
Biguá	*Phalacrocorax brasilianus*	
Cormorán Imperial	*Phalacrocorax atriceps*	
Garza Bruja	*Nycticorax nycticorax*	
Bandurria Austral	*Theristicus melanosis*	M
Flamenco Austral	*Phoenicopterus chilensis*	NT[1]
Cisne Cuello Negro	*Cygnus melancoryphus*	M
Coscoroba	*Coscoroba coscoroba*	M
Cauquén Común	*Chloephaga picta*	
Cóndor Andino	*Vultur gryphus*	NT, DN
Jote Cabeza Colorada	*Cathartes aura*	N
Jote Cabeza Negra	*Coragyps atratus*	
Águila Mora	*Geranoaetus melanoleucus*	N
Milano Blanco	*Elanus leucurus*	
Gavilán Ceniciento	*Circus cinereus*	
Aguilucho Alas Largas	*Buteo albicaudatus*	
Aguilucho Común	*Buteo polyosoma*	N
Carancho	*Caracara plancus*	N
Chimango	*Milvago chimango*	N
Halcón Peregrino	*Falco peregrinus*	
Halcón Plomizo	*Falco femoralis*	
Halconcito Colorado	*Falco sparverius*	N
Tero Común	*Vanellus chilensis*	
Agachona Chica	*Thinocorus rumicivorus*	
Agachona de Collar	*Thinocorus orbignyianus*	DN[2]
Gaviota Cocinera	*Larus dominicanus*	
Paloma Manchada	*Patagioenas maculosa*	
Torcaza	*Zenaida auriculata*	N
Loro Barranquero	*Cyanoliseus patagonus*	N
Lechuza de Campanario	*Tyto alba*	N
Atajacaminos Ñañarca	*Caprimulgus longirostris*	N
Carpintero Campestre	*Colaptes campestris*	
Caminera Común	*Geositta cunicularia*	
Bandurrita Común	*Upucerthia dumetaria*	
Bandurrita Patagónica	*Ochetorhynchus phoenicurus*	EA,
Remolinera Común	*Cinclodes fuscus*	
Cacholote Pardo	*Pseudoseisura gutturalis*	N, EA,
Canastero Chaqueño	*Asthenes baeri*	N
Canastero Coludo	*Asthenes pyrrholeuca*	
Canastero Pálido	*Asthenes modesta*	N
Canastero Patagónico	*Asthenes patagonica*	EA,
Coludito Copetón	*Leptasthenura platensis*	
Coludito Cola Negra	*Leptasthenura aegithaloides*	
Gallito Arena	*Teledromas fuscus*	EA,
Gaucho Común	*Agriornis micropterus*	
Gaucho Chico	*Agriornis murinus*	
Gaucho Serrano	*Agriornis montanus*	N, DN
Monjita Castaña	*Xolmis rubetra*	N, EA,
Monjita Coronada	*Xolmis coronata*	
Monjita Blanca	*Xolmis irupero*	DN
Dormilona Cara Negra	*Muscisaxicola maclovianus*	DN
Dormilona Chica	*Muscisaxicola maculirostris*	DN
Pico de Plata	*Hymenops perspicillatus*	
Viudita Común	*Knipolegus aterrimus*	
Viudita Chica	*Knipolegus hudsoni*	EA, , V
Tijereta	*Tyrannus savana*	
Calandrita	*Stigmatura budytoides*	
Piojito Común	*Serpophaga subcristata*	
Cachudito Pico Amarillo	*Anairetes flavirostris*	
Cachudito Pico Negro	*Anairetes parulus*	
Golondrina Negra	*Progne elegans*	N
Golondrina Patagónica	*Tachycineta meyeni*	
Golondrina Barranquera	*Pygochelidon cyanoleuca*	
Ratona Común	*Troglodytes aedon*	
Calandria Real	*Mimus triurus*	
Calandria Grande	*Mimus saturninus*	
Calandria Mora	*Mimus patagonicus*	
Zorzal Patagónico	*Turdus falcklandii*	
Zorzal Chiguanco	*Turdus chiguanco*	
Piquitodeoro Común	*Catamenia analis*	DN
Diuca Común	*Diuca diuca*	N
Misto	*Sicalis luteola*	
Comesebo Andino	*Phrygilus gayi*	N, DN
Yal Negro	*Phrygilus fruticeti*	N
Yal Carbonero	*Phrygilus carbonarius*	N, EA,
Jilguero Austral	*Sicalis lebruni*	
Chingolo	*Zonotrichia capensis*	N
Cabecitanegra Austral	*Carduelis barbata*	
Loica Común	*Sturnella loyca*	N
Tordo Renegrido	*Molothrus bonariensis*	

[1]Registro en una laguna cercana, [2]Individuo muerto sobre ruta

Bibliografía Citada

Acerbo PE (2000) *Aves del río Neuquén*. Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Neuquén.

Aves Argentinas/AOP & Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2008) *Categorización de las aves argentinas según su estado de conservación*. Aves Argentinas/AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires.

Bettinelli MD & Chebez JC (1986) Notas sobre aves de la meseta de Somuncurá, Río Negro, Argentina. *Hornero* 12:230–234.

BirdLife International (2004) *Threatened birds of the world 2004*. CD-ROM. BirdLife International, Cambridge.

Canevari M, Canevari P, Carrizo GR, Harris G, Rodriguez Mata J & Straneck RJ (1991). *Nueva guía de las aves argentinas. Tomo II*. Fundación Acindar, Buenos Aires.

Canevari M, Chiesa R & Lingua G (1992) *Relevamiento de la Meseta de Somuncurá*. Boletín de la FVSA 9. Buenos Aires.

Chebez JC (2005) *Área Natural Protegida Provincial Meseta de Somuncurá*. Pp. 348–349 en: Di Giacomo A (ed) *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Chebez JC, Heinonen Fortabat S, Veiga J, Barbaskas M & Filiberto F (1993) Novedades ornitogeográficas argentinas IV. *Nótulas Faunísticas* 38:1–11.

Chebez JC, Rey N, Barbaskas M & Di Giacomo AG (1998) *Las aves de los parques nacionales de la Argentina.* Monografía N°12, LOLA, Buenos Aires.

Christie MI, Ramilo EJ & Bettinelli MD (2004) *Aves del noroeste patagónico.* Sociedad Naturalista Andino Patagónica. LOLA, Buenos Aires.

Couve E & Vidal C (2003) *Aves de Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica: Islas Malvinas y Georgia del Sur.* Editorial Fantástico Sur Birding Ltda, Punta Arenas.

de La Peña MR (1999) *Aves argentinas, lista y distribución.* Monografía Nº15, LOLA, Buenos Aires.

Di Giacomo AS (ed) (2005) *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina.* Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Di Giácomo AS & Coconier E (2005) *Conservación de Aves en Río Negro.* Pp. 335–337 en: Di Giacomo A (ed), *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Frere E, Quintana F & Gandini P (2005) Cormoranes de la costa patagónica: estado poblacional, ecología y conservación. *Hornero* 20:35–52.

Gelain MA & Diez Peña M (2006) Nuevos datos de la distribución del gaviotín lagunero (*Sterna trudeaui*) y del zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*) en Chubut, Argentina. *Nuestras Aves* 52:31.

Jácome NL, Astore V & Bertini M (2005) *El retorno del Cóndor al Mar.* Pp. 373–396 en: Massera RF, Lew J & Serra Pairano G (eds) *Las mesetas patagónicas que caen al mar: la costa rionegrina*. Galerna, Viedma.

Larson DW, Matthes U & Kelly PE (2000) *Cliff Ecology: Pattern and Process in Cliff Ecosystems*. Cambridge University Press, Cambridge.

León RJC, Bran D, Collantes M, Paruelo JM & Soriano A (1998) Grandes unidades de vegetación de la Patagonia extra andina. *Ecología Austral* 8:125–144.

Mazar Barnett J & Pearman M (2001) *Lista comentada de las Aves Argentinas.* Lynx Edicions, Barcelona.

Narosky T & Barbaskas M (2000) *Guía de aves de Patagonia y Tierra del Fuego*. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires.

Narosky T & Yzurieta D (2003) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay.* Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires.

Navas JR & Bó NA (1990) Apuntes sobre la meseta de Somuncurá, provincia de Río Negro. *Neotrópica* 36 (95):45–53.

Paruelo JM, Beltrán A, Jobbágy E, Sala OE & Golluscio RA (1998) The climate of Patagonia: general patterns and controls on biotic processes. *Ecología Austral* 8:85–101.

Perez C, Delhey K & Petracci P (2006) Aves nuevas o poco frecuentes del norte de la Patagonia. *Nuestras Aves* 52:25–29.

Ridgely R & Tudor G (1989) *The birds of South America. Volume I: The oscine passerines.* University of Texas Press, Texas, Austin.

Vuilleumier F (1994) Nesting, behavior, distribution, and speciation of Patagonian and Andean ground Tyrants (*Myotheretes*, *Xolmis*, *Neoxolmis*, *Agriornis* and *Muscisaxicola*). *Ornitología Neotropical* 5:1–55.

Recibido: julio 2006 / Aceptado: enero 2010

Nuestras Aves 54: 87-88, 2009

PRESENCIA DEL SAÍ COMÚN *(Conirostrum speciosum)* EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

Celina Inés Navarro y Nora Lucía Marigliano

Sección Ornitología, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (T4000JFE) San Miguel de Tucumán.
Correo electrónico: navarrocelinaines@gmail.com

El Saí Común (*Conirostrum speciosum*) es un tráupido endémico de Sudamérica (Short 1975) que se distribuye desde los llanos de Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay; y en Argentina en las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, y noreste de Santa Fe (Olrog 1979, Ridgely y Tudor 1989, Canevari *et al.* 1991, de la Peña 1999). Hasta la fecha no se cuenta con registros de su presencia en la provincia de Tucumán (Olrog 1979, Lucero 1981).

Los días 19 de mayo y 5 de junio de 2006, entre las 10 y las 11:30 hs, se identificaron un total de tres ejemplares del Saí Común (Narosky e Yzurieta 2003). El sitio de observación se ubica en la cuenca Tapia-Trancas, Departamento Trancas, sobre el kilómetro 11 de la ruta provincial 341 (26º36'40"S, 65º21'12"O) en los faldeos de la Sierra de San Javier, incluídos en la ecorregión del Chaco Serrano (Santillán y Ricci 1980). Los avistajes se realizaron sobre un camino interno ubicado en una finca privada sin explotación forestal y con signos de degradación ocasionada por la cría de ganado vacuno- caprino en bajas densidades y extracción de leña para subsistencia. En la primera jornada se observó un macho adulto con