



> ARTICULOS

NORES, M. D. YZURIETA y S. SALVADOR, 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias. Córdoba, Argentina, 59 (3-4):157-185.

NORES, M. y D. YZURIETA, 1982. Nuevas localidades para Aves Argentinas. Parte II. Historia Natural, 2 (13): 101-104.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

SALVADOR, S. y P. EROLES. 1994. Notas sobre aves de Santiago del Estero. Nuestras Aves, 30: 24-25.

STRANECK, R. J. 1993. Aportes para la unificación de *Serpophaga subcristata* y *S. munda*, y la revalidación de *Serpophaga griseiceps* (Aves Tyrannidae). Rev. Museo Argentino de Ciencias Naturales (Zool.), 16: 51-63.

Recibida: abril 2005

Revista Nuestras Aves, 52:10-11

NIDIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL JUVENIL DEL CACHUDITO PICO AMARILLO (*Anairetes flavirostris*) EN LA RESERVA PROVINCIAL DIVISADERO LARGO, PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

Ricardo Calí¹ y Roberto Güller²

¹ Humboldt 2094, 3° C, (C1.414) Buenos Aires, Argentina - Correo electrónico: caliricardo@hotmail.com

² Blanco Encalada 5033, 5° B, (C1.431CDM) Buenos Aires, Argentina - Correo electrónico: rmguller@uolsinectis.com.ar

La Reserva Divisadero Largo está ubicada en el pedemonte del macizo precordillerano, a 8 km al oeste de la ciudad de Mendoza, entre los departamentos Capital y Las Heras. Tiene una superficie 492 ha y pertenece a la provincia fiteogeográfica del monte. Esta zona se caracteriza por ser un área de transición, lo que se denomina «ecotono», es decir que conviven simultáneamente especies vegetales y animales de distintas regiones o sea formas típicas de montaña y de llanura. Esto le confiere a todo el pedemonte una singular importancia en cuanto a la conservación de la biodiversidad.

El 1 de noviembre de 2004, se halló un nido a unos 5 m del cauce del arroyo Divisadero, teniendo el terreno a esta distancia, una considerable inclinación. Todo el ambiente y la vegetación circundante presentaban una tonalidad de color grisáceo. Estaba ubicado sobre un arbusto llamado localmente «usillo o prendedor» (*Trichomania usillo*), sostenido sobre una ramificación a una altura de 60 cm del suelo. Tenía forma de semiesfera o tacita, cuyas medidas eran: diámetro externo 6 cm., diámetro interior 3 cm, altura 6 cm y profundidad 2,5 cm. Había sido construido con fibras muy finas de



Nido y pichón de cachudito pico amarillo, observado en la Reserva Provincial Divisadero Largo.





➤ ARTICULOS

gramíneas; el interior tapizado con plumón y plumas grandes de otras especies de aves, que no pudimos identificar. En el mismo, se encontraba un pichón de aproximadamente de 3,5 cm de longitud, con pulmón de color grisáceo, el cual era alimentado por un adulto que acarreaba pequeñas orugas de color verde, que nos permitió acercarnos a una distancia aproximada de 2 m desde donde lo observamos y fotografiamos.

Observamos un segundo adulto que en un arbusto cercano al nido descrito, alimentaba a un volantón, con las mismas orugas verdes. Este volantón tenía el pico negro con base y comisura amarillas, cabeza parda grisácea con plumón sobre la misma de color gris claro, dorsal gris pardusco, garganta y pecho blanquecinos con estrías pardas, ventral y subcaudal blanquecinos. Las alas pardas presentaban dos bandas claras en cubiertas y todas las remeras pardas con el vexilo exterior y la punta clara. Las timoneras de la cola eran pardas con las puntas y barbas externas blanquecinas. También pudimos hacer varias fotos. Si bien no volaba, se trasladaba de rama en rama con muchísima facilidad. Es importante destacar que los volantones de esta especie no habían sido descritos hasta el momento (Fitzpatrick, 2004).

El 17 de noviembre de 2004, se encontró un segundo nido a unos 1000 m de distancia aproximadamente del anterior. Éste, no se encontraba dentro de la Reserva Divisadero Largo, sino en terrenos circundantes al norte de la misma. Estaba ubicado en un chañar (*Geoffroea decorticans*) a una altura de 2,30 m del suelo y presentaba las mismas características del anterior, encontrándose un individuo que estaba incubando. Solamente se hizo la observación del mismo, a corta distancia, tratando de no molestar para confirmar los datos.

Distintos nidos han sido descritos en otras publicaciones para la Argentina (Ver Narosky y Salvador, 1998; De La Peña, 2001; Mérida y Bodrati, 2004; Fitzpatrick, 2004) y para la provincia de Mendoza existen descripciones de nidos en la Reserva Provincial de Ñacuñán (Mezquida, 2002).

Queremos agradecer la colaboración y apoyo prestado por Flavio Martínez y los guardaparques José Ferreira, Nidia Pérez, Ricardo Yacante, Erica Rojas, Jorge Gordillo, Silvana Picone y a Martín Pérez. A Carlos Ferrari y Emilse Mérida por alentarnos y colaborar como correctores.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- DE LA PEÑA, M. R. 2001. Nidificación de aves en el noroeste argentino. *Nuestras Aves*, 42: 16-17.
- FITZPATRICK, J. W. 2004. Family Tyrannidae (Tyrant-Flycatchers). Pp. 170 – 462 in: del Hoyo, J., Elliot, A., & Christie, D. A. eds. (2004). *Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails*. Lynx Edicions, Barcelona.
- NAROSKY, T. y S. SALVADOR. 1998. Nidificación de las aves argentinas, *Tyrannidae*. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 135 páginas.
- MÉRIDA, E. y A. BODRATI. 2004. Nidificación del cachudito pico amarillo (*Anairetes flavirostris*) y el cachudito pico negro (*Anairetes parulus*) en el Parque Nacional El Leoncito, provincia de San Juan, Argentina. *Nuestras Aves*, 48: 35-36.
- MEZQUIDA, E. T. 2002. Nidificación de ocho especies de tyrannidae en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. *Hornero* 17 (1):31-40.

Recibido: abril 2005

Revista Nuestras Aves, 52:11-13

NOTAS SOBRE LA NIDIFICACIÓN DEL ARAÑERO CARA NEGRA (*Geothlypis aequinoctialis*) EN EL ESTE DE SANTA FE, ARGENTINA

Andrés A. Pautasso

Área Zoología Vertebrados. Museo Provincial de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino». Primera Junta 2859. CP 3000, Santa Fe, Argentina. andrespautasso@yahoo.com.ar

El araño cara negra (*Geothlypis aequinoctialis*) se distribuye, en la Argentina, por el norte hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires (De la Peña, 1999). Habita preferentemente selvas y montes li-

gados a ambientes acuáticos, incluso en espadañales y matorrales (Canevari *et al.*, 1991). La información relacionada a la nidificación de la especie es escasa, y se basa fundamentalmente en descripciones de