



> ARTICULOS

NORES, M. D. YZURIETA y S. SALVADOR, 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias. Córdoba, Argentina, 59 (3-4):157-185.

NORES, M. y D. YZURIETA, 1982. Nuevas localidades para Aves Argentinas. Parte II. Historia Natural, 2 (13): 101-104.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

SALVADOR, S. y P. EROLES. 1994. Notas sobre aves de Santiago del Estero. Nuestras Aves, 30: 24-25.

STRANECK, R. J. 1993. Aportes para la unificación de *Serpophaga subcristata* y *S. munda*, y la revalidación de *Serpophaga griseiceps* (Aves Tyrannidae). Rev. Museo Argentino de Ciencias Naturales (Zool.), 16: 51-63.

Recibida: abril 2005

Revista Nuestras Aves, 52:10-11

NIDIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL JUVENIL DEL CACHUDITO PICO AMARILLO (*Anairetes flavirostris*) EN LA RESERVA PROVINCIAL DIVISADERO LARGO, PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

Ricardo Calí¹ y Roberto Güller²

¹ Humboldt 2094, 3° C, (C1.414) Buenos Aires, Argentina - Correo electrónico: caliricardo@hotmail.com

² Blanco Encalada 5033, 5° B, (C1.431CDM) Buenos Aires, Argentina - Correo electrónico: rmguller@uolsinectis.com.ar

La Reserva Divisadero Largo está ubicada en el pedemonte del macizo precordillerano, a 8 km al oeste de la ciudad de Mendoza, entre los departamentos Capital y Las Heras. Tiene una superficie 492 ha y pertenece a la provincia fiteogeográfica del monte. Esta zona se caracteriza por ser un área de transición, lo que se denomina «ecotono», es decir que conviven simultáneamente especies vegetales y animales de distintas regiones o sea formas típicas de montaña y de llanura. Esto le confiere a todo el pedemonte una singular importancia en cuanto a la conservación de la biodiversidad.

El 1 de noviembre de 2004, se halló un nido a unos 5 m del cauce del arroyo Divisadero, teniendo el terreno a esta distancia, una considerable inclinación. Todo el ambiente y la vegetación circundante presentaban una tonalidad de color grisáceo. Estaba ubicado sobre un arbusto llamado localmente «usillo o prendedor» (*Trichomania usillo*), sostenido sobre una ramificación a una altura de 60 cm del suelo. Tenía forma de semiesfera o tacita, cuyas medidas eran: diámetro externo 6 cm., diámetro interior 3 cm, altura 6 cm y profundidad 2,5 cm. Había sido construido con fibras muy finas de



Nido y pichón de cachudito pico amarillo, observado en la Reserva Provincial Divisadero Largo.





► ARTICULOS

la existencia de registros durante casi todo el año. Nores *et al.* (1983) señalan a Monte de las Barrancas como una probable área de nidificación. También la zona de Chancaní es una buena candidata.

Los registros citados más los nuevos proporcionados en esta nota permiten señalar además la existencia de una población serrana, que se distribuye principalmente a lo largo de los faldeos orientales de las Sierras Grandes, en donde las aves han sido vistas por los autores posadas en árboles exóticos o sobre rocas, o alimentándose en el suelo en pastizales entre roquedales. Miatello *et al.* (1999), en cambio, vinculan esta población estrechamente al bosque serrano, mencionando además su presencia hasta los 1.600 m y su permanencia (al menos de juveniles) durante todo el año en la zona. De este modo, las Sierras Grandes también constituye un área probable de nidificación.

Halconcito gris (*Spizapteryx circumcinctus*)

Se observó un individuo el 19 de enero de 2000 en las cercanías del Dique Mollegasta, departamento Ancasti, en la provincia de Catamarca, en donde previamente se conocen tres registros, el último de ellos en 1960 (Camperi y Darrieu, 2001).

Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)

Se observó un individuo en el Dique Cañada, cerca de Alijilán (departamento Santa Rosa, Catamarca), el 15 de enero de 2000. En esta provincia, la especie no cuenta con ninguna cita formal (Camperi y Darrieu, 2001), aunque es mapeada para la misma en diversas publicaciones (De la Peña y Rumboll, 1998; Narosky e Yzurieta, 2003).

Alicucu común (*Otus choliba*)

Se observó un individuo y se escuchó otro el 14 de enero de 2000 en La Tuna, departamento El Alto, provincia de Catamarca, donde no existen citas formales previas (Camperi y Darrieu, 2001), aunque la especie es mapeada para esta provincia por De la Peña y Rumboll (1998) y Narosky e Yzurieta (2003).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CAMPERI, A. R. y C. A. DARRIEU. 2001. Avifauna de Catamarca: lista comentada de especies (no-Passeriformes). *Physis*, Secc. C, 58: 67-78.
COBOS, V., R. MIATELLO y J. BALDO. 1999. Algunas especies de aves nuevas y otras con pocos registros para la provincia de Córdoba, Argentina. II. *Nuestras Aves*, 39: 7-11.

DE LA PEÑA, M. R. y M. RUMBOLL. 1998. *Birds of southern South America and Antarctica*. HarperCollins Publishers, London, 304 pp.

DE LUCCA, E. R. 1993. El Águila Coronada. *Nuestras Aves*, 29: 14-17.

MIATELLO, R., C. ROSACHER y V. COBOS. 1993. Algunas especies de aves nuevas o con pocos registros para la provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 50: 1-12.

MIATELLO, R., V. COBOS y C. ROSACHER. 1991. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. *Hist. Nat.*, 8: 1-5.

MIATELLO, R., J. BALDO, M. ORDANO, C. ROSACHER y L. BIANCUCCI. 1999. Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala, Córdoba, Argentina. Una lista comentada. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, Córdoba. 193 pp.
MIATELLO, R., J. BALDO, L. BIANCUCCI y V. COBOS. 2003. Nuevos registros de aves poco citadas para Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 15-21.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Eds., Buenos Aires, 346 pp.

NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 56 (1-2): 1-114.

NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. Pp. 255-337, *en*: Di Tada, I. E. y E. Bucher (eds.) *Biodiversidad de la provincia de Córdoba*. Vol. I. Fauna. Univ. Nac. Río Cuarto, Córdoba.

NORES, M. y D. YZURIETA. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte II. *Hist. Nat.*, 2: 101-104.

NORES, M., D. YZURIETA y S. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc. (Córdoba)*, 59: 158-196.

SALVADOR, S. A. y P. G. EROLES. 1994. Notas sobre aves de Santiago del Estero. *Nuestras Aves*, 30: 24-25.

TORRES, R. y P. MICHELUTTI. 2001. Nuevos registros de aves escasas en la región central de Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda Serie)*, 1: 1-5.

VOLKMANN, L. y R. CARGNELUTTI. 2001. Nuevas localidades para aves de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves*, 41: 23-26.

Recibido: mayo 2005