



► ARTICULOS

nido 1, ya que éste fue exitoso. La incubación y alimentación fue efectuada por la hembra. En dos oportunidades se hicieron observaciones de 30 minutos, durante el sexto y séptimo día de vida de los pichones, allí la hembra aportó gusanos pequeños, en intervalos de 5 y 7 minutos. Ante la presencia del observador, se desplaza entre ramas y pastos a pocos centímetros de éste, emite voces cortas y ásperas, comportamiento que lo realiza más insistentemente mientras dure el peligro. Cuando el nido tiene huevos o pichones, el macho permanece entre 3 y 5 m del nido, usando de atalaya ramas laterales de aromitos y seibos. De la pareja, es el macho quien detecta antes el peligro, y ante una situación de riesgo vocaliza. Se lo ha observado escoltar al observador hasta varios metros lejos del nido. Pereyra (1938) hizo un breve comentario sobre los adultos, informando que mientras la hembra está en el nido escondida entre los matorrales, el macho posado en una rama dominante canta continuamente, aunque no especificó más datos.

Agradezco a Martín R. de la Peña, Fernando Conti y Jimena Cazenave por su colaboración en el campo. A Alfredo Martínez por sus diversos aportes.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRÍGUEZ MATA y STRANECK R. 1991. Nueva guía de las aves Argentinas. Tomo II. Fundación Acindar, Buenos Aires
 DE LA PEÑA, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves Argentinas. Edición del autor, Santa Fe
 DE LA PEÑA M. R. 1999. Aves Argentinas. Lista y distribución. L.O.L.A., Buenos Aires
 PEREYRA, J. A. 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. Memorias del Jardín Zoológico de La Plata 9: 1-304
 SALVADOR, S. A. y L. A. SALVADOR. 1984. Notas sobre hospedantes del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) (Aves: Icteridae). Historia Natural 4: 121-130

Recibida: abril 2005

Revista Nuestras Aves, 52:13-16

NUEVAS CITAS Y COMENTARIOS SOBRE RAPACES EN LA REGIÓN CENTRAL DE ARGENTINA (PROVINCIAS DE CATAMARCA, CÓRDOBA Y SANTIAGO DEL ESTERO)

Ricardo Torres^{1,4}, Pablo Michelutti², José León³, Gustavo Bruno¹ y Walter Cejas⁴

¹ Cátedra de Diversidad Animal II, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 299 (5000) Córdoba, e-mail: rtorres444@yahoo.com.ar.

² Tucumán 296 (5143) Miramar, Córdoba

³ Paso de los Andes 95, «A» (5500) Mendoza

⁴ Museo de Zoología, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 299 (5000) Córdoba

En la presente nota se amplía la distribución, y se dan a conocer nuevos avistajes, de 10 especies de aves de los órdenes Falconiformes y Strigiformes en las provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero, citándose una nueva especie para Córdoba.

Jote real (*Sarcoramphus papa*)

La especie cuenta con pocos registros para la provincia de Córdoba (Miatello *et al.*, 1991 y 2003; Volkmann y Cargnelutti, 2001; Torres y Michelutti, 2001). En esta nota se cita una nueva observación de dos ejemplares volando a gran altura junto a varios individuos de jote cabeza negra (*Coragyps atratus*), a unos 20 km al este de la localidad de La

Playa, departamento Minas (31° 01' S, 65° 22' W), en la Sierra de Guasapampa, el 14 de junio de 2001. Este registro resulta geográficamente cercano a otros realizados en 1992 por Miatello *et al.* (2003). El hecho de que la especie fue observada en la provincia en todas las estaciones del año sugiere que la misma podría ser permanente en Córdoba.

Caracolero (*Rostrhamus sociabilis*)

Nores e Yzurieta (1982) hicieron la primera observación de esta especie en Catamarca, citando 15 ejemplares en el Dique Sumampa (departamento Paclín). Entre el 14 y el 19 de enero de 2000 nosotros registramos dos individuos en la localidad de La



ARTICULOS

Tuna, departamento El Alto (28° 22' S, 65° 17' W) y uno más en el Dique Collagasta, cercano a la localidad citada, 15 ejemplares en el Dique Cañada (28° 11' S, 65° 21' W), cercano a Alijilán (departamento Santa Rosa), y 10 individuos en el Dique Mollegasta, ubicado a unos 15 km al sur de Icaño (departamento Ancasti). Al parecer la especie se encuentra bien establecida en el extremo oriental de esta provincia, donde colonizó los cuerpos de agua artificiales. En Córdoba, se observó un individuo el 15 de junio 2001 en las cercanías de la Laguna de Pocho (departamento Pocho), ubicada en la Pampa de Pocho, una llanura a aproximadamente 1.000 m, al oeste de las Sierras Grandes. En esta provincia la especie era conocida para el sur y este (Nores, 1996) y algunas localidades en la zona periserrana (Cobos *et al.*, 1999; Volkmann y Cargnelutti, 2001).

Milano boreal (*Ictinia mississippiensis*)

De esta especie, migratoria del Hemisferio Norte, en la provincia de Córdoba se citan observaciones en Villa del Totoral y en Miramar (Nores, 1996). Nuevos registros son un ejemplar hacia el norte de Morteros, departamento San Justo (30° 43' S, 62° 00' W) el 26 de enero de 1983, y otro en Villa Candelaria, departamento Río Seco (29° 50' S, 63° 20' W) el 4 de noviembre de 1987, las dos localidades situadas en el norte de la provincia.

Águila negra (*Buteogallus urubitinga*)

Fue observado un individuo en las cercanías del puente sobre el río Utis, departamentos Mitre y Salavina (29° 15' S, 63° 11' W), provincia de Santiago del Estero, en agosto de 2003, y dos más en junio de 2004. La especie nunca había sido registrada en los Bañados del Río Dulce, aunque sí en varios otros sitios en Santiago del Estero, entre ellos el Bañado de Los Telares (Nores *et al.*, 1991), localidad próxima que actualmente al parecer se encuentra englobada dentro de los Bañados del Río Dulce, constituyendo su porción septentrional (*obs. pers.*).

Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*)

En la provincia de Catamarca, la raza *australis* es citada para dos localidades en el departamento Paclín y una en el departamento Ambato (Camperi y Darrieu, 2001). Un ejemplar fue observado, además, sobrevolando un pastizal de altura a unos 20 km al sudoeste de la localidad de El Alto, en el departamento homónimo, el 16 de enero de 2000.

Aguilucho cola corta (*Buteo brachyurus*)

En Córdoba, se observó un individuo el 7 de febrero de 1990, otro el 30 de abril de 2000 y otro más el 4 de agosto de 2004, todos en ambientes de bosque chaqueño en las cercanías de Miramar (30° 55' S, 62° 41' W), constituyendo estos registros las primeras citas para la provincia (Nores, 1996).

Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*)

En la provincia de Córdoba, es conocida para el norte, donde habita en las zonas bajas en ambientes de bosque chaqueño (Nores *et al.*, 1983; Miatello *et al.*, 1993), y para el oeste de la provincia en ambientes similares (Miatello *et al.*, 1993; De Lucca, 1993; G. Sferco *in litt.*), en la zona periserrana y bajoserrana (Nores *et al.*, 1983; Miatello *et al.*, 1993), y en Río Tercero (De Lucca, 1993). Las nuevas citas son: un ejemplar hallado muerto el 16 de julio de 1986 en la localidad de El Tío (31° 23' S, 62° 50' W, departamento San Justo), mencionado por Nores (1996); un adulto posado en un árbol sobre un pastizal en las cercanías de Villa Ciudad de América, departamento Calamuchita, el 12 de mayo de 1996; un juvenil en un parche de bosque chaqueño a unos 15 km al oeste de la localidad de Pozo de las Ollas (29° 58' S, 62° 59' W), departamento Río Seco, el 8 de agosto de 1999; un adulto con dos juveniles en un parche de bosque chaqueño en las cercanías de la localidad de Villa Candelaria, departamento Río Seco, entre el 12 y el 14 de agosto de 2000, 1 adulto en el mismo lugar el 26 de febrero de 2001 y otro más el 26 de mayo del mismo año; en Chancaní, departamento Pocho, se observaron dos ejemplares (1 juvenil y 1 subadulto) el 22 de noviembre de 2003; dos adultos comiendo carroña (un ternero muerto) fueron registrados en un pastizal con roquedales a 2 km al sur de San Clemente (31° 43' S, 64° 38' W), departamento Santa María, el 22 de agosto de 2004; y un adulto sobre el camino a la Estancia Jesuítica La Candelaria (32° 54' S, 65° 8' W), departamento Cruz del Eje, a 1.445 m, el 18 de diciembre de 2004.

En Santiago del Estero se registraron un adulto y un juvenil sobre árboles de vinal (*Prosopis ruscifolia*) a orillas del río Utis, en las cercanías del puente de la Ruta Provincial 13 sobre el mismo (departamentos Mitre y Salavina), el 13 de junio de 2004. En esta provincia la especie cuenta con escasas citas: Icaño, Monte Redondo, Reserva de Copo, Tintina y Sachayoj (Salvador y Eroles, 1994).

Los datos recopilados permiten inferir acerca de zonas en Córdoba en donde la especie es permanente y probable nidificante. Entre éstas, el área de Villa Candelaria constituye el sitio más probable dada



ARTICULOS

la existencia de registros durante casi todo el año. Nores *et al.* (1983) señalan a Monte de las Barrancas como una probable área de nidificación. También la zona de Chancaní es una buena candidata.

Los registros citados más los nuevos proporcionados en esta nota permiten señalar además la existencia de una población serrana, que se distribuye principalmente a lo largo de los faldeos orientales de las Sierras Grandes, en donde las aves han sido vistas por los autores posadas en árboles exóticos o sobre rocas, o alimentándose en el suelo en pastizales entre roquedales. Miatello *et al.* (1999), en cambio, vinculan esta población estrechamente al bosque serrano, mencionando además su presencia hasta los 1.600 m y su permanencia (al menos de juveniles) durante todo el año en la zona. De este modo, las Sierras Grandes también constituye un área probable de nidificación.

Halconcito gris (*Spizapteryx circumcinctus*)

Se observó un individuo el 19 de enero de 2000 en las cercanías del Dique Mollegasta, departamento Ancasti, en la provincia de Catamarca, en donde previamente se conocen tres registros, el último de ellos en 1960 (Camperi y Darrieu, 2001).

Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)

Se observó un individuo en el Dique Cañada, cerca de Alijilán (departamento Santa Rosa, Catamarca), el 15 de enero de 2000. En esta provincia, la especie no cuenta con ninguna cita formal (Camperi y Darrieu, 2001), aunque es mapeada para la misma en diversas publicaciones (De la Peña y Rumboll, 1998; Narosky e Yzurieta, 2003).

Alicucu común (*Otus choliba*)

Se observó un individuo y se escuchó otro el 14 de enero de 2000 en La Tuna, departamento El Alto, provincia de Catamarca, donde no existen citas formales previas (Camperi y Darrieu, 2001), aunque la especie es mapeada para esta provincia por De la Peña y Rumboll (1998) y Narosky e Yzurieta (2003).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CAMPERI, A. R. y C. A. DARRIEU. 2001. Avifauna de Catamarca: lista comentada de especies (no-Passeriformes). *Physis*, Secc. C, 58: 67-78.
COBOS, V., R. MIATELLO y J. BALDO. 1999. Algunas especies de aves nuevas y otras con pocos registros para la provincia de Córdoba, Argentina. II. *Nuestras Aves*, 39: 7-11.

DE LA PEÑA, M. R. y M. RUMBOLL. 1998. *Birds of southern South America and Antarctica*. HarperCollins Publishers, London, 304 pp.

DE LUCCA, E. R. 1993. El Águila Coronada. *Nuestras Aves*, 29: 14-17.

MIATELLO, R., C. ROSACHER y V. COBOS. 1993. Algunas especies de aves nuevas o con pocos registros para la provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 50: 1-12.

MIATELLO, R., V. COBOS y C. ROSACHER. 1991. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. *Hist. Nat.*, 8: 1-5.

MIATELLO, R., J. BALDO, M. ORDANO, C. ROSACHER y L. BIANCUCCI. 1999. Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala, Córdoba, Argentina. Una lista comentada. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, Córdoba. 193 pp.
MIATELLO, R., J. BALDO, L. BIANCUCCI y V. COBOS. 2003. Nuevos registros de aves poco citadas para Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 15-21.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Eds., Buenos Aires, 346 pp.

NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 56 (1-2): 1-114.

NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. Pp. 255-337, en: Di Tada, I. E. y E. Bucher (eds.) *Biodiversidad de la provincia de Córdoba*. Vol. I. Fauna. Univ. Nac. Río Cuarto, Córdoba.

NORES, M. y D. YZURIETA. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte II. *Hist. Nat.*, 2: 101-104.

NORES, M., D. YZURIETA y S. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc. (Córdoba)*, 59: 158-196.

SALVADOR, S. A. y P. G. EROLES. 1994. Notas sobre aves de Santiago del Estero. *Nuestras Aves*, 30: 24-25.

TORRES, R. y P. MICHELUTTI. 2001. Nuevos registros de aves escasas en la región central de Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda Serie)*, 1: 1-5.

VOLKMANN, L. y R. CARGNELUTTI. 2001. Nuevas localidades para aves de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves*, 41: 23-26.

Recibido: mayo 2005