



AVES NUEVAS O POCO REGISTRADAS PARA SIERRA DE LA VENTANA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA

Pedro Cristóbal Doiny Cabré

La Falda 144 (8.000) Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, pcrystal@speedy.com.ar

Sierra de la Ventana y Villa La Arcadia (38° 08' S, 61° 47' W) se encuentran ubicadas en los partidos de Tornquist y Coronel Suárez, respectivamente, al sudoeste de Buenos Aires; separadas por el río Sauce Grande, forman una sola población. El sector urbanizado está forestado con árboles exóticos, en la zona hay agricultura y ganadería. Se dan a conocer en este trabajo, registros de 16 aves nuevas o poco citadas para el área, algunas con datos reproductivos.

Macá pico grueso (*Podilymbus podiceps*)

Escaso habitante de áreas palustres de toda la provincia, no hay citas para Sierra de la Ventana (Narosky y Di Giacomo, 1993). A partir del 15 de enero de 2002 se lo encuentra en el área durante todo el año aunque en bajo número.

Chiflón (*Syrigma sibilatrix*)

Habita áreas rurales y cercanías de ambientes palustres de toda la provincia, donde se expande hacia el sur (Narosky y Di Giacomo, 1993). Para la zona cuento con diez registros entre agosto y marzo, desde 1998.

Gavilán mixto (*Parabuteo unicinctus*)

Tengo numerosos registros para todo el año a partir de 1998 siempre cerca de la confluencia del río Sauce Grande con el arroyo Negro. El 22 de enero de 2001 registré un nido activo en la parte superior de una casuarina (*Casuarina* sp.), donde dos adultos alimentaban a dos pichones, que ya volaban. El tamaño del nido, el material y su ubicación concuerdan con lo expuesto por De la Peña (1994) y Aguilar y Kowalinsky (1996). Escaso habitante del nordeste, este y sur de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993), hay pocos registros para el sur de dicha provincia (Petracci *et al.*, 2004), y no existen citas para Sierra de la Ventana, donde al igual que en la Laguna de Chasicó (Petracci *et al.*, 2004), es residente y nidificante.

Taguató común (*Buteo magnirostris*)

Habita toda la provincia de Buenos Aires, salvo el

sur (Narosky y Di Giacomo, 1993); aunque hay citas para el noreste del partido de Coronel Suárez, Sierra de la Ventana (Petracci *et al.*, 2004) y los partidos de Tornquist, Villarino y Bahía Blanca (Delhey y Carrey, 1999). Desde 1997 tengo ocho registros en la zona para las cuatro estaciones del año.

Aguilucho langostero (*Buteo swainsoni*)

Escaso visitante estival en bandadas en áreas rurales y arboledas de Buenos Aires, salvo el sur (Narosky y Di Giacomo, 1993). Observé en Sierra de la Ventana individuos planeando a gran altura durante todo el mes de enero de 2004, y dos grandes bandadas los días 12 y 17 de enero de 2004.

Pollona pintada (*Gallinula melanops*)

Dos individuos en el arroyo Negro, 22 al 25 de julio de 1999. Habita toda la provincia de Buenos Aires salvo el sur (Narosky y Di Giacomo, 1993), aunque tiene citas recientes para el dique Paso de las Piedras y para los partidos de Bahía Blanca, Tornquist y Villarino (Petracci *et al.*, 2004).

Playerito manchado (*Actitis macularia*)

Dos ejemplares con un incompleto plumaje nupcial en la orilla del arroyo Negro, a unos mil metros de Villa La Arcadia, del 14 al 16 de enero de 1999. El registro se compadece con lo observado el 7 y 8 de ese mes por Kaspar Delhey y Pablo Petracci, en el dique Paso de las Piedras, a unos 60 kilómetros de Sierra de la Ventana, quienes registraron probablemente los mismos individuos (Delhey *et al.*, 2001). Visitante estival en playas de mar y áreas palustres del nordeste de la provincia, no estaba citada para el área (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Lechuzón orejudo (*Asio clamator*)

Es un raro habitante de bosques, selvas y arboledas en el nordeste de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993); además hay citas para General Pueyrredón y Mar Chiquita (Martínez *et al.*, 1996), Benito Juárez (Leveau y Leveau, 2001) y Carlos Tejedor (Roesler, 2003). El 20 de julio de 2002 oí un individuo; el 12 de julio de 2005 registramos dos



> ARTICULOS

ejemplares en un predio privado y el 21 de julio de 2005 en el mismo sitio volví a encontrarlos, esta vez junto con R. Lejarraga, con quien los filmamos y fotografiamos. El lugar se encuentra forestado por árboles exóticos como eucalipto (*Eucalyptus* sp.), lambertianas (*Cupressus macrocarpa*), pinos (*Pinus* sp.), y está a pocos metros de un curso de agua, con mimbrés (*Salix* sp.) en sus orillas, por lo que reúne las características que favorecen la expansión de la especie (Martínez *et al.*, 1996; Cobos *et al.*, 1999). El encargado del lugar nos refirió que hace dos años que esta especie se encuentra allí. Estos registros son los más australes conocidos.

Picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*)

Ausente en la zona hasta hace pocos años, hoy es residente y cuento con muchos registros para el área desde el 20 de enero de 1993. Habitante de arboledas, bosques, selvas, parques y jardines, se ha expandido notablemente en los últimos decenios y hay una cita para el Parque Provincial Ernesto Tornquist para 1992 (Narosky y Di Giacomo, 1993) y otra para Bahía Blanca (Delhey, 1992). En Mar del Plata ya está indicado como nidificante (Núñez Chas, 1992).

Martín pescador grande (*Megasceryle torquata*)

Narosky y Di Giacomo (1993) citan para el área de Sierra de la Ventana a la subespecie *C. t. stellata*, como visitante invernal. Sin embargo, mis registros parecen indicar que es residente, pues desde 1993 y hasta hoy lo he observado durante todo el año, y cuento con muchos registros desde esa fecha. Hay una cita para enero en el partido de Saavedra (Carrizo *et al.*, 2001). Observado cerca de las barrancas del río Sauce Grande; el 20 de febrero de 2002 dos adultos alimentaban allí a un juvenil, por lo cual es presumible que nidifique en el área. Es común verlo en vuelo, cruzando zonas pobladas. En síntesis, es residente y probablemente nidificante y no visitante invernal, debiendo determinarse a cual de las dos subespecies (*C. t. torquata* o *C. t. stellata*) pertenecen los individuos observados y, eventualmente, si algunos llegan como visitantes invernales.

Martín pescador chico (*Chloroceryle americana*)

Registrado reiteradamente a partir de 1993. Residente, nidificante y escaso, es casi segura su observación en todos los cursos del área; también en la ciudad de Bahía Blanca. Había registros aislados para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993) y una cita para el partido de Saavedra (Carrizo *et al.*, 2001).

Zorzal patagónico (*Turdus falcklandii*)

Habitante de arboledas y parques en el sur de la provincia, se encuentra en expansión hacia el norte (Narosky y Di Giacomo, 1993). Colonizador relativamente reciente en Sierra de la Ventana, hoy es común, residente y nidificante. Cuento con muchos registros desde 1993, apreciándose un aumento en el número de individuos año a año.

Zorzal colorado (*Turdus rufiventris*)

Registrado por primera vez el 27 de enero de 1999, y posteriormente muchas veces más, e incluso he hallado varios nidos activos. Residente y nidificante, estos registros, confirman su expansión hacia el sur (Narosky y Di Giacomo, 1993). Junto con el Parque Nacional Lihue Calel (La Pampa) (Chebez *et al.*, 1998), Sierra de la Ventana constituye una de las pocas localidades donde hay registros de los zorzales patagónico y colorado, y la primera donde se documenta que ambas son residentes y nidificantes.

Pitaiyumi (*Parula pitaiyumi*)

Habitante de selvas, bosques ribereños y arboledas del este de Buenos Aires, hay citas para Sierra de la Ventana, Pigué y Bahía San Blas (Narosky y Di Giacomo, 1993); registrado en Necochea y Bahía Blanca (Delhey, 1992); también Santa Rosa, La Pampa (Maceda *et al.*, 1997) y Chubut (Navas, 1994). Para el área en estudio cuento con dos registros: 12 de julio de 1997, un ejemplar recorría un arbusto en un jardín de Villa La Arcadia, y otro el 9 de mayo de 1999, dos ejemplares, en un sector con vegetación densa, a la orilla del arroyo San Bernardo.

Naranjero (*Thraupis bonariensis*)

Habitante del nordeste y sudoeste de Buenos Aires (caldenal) (Narosky y Di Giacomo, 1993). Registrado en Sierra de la Ventana de mayo a octubre, en forma continua, desde 1993. En general se observan de 5 a 15 individuos alimentándose de los frutos del aguaribay (*Schinus areira*), y es probable que los ejemplares provengan de áreas de caldenal, donde disminuye su número en invierno (Scorolli y Delhey, inédito).

Cortarramas (*Phytotoma rutila*)

Dos registros de un ejemplar en cercanías del arroyo Negro, 31 de julio de 1997 y 27 de julio de 1998. Habitante del caldenal y de estepas arbustivas en el sur de Buenos Aires, es visitante invernal en el nordeste (Narosky y Di Giacomo, 1993). Estos registros concuerdan con dicho desplazamiento invernal.



► ARTICULOS

Cardenal común (*Paroaria coronata*)

Habitante de talaes y arboledas en el este de la provincia, existen datos aislados para el interior, aparentemente provenientes de individuos escapados de cautividad o liberados (Narosky y Di Giacomo, 1993). En Sierra de la Ventana he observado ejemplares en forma continua desde el 21 de febrero de 1994 hasta la fecha y durante todo el año; si bien es escaso y normalmente se ven dos, he visto hasta seis juntos e incluso adultos que alimentaban juveniles, evidencia de nidificación en el área. Está documentada la supervivencia en la zona de individuos soltados por el hombre (Renard, 1929). Resulta difícil determinar si los observados son ejemplares escapados de cautividad o liberados o si se ha expandido naturalmente, pero la especie parece ser ahora residente y nidificante.

Agradecemos a Carlos Villamil, Kaspar Delhey, Juan Carlos Chebez y Roberto Güller por sus aportes y a Reginaldo Lejarraga por su permanente colaboración e inagotable entusiasmo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

AGUILAR, H. A. y E. A. KOWALINSKI. 1996. Nota sobre la nidificación y la alimentación del Gavilán Mixto *Parabuteo unicinctus* en Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 33: 30-31.

CARRIZO, M. A., P. A. SEWALD y F. R. TIZÓN. 2001. Notas sobre la avifauna del partido de Saavedra, Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 42: 31.

CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía LOLA, 12. Buenos Aires, 126 páginas.

COBOS, V., R. MIATELLO y J. BALDO. 1999. Algunas especies de aves nuevas y otras con escasos registros para la Provincia de Córdoba, Argentina II. *Nuestras Aves*, 39: 7-11.

DE LA PEÑA, M. R. 1994. Guía de aves de Argentina, tomo III. Editorial L.O.L.A. Buenos Aires, 180 páginas.

DELHEY, J. K. V. 1992. Algunas aves nuevas o poco conocidas para la región de Bahía Blanca. *Nuestras Aves*, 27: 31-32.

DELHEY, J. K. V. y M. CARRETE. 1999. Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 40: 11-12.

DELHEY, J. K. V., P. F. PETRACCI y C. H. F. PÉREZ. 2001. Observaciones de charadriiformes en el sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 42: 14-16.

LEVEAU, C. y L. LEVEAU. 2001. Nuevos registros de aves para Benito Juárez, provincia de Buenos Aires (Argentina). *Nuestras Aves*, 41: 30-31.

MACEDA, J. J., M. KIN y F. TITTARELLI. 1997. Nuevos registros de aves para la Provincia de La Pampa, Argentina, *Nuestras Aves* 37: 2-4.

MARTÍNEZ, M. M., J. P. ISAAC y F. DONATI. 1996. Aspectos de la distribución y biología reproductiva de *Asio clamator* en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Ornitología Neotropical*, 7 (2): 157-161.

NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la Provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.

NAVAS, J. R. 1994. Aves nuevas o poco comunes de la Patagonia. *Neotrópica*, 40 (103-104): 93-94.

NÚÑEZ CHAS, J. M. 1992. Hallazgo de un nido de *Leucochloris albicollis* en Mar de Plata. *Nuestras Aves*, 27: 32-33

PETRACCI, P. K., J. K. V. DELHEY, C. PÉREZ, D. BASANTE, M. MASSOLA, M. ZAMORANO y M. FOSATTI. 2004. Nuevos aportes al conocimiento de la distribución y anidación de algunas especies de aves en la Argentina, *Nuestras Aves*, 48; 25-28.

RENARD, A. 1929. Ensayo de aclimatación del cardenal (*Paroaria cucullata* Lath.) en la región de Bahía Blanca. *El Hornero*, 4 (3): 316-317

ROESLER, I. 2003. Observaciones de aves poco comunes en el noroeste de Buenos Aires y nordeste de La Pampa, Argentina, *Revista Nuestras Aves*, 45: 22-24.

Recibido: agosto 2005