




Fotos del primer ejemplar de fueguero oscuro encontrado en la Argentina, obtenidas por el autor de la nota.

y Rumboll (1998) señalan «sangre de toro» para Bolivia, y «jurundi» para Paraguay; Guyra Paraguay (2004) emplea jurundi, jakapá y sangre de toro, en este orden. Otra alternativa es utilizar uno de estos nombres en uso en vez de proponer uno nuevo.

Agradezco a Rosendo Fraga que facilitó los antecedentes y el material de la especie, a José Calo por la identificación, a Ignacio Roesler por la confirmación, a Juan María Raggio por su apoyo desinteresado tanto en el campo, como por su insistencia para la presentación de esta observación, y a Ricardo E. Doumécq Milieu que colaboró en la redacción de este escrito. También a Juan Carlos Chebez por la revisión del manuscrito y el aporte bibliográfico. Guillermo Gil aportó la identificación del chivato.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CHEBEZ, J. C. 1996. Fauna Misionera. Catálogo sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la

provincia de Misiones, Argentina. LOLA. Buenos Aires, 320 páginas.

DE LA PEÑA, M. R y M. RUMBOLL. 1998. Birds of southern South America and Antarctica. Collins Illustrated checklist. 304 páginas.

GUYRA PARAGUAY. 2004. Lista comentada de las aves de Paraguay. Asunción, 200 páginas.

HAYES, F. 1995. Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay. Amer. Bird Assoc. Monogr. in Field Ornithology(1), Albany. 230 páginas.

MAZAR BARNETT, J. y M. PEARMAN. 2001. Annotated checklist of the birds of Argentina. Lynx Edicions, Barcelona, .

RIDGELY, R. y G. TUDOR. 1994. The birds of South America. Volume 1. The Suboscine Passerines. In association with the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Oxford University Press. Oxford y Tokio, 814 páginas.

Recibida: julio 2006.

Revista Nuestras Aves, 52:34-35

FALAROPO PICO GRUESO (*Phalaropus fulicarius*) PARA LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Juan Manuel Rubio

Almafuerte 1.839, (9.200) Esquel, Provincia de Chubut, Argentina. Correo electrónico: juanmy_78@yahoo.com.ar

El 11 de diciembre del 2004 a las 18.30 observé un falaropo pico grueso en la Laguna La Zeta, a 3 km de la ciudad de Esquel (42° 55'S; 71° 20'O), provincia del Chubut. Nadaba y se alimentaba

activamente pero sin dar los giros característicos de la familia; estaba solo en la orilla de la laguna con muy poca vegetación acuática. Confiado, pude acercarme a 5-6 metros sin cambiar de com-



► ARTICULOS

portamiento. Pude ver las siguientes características que determinaron que era un *Phalaropus fulicarius*: pico corto y algo grueso con la base media amarillenta, mancha ocular negra y zona de la nuca negruzca; en vuelo, ala gris oscura con una notoria banda alar blanca.

El falaropo pico grueso es un ave pelágica y se lo encuentra ocasionalmente en la costa, ríos, lagos y lagunas; es un visitante estival del hemisferio norte donde nidifica (Couve y Vidal, 2003; Narosky e Yzurieta, 2003). Ya existían datos de su presencia para Chubut (Camperi, 1998; Chebez *et al.*, 1998). Los registros en la Argentina son accidentales, aunque por la cantidad de observaciones existentes tal vez resulte un errante de llegada regular (M. Pearkman, *in litt.*).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CAMPERI, A. R. 1998. Avifauna andino patagónica: lista comentada de especies. *Physis* (Secc. C.), 56: 33-46.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía N° 12, L.O.L.A., Buenos Aires, 126 páginas.
- COUVE, E. y C. VIDAL. 2003. Aves de Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica. Islas Malvinas y Georgia del Sur. Editorial Fantástico Sur Birding Ltda. 660 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. 15° edición. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 348 páginas.

Recibido: diciembre 2005

Revista Nuestras Aves, 52:35-36

CITA DE CHOROY (*Enicognathus leptorhynchus*) EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA

Horacio F. Matarasso¹ y Henry Webster²

¹Universidad Nacional del Comahue – AUSMA – Pasaje de la Paz 235 (8370) San Martín de los Andes, Argentina - aves@smandes.com.ar

² 25 W. Skippack Rike. Ambler, PA, USA - hcw@webco-controls.com

No existen registros previos fehacientes del choroy en la provincia del Neuquén (Del Valle *et al.*, 1989; Acerbo, 2000; Christie *et al.*, 2004), aunque si numerosos relatos de observadores locales y guardaparques, que creen haberlo visto en el área del paso Tromen, Parque Nacional Lanín, Neuquén. Veiga *et al.* (2005) no lo tratan en su listado principal de las aves de Neuquén, pero lo mencionan en un apartado de especies dudosas con un registro para Villa Pehuenia y señalan la existencia del paraje Ruca Choroy (que significaría «casa del choroy»). Veiga y Saibene (2005) indican que hay observaciones de ejemplares en Aluminé-Moquehue, que les fueron comunicadas por David Grosfield. Fjeldsa y Krabbe (1990) lo incluyen en la provincia, lo cual es corregido por Mazar Barnett y Pearman (2001) en la lista de especies erróneamente citadas, aunque indican que la presencia ocasional de esta especie en la Argentina no es imposible.

El 25 de febrero de 2006 a las 10 de la mañana observamos dos individuos en el bosque de pehuén

(*Araucaria araucana*) dentro de la estancia San Huberto, Paso Tromen (71° 25' W, 39° 35' S), próxima al Parque Nacional Lanín. Pudimos ver los choroy a unos 40 metros de distancia con binoculares (uno de 10 x 25). En la zona es común su congénere, la cachaña (*Enicognathus ferrugineus*), de la que se distingue en una primer aproximación por su mayor tamaño, y viéndola en detalle por su frente y loral más rojizos, sobre un pico cuya maxila es más larga y aguda. Los individuos estaban posados y alimentándose en un pehuén, en una zona donde esta especie crece junto a hayas australes del género *Nothofagus*.

La presencia del choroy en el área no es sorprendente. Además de los antecedentes comentados para el país, la especie también frecuente los bosques de pehuén en la temporada de maduración de sus semillas del otro lado del límite en la Republica de Chile (Jaramillo, 2004).

En la Argentina, consideramos que se trata de una especie que ocasionalmente puede ser encontrada