



► ARTICULOS

Pozo Hondo (27°10'S 64°30'W), provincia de Santiago del Estero, perchada en un algarrobo. Si bien esta especie ya es conocida para los ambientes salobres de la provincia (Narosky e Yzurieta, 2003), es un dato interesante por lo puntual de su distribución en Salinas Grandes en la unión de las provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero, y en las Salinas de Ambargasta (Nores *et al.*, 1991). Esta localidad contiene bosques y salitrales, y se encuentra a unos 100 km del límite norte de su distribución conocida y próxima a las pequeñas salinas de la localidad de Ardiles.

Corbatita blanco (*Sporophila leucoptera*)

Esta especie llega ocasionalmente a Tucumán en migración (Lougheed, 1991) y ha sido observada en la Reserva Provincial La Florida, en los márgenes de la ruta 38.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BRANDÁN, Z. y C. ANTELO (2001) Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo: catálogo de especies de Tucumán. Fundación Miguel Lillo, Misceláneas, 116.
- LOUGHEED, S. 1991. Nueva localidad para la Corbatita blanca *Sporophila leucoptera* (Vieillot). *Nuestras Aves*, 24: 25.
- LUCERO, M. M. 1983. Lista y distribución de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. Miscelánea N° 75, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, 55 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. *Aves Argentinas*. Editorial Vázquez Mazzini, 346 páginas.
- NORES, M., D. YZURIETA y S. A. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín Academia Nacional Ciencias Córdoba*, 59: 157-196.
- MARINI, M. A. y R. B. CAVALCANTI. 1990. Migraciones de *Elaenia albiceps chilensis* e *Elaenia chiriquensis albivertex* (Aves: Tyrannidae). *Boletín Museo Paranense Emilio Goeldi, Serie Zoología*, 6 (1).

Recibida: marzo 2004.

Revista Nuestras Aves, 50:21-24

**SOBRE EL ANILLADO DE AVES EN LA ARGENTINA:
RECUPERACIONES Y RECAPTURAS**

Mauricio Rumboll¹, Patricia Capllonch², Rebeca Lobo² y Gabriel Punta³

¹ Administración de Parques Nacionales.

² Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, UNT. Miguel Lillo 205 (4000) Tucumán, Argentina. cenaarg@yahoo.com.ar.

³ Dirección de Fauna de la Provincia de Chubut, 9 de Julio 280 (9103), Rawson, Chubut, Argentina. gpunta@infovia.com.ar.

Se presentan resultados de campañas de anillado de avutardas realizadas en la provincia de Santa Cruz hace más de dos décadas y de las cuales se obtuvieron numerosas recuperaciones y avistajes. También de campañas de marcado de cormoranes en la costa atlántica de la provincia de Chubut y del anillado de aves en el noroeste argentino.

Recuperaciones

Cormorán antártico (*Phalacrocorax bransfieldensis*)

Fue anillado por investigadores de la Universidad de Mar del Plata, el 19 de diciembre de 1989 como pichón en Punta Armonía, Isla Nelson, Shetland del Sur, Antártida y hallado muerto en la costa de San Salvador de Bahía en abril de 1997 por Pedro Lima. Otro ejemplar, marcado en la misma campaña, fue recuperado en septiembre de 1994 en Barra Do Itariri, Municipio Do Conde, litoral norte de Bahía (ver mapa).






ARTICULOS

Cormorán imperial (*Phalacrocorax atriceps*)

Gabriel Punta y colaboradores marcaron 1.627 cormoranes en Isla Isabel e Isla Galiano, departamento Florentino Ameghino, Chubut, entre 1990 y 1993, obteniéndose 18 recuperaciones (ver cuadro 1 y mapa).

**Cauquén común (*Chloephaga picta*)**

Mauricio Rumboll y colaboradores del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" realizaron una campaña de anillado en enero y febrero de 1978 en el Parque Nacional Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz. Se marcaron 479 *C. picta* en Laguna del Río Robles. Los anillos fueron prendidos a collares de metal liviano maleable de colores resistentes. Se obtuvieron ocho recuperaciones: 1) Coyhaique, Aysen, Chile, agosto de 1980; 2) Lago Burmeister, Santa Cruz, febrero de 1982; 3) Río Robles, Santa Cruz, abril de 1982; 4) Coyhaique, Aysen, Chile, julio de 1982; 5) Carhué, Buenos Aires, julio de 1982; 6) Balmaceda (50 km al sur de Coyhaique), Aysen, Chile, junio 1986; 7) Estancia La Oriental, zona del Lago Belgrano, Santa Cruz, diciembre de 1987; 8) Laguna Roble, Parque Nacional Perito Moreno, abril de 1992.

Se comunicaron también al Centro Nacional de Anillado de Aves cuatro avistajes del cauquén común en proximidades del Lago Belgrano, gracias a los collares de colores que podían ser observados desde lejos: 1) Estancia Lago Belgrano, octubre de 1991, collar anaranjado; 2) 3 km del lugar anterior, octubre de 1991, collar plateado con franja vertical roja; 3) El 5/12/92 una hembra junto al macho con collar anaranjado; 4) El 21/12/92 una hembra junto al macho con collar anaranjado a 4 km del lugar anterior.

Las últimas recuperaciones y avistajes del cauquén común se produjeron 24 años después de que fueran marcados, por lo que se trata de animales longevos aún en la vida silvestre. La recuperación más

Cuadro 1. Hallazgos de ejemplares anillados de cormorán imperial

Sitio y fecha de marcado	Sitio y fecha de recuperación	Autor del hallazgo
Isla Isabel, 1/2/90	Bahía Engaño, Los Cangrejales, Rawson, Chubut, 31/12/90	Domingo Vassilios
Isla Galiano, 2/2/90	Punta Norte, Península Valdés, Chubut, 20/3/90	Juan Carlos López y John Waters
Isla Isabel, 30/1/90	Isla de los Pájaros, Golfo San José, Chubut, 22/3/90	Diego Conchillo
Isla Isabel, 31/1/90	Bahía Jansen, proximidades de Punta Tombo, Chubut, 04/90	Axel Bos
Isla Galiano, 3/2/90	El Pedral, Golfo Nuevo, Chubut, 13/10/90	Luis Vázquez
Isla Isabel, 1/2/90	Playa Los Cangrejales, Bahía Engaño, Chubut, 31/12/90	Domingo Vassilios
Isla Isabel, 31/1/90	Isla Pan de Azúcar, Golfo San Jorge, Chubut, 10/1/91	Hugo Regner
Isla Isabel, 30/1/90	Playa Ferro, Golfo Nuevo, Chubut, 29/1/91	Katty Olsen
Isla Galiano, 9/2/91	Playa Ferro, 28/3/91	Katty Olsen
Isla Galiano, 9/2/91	Punta Delgada, Península Valdés, 30/4/91	Flavio Quintana
Isla Isabel, 18/2/92	Punta Norte, Península Valdés, Chubut, 18/4/92	Axel Bos
Isla Galiano, 19/2/92	Punta Norte, 20/5/92	Axel Bos
Isla Isabel, 18/2/92	Punta Norte, 28/5/92	Axel Bos
Isla Isabel, 16/1/92	Punta Tombo, Chubut, 18/8/92	Pablo Yorío
Isla Galiano, 3/2/90	Red de pesca en Bahía Camarones, Chubut, 11/91	buque de altura
Isla Isabel, 10/1/92	Puerto Visser, Golfo San Jorge, Chubut, 04/95	Mónica Abril
Isla Galiano, 9/2/91	San Antonio Oeste, Río Negro, 7/9/97	Patricia González
Bahía Bustamante, 02/90	Rocas Coloradas, al norte de Comodoro Rivadavia, Chubut, 12/99	Luciani (enviado por Graciela Escudero)



► ARTICULOS

lejana al sitio de anillado se produjo 1.300 km al noroeste en la provincia de Buenos Aires, mientras que las restantes a no más de 200 km al noroeste y suroeste del lugar de anillado (CENAA, 1988; Lucero, 1992).



Zorzal colorado (*Turdus rufiventris*)

Un ejemplar marcado en Horco Molle, Tucumán, el 3/2/93 a 650 m de altura en Bosque Montano Inferior fue recuperado a fines de junio de ese mismo año sobre la margen del río Salí, unos 30 km al este.

Chiví común (*Vireo olivaceus*)

Un macho marcado el 27 de octubre de 1989 en Piedra Tendida, Burruyacu, fue recuperado a unos 200 km el 15 de diciembre de 1989 en Dique San Ignacio, La Cocha, donde tenía protuberancia cloacal bien desarrollada y estaba nidificando. Ambas localidades tucumanas poseen Selva de Transición. Esta especie se desplaza hacia el norte luego de criar, llega en migración hasta Colombia (Stiles, 2004).

Naranjero (*Thraupis bonaeriensis*)

Un ejemplar marcado el 28/10/90 en la Reserva de Flora y Fauna de Horco Molle, Tucumán, fue recu-

perado muerto el 5/9/95 en Barra Da Lagoa Do Peixe, Rio Grande Do Sul, Brasil. Es la primera recuperación que se obtiene de esta especie, mostrando un desplazamiento de unos 1.500 km al este del lugar de marcado. Fue recuperado por Edair Maria Corteletti de Porto Alegre. No hay registros de la migración de esta especie pero este tipo de migraciones oeste-este, desde la Argentina a Brasil ya es conocido para algunas aves, como una raza del fiofío silbón (*Elaenia albiceps chilensis*) (Marini y Cavalcanti, 1990).

Recapturas

Se trata de recuperaciones de aves realizadas en el mismo lugar de anillado, nos indican sedentarismo, longevidad y, en casos de aves migratorias, fidelidad al sitio de nidificación.

Pato de los torrentes (*Merganetta armata*)

Un macho fue anillado el 22/10/93 en la zona del El Indio, Tucumán (27°03' S 65°40' W), y recapturado el 12/3/96. El pato de los torrentes posee un territorio de cría que mantiene a lo largo de los años; con la llegada de los fríos de mayo, realiza desplazamientos agrupándose e invernando en el Lago La Angostura y algunos ríos del Valle de Tafí. Otro ejemplar marcado el 18/3/94 en el río Los Sosa, Tucumán, a la altura del km 49 (26°53' S 65°41' W), fue recuperado el 24/11/96.

Remolinera común (*Cinclodes fuscus*)

Un ejemplar marcado el 22/6/95 en el río Chulca, San Pedro de Colalao, Tucumán, a 800 metros de altura, fue recuperado el 29/8/99. Es interesante la presencia de este ejemplar después de cuatro años en el mismo sitio. Se trata de una especie que realiza desplazamientos altitudinales a lo largo de los ríos.

Coludito copetón (*Leptasthenura platensis*)

Anillado en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza, el 4/11/92 y recapturado el 1/11/93. Esta recaptura muestra la fidelidad al sitio de nidificación.

Curutié blanco (*Cranioleuca pyrrhophia*)

Anillado en Agua Salada, Los Puestos, Tucumán el 19/6/92 y recapturado el 6/9/94. Es una especie residente de la cual no existen datos de desplazamientos invernales.

Cortarrama (*Phytotoma rutila*)

Anillado en Agua Salada, Los Puestos, Tucumán el 19/6/92 y recapturado el 6/9/94.



ARTICULOS

Viudita de río (*Sayornis nigricans*)

Anillado en la Reserva Provincial Aguas Chiquitas, Tucumán el 29/10/93 y recapturado el 17/2/96.

Suirirí pico corto (*Sublegatus modestus*)

Anillado en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza, el 4/11/92 y recapturado 2/11/93.

Piojito común (*Serpophaga subcristata*)

Anillado en Agua Salada, Los Puestos, Tucumán el 19/6/92 y recapturado el 6/9/94. Otro ejemplar de la misma especie fue anillado el 29/10/93 en la Reserva Provincial Aguas Chiquitas, Tucumán, y fue recapturado el 15/2/94. Se trataba de una pareja que permaneció durante todo el verano.

Mosqueta parda (*Lathotriccus euleri*)

Fue anillado en la Reserva Provincial Aguas Chiquitas el 29/10/93 y fue recapturado el 19/2/94. Esto comprueba la fidelidad de esta especie a su sitio de nidificación.

Fío-fío oscuro (*Elaenia obscura*)

Marcada el 28/10/84 en la Ruta 307, camino a Taff del Valle, Tucumán, a 850 m de altura, fue recuperada el 14/10/87. Esta *Elaenia* es la única residente, las otras congéneres presentes, *E. a. albiceps*, *E. strepera* y *E. parvirostris* son migratorias (Capllonch y Lobo, 2005).

Mirlo de agua (*Cinclus schulzi*)

Anillada en El Indio (1.200 m), Tucumán el 22/10/93 y recapturado el 11/3/94. El mirlo de agua realiza desplazamientos altitudinales, descendiendo por los ríos o ascendiendo hacia los valles de altura (Taff del Valle, La Ciénaga).

Zorzal colorado (*Turdus rufiventris*)

Se registraron cinco recapturas: 1) Piquirenda Viejo, Salta. Anillado en noviembre de 1984 y recapturado en agosto de 1987. 2) Arroyo Las Cañas a 750m en Selva Basal, Horco Molle, Tucumán. Anillado el 2/2/87 y recapturado el 27/8/87 y el 3/10/89. 3) Anillado en Cochuna, Tucumán el 4/12/91 y recapturado el 3/11/96. 4) Anillado en la Reserva Provincial Aguas Chiquitas, Tucumán, el 29/10/93 y recapturado el 15/2/94. 5) Anillado Reserva Provincial Aguas Chiquitas, Tucumán, el 29/10/93 y recapturado el 18/2/94.

Arañero chico (*Basileuterus culicivorus*)

Un ejemplar marcado en 2/5/97 en Piedra Tendida, Burreyacu, Tucumán, fue recuperado el 3/10/99.

Arañero corona rojiza (*Myioborus brunniceps*)

Un ejemplar macho marcado el 2/5/97 en Piedra Tendida, Burreyacu, Tucumán (26°30' S 64°52' W), fue recuperado el 3/10/99.

Fruterito yungueño (*Chlorospingus ophthalmicus*)

Marcado en Arroyo Las Cañas a 750 m en Horco Molle, Tucumán, (26°47' S 65°23' W), el 2/2/87 y fue recuperado el 27/8/87 y el 2/11/90. Estas recapturas confirman a esta especie como residente.

Cerquero de collar (*Arremon flavirrostris*)

Anillado en Piedra Tendida, Burreyacu, Tucumán (26°30' S 64°52' W), el 31/5/97, fue recuperado el 2/10/98. Esta especie terrícola es residente, permaneciendo todo el año en los mismos territorios de las selvas pedemontanas. Anillado en Horco Molle, Tucumán el 15/10/93, fue recapturado el 15/4/97.

Cerquero amarillo (*Atlapetes citrinellus*)

Marcado en el Taficillo, Cumbres de San Javier a 1667 m de altura, Tucumán, el 20/9/93 y recapturado en el mismo sitio el 1/12/95 con protuberancia cloacal bien desarrollada.

Chingolo (*Zonotrichia capensis*)

Anillado y recuperado dos veces en Ñacuñán, Mendoza: 1) 6/11/92 y 1/11/93; 2) 5/11/92 y 1/11/93.

Diuca común (*Diuca diuca*)

Un ejemplar anillado en Ñacuñán, Mendoza, el 5/11/92 fue recapturado el 2/11/93.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CAPLLONCH, P. y R. LOBO. 2005. Contribución al conocimiento de la migración de tres especies de *Elaenia* de Argentina. *Ornitología Neotropical* 16:145-161.
- CENAA, 1988. Sobre el anillado de aves en Argentina. Serie Monográfica y didáctica N° 1. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Tucumán, 32 páginas.
- LUCERO, M. M. 1992. Nuevos aportes al conocimiento migratorio de *Chloephaga picta* (Gmelin) en la República Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, 42 (1): 165-170
- MARINI, M. A. y R. B. CAVALCANTI. 1990. Migrações de *Elaenia albiceps chilensis* e *Elaenia chiriquensis albivertex* (Aves: Tyrannidae). *Boletín Museo Paraense Emilio Goeldi, Ser. Zool.* 6:59-67.
- STILES, F. G. 2004. Austral migration in Colombia: The estate of knowledge, and suggestions for action. *Ornitología Neotropical* 15, (Suppl.): 349-355.

Recibida: septiembre de 2004