



► ARTICULOS

lidad. Fue necesario arrastrar el cuerpo y mediante aleteos esporádicos que lo elevaron hasta aproximadamente 40 cm del suelo chocó hasta dos veces con un alambrado perimetral de malla tipo olímpico. Luego de un instante de quietud optó por dirigirse a unas matas de cañas tacuarembó (*Chusquea ramosissima*) en donde, posado sobre un tronco, empezó a comer el benteveo. Inició el desplume en la parte occipital, extirpó de manera total un globo ocular que descartó, y alcanzó el cerebro el cual ingirió. Finalmente, con su presa levantó vuelo a unos 3 m de altura hasta un laurel (*Nectandra* sp.), para después perderse entre los árboles de la selva.

La observación duró en total 15 minutos, por lo cual fue posible realizar una descripción detallada del plumaje del esparvero (ver dibujo): pico corto, robusto y negro; cera y ceja amarilla casi unidas entre sí en la parte frontal, característica notoria debido a que el superciliar estaba desprovisto de plumas y su coloración lo daba la piel desnuda; patas naranja, no amarillas como la cera y cejas; notable iris rojo que contrasta con el amarillo de las cejas. Plumaje: garganta blanca, en contraste con el barrado fino gris oscuro del pecho, abdomen, piernas y zona subcaudal; corona y nuca negras continuada por el dorso con un tono más pálido tornándose grisáceo en la espalda. Esta coloración de base presentaba manchas poco definidas un tanto más oscuras en escapulares y cobertoras alares (solo visible a corta distancia). Cola corta con barrado grueso. Tamaño: en relación a su presa, por comparación se deduce que el esparvero

podría tratarse de una hembra por ser unos 4 a 5 cm más largo que el benteveo común.

Agradezco a María Laura González, Jorge Cieslik, Ariel Soria, Rosendo Fraga, Justo Herrera, Miguel Castelino y Ángel Caradonna por la consulta de bibliografía. A Andrés Bosso y Juan Carlos Chebez por sus comentarios acerca de la especie. A Elba Pescetti, Fernando Costa Straube, Ernesto Krauczuk, y al cuerpo de guardaparques del Parque Nacional Iguazú por su apoyo incondicional. A Mark Pearman por facilitar antecedentes sobre la especie en Misiones.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BERTONI, A. de W. 1904. Contribución para el conocimiento de las aves del Paraguay. Anales Científicos Paraguayos, Ser. 1 (3): 1-10.
- BIERREGAARD, R. O. 1994. Neotropical Family Accipitridae (Hawks and Eagles). En J. del Hoyo, A. Elliot y J. Sargatal (eds.), «Handbook of the Birds of the World», 2: 52-505. Lynx Edicions, Barcelona, 638 páginas.
- NAVAS, J. R. y N. A. BO. 1991. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina IV. Revista Museo Argentino de Ciencias Naturales, 15 (8): 95-106.
- ORDANO, M. A. y A. C. BOSISIO. 2001. Catálogo de aves del Museo Provincial de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino», Santa Fe, Argentina. Serie Catálogos del Museo Provincial Ciencias Naturales «Florentino Ameghino», Santa Fe, N° 7.
- SAIBENE, C. A., M. CASTELINO, N. REY, J. CALO y J. HERRERA. 1996. Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. Monografía Especial LOLA, 9. Buenos Aires, 68 páginas.

Recibida: octubre 2003

Revista Nuestras Aves, 49:24-25

NIDIFICACIÓN DE LA RATONA APERDIZADA (*Cistothorus platensis*) EN EL OESTE DE RÍO NEGRO, ARGENTINA

Mariano A. Gelain y Mariano Diez Peña

Lanín 3.541 (8400) Fuera de Radio, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. gnsparagonia@bariloche.com.ar

En los primeros días de octubre de 2003 relevamos Playa Negra (41° 22' S, 71° 34' W), un mallín que se encuentra en la costa sur del lago Mascaradi, al sur del Parque Nacional Nahuel Huapi. El ambiente es un campo anegadizo de 70 cm de profundidad, con un promedio de 40 cm. Las especies vegetales más representativas en el área son el chapel (*Escallonia rubra*), *Poa* sp. y *Scirpus* sp. La depresión se encuentra rodeada por un bosque mixto de ñires (*Nothofagus antarctica*), coihue (*Nothofagus dombeyi*), maitén (*Maytenus boaria*), laura (*Schinus patagonicus*),

radal (*Lomatia hirsuta*), michay (*Berberis buxifolia*), caña colihue (*Chusquea* sp.), y dos plantas invasoras: rosa mosqueta (*Rosa eglanteria*) y diente de león (*Taraxacum officinale*).

El 4 de octubre de 2003 hallamos dos individuos de ratona aperdizada (*Cistothorus platensis*) en el borde norte de Playa Negra. El 6 de octubre, uno de los autores y Lucas Cannistraci encontraron un nido y fotografiaron un adulto con un largo pasto de hoja ancha en el pico. Durante las visitas siguientes se observó a la misma pareja construir dos nidos más,



➤ ARTICULOS

a 25 y 38 metros de distancia del primer nido. Durante nuestras incursiones detectamos que del primer nido cada vez que nos acercábamos salía de su interior un pequeño micromamífero sin identificar. Al parecer esta podría ser la causa -invasión de los nidos- que explica el abandono de construcciones y la elaboración de otras nuevas. Los nidos hallados coincidían en estructura, material y tipo de hábitat con las descripciones de Humprey *et al.* (1970).

El 3 de noviembre de 2003 tomamos los datos siguientes. En todos los casos los nidos estaban situados a 50 cm sobre el nivel del suelo, en una mata de chapel de un metro de diámetro por 1,30 m de altura, rodeados de juncos y pastos de hoja ancha. En todos los casos el pasto y los juncos fueron utilizados como material de construcción principal. Las hojas de pasto eran angostas y largas, entretejidas de tal manera que la estructura quedaba asegurada a unas pocas ramitas verdes de chapel. La forma de la estructura era ovoidal, comprimida lateralmente, ligera de espesor y poco apretada. Los juncos quedaban cortados y doblados por encima de los nidos, cubriéndolos. La entrada lateral estaba ubicada en el tercio superior del nido y, en un caso comprobado, orientada hacia el sur. Internamente estaba revestido con material vegetal fino. No vimos plumas como lo indica De la Peña (1997). Medidas de un nido (en mm): altura, 135; diámetro, 103; diámetro de la entrada, 40 por 28; de la boca de la entrada al fondo de la cámara, 82 cm.

Estas medidas son levemente menores a los promedios mencionados por De la Peña (1997) pero coinciden con De la Peña (1987) para un nido hallado en Los Gigantes, provincia de Córdoba. Las observaciones realizadas por los autores coinciden con lo ya descrito por Housse (1945), quien al describir los nidos de esta especie se refiere a un ambiente de características similares. Housse (1945) señala que

los nidos, hallados en la isla Mocha eran de comienzos de septiembre y agrega que la especie no vive en la cordillera.

Registros posteriores de la especie en mallines del amplio valle cordillerano del río Manso superior, permiten señalar que la especie habita este tipo de hábitat bajos en la zona cordillerana del oeste de Río Negro.

Los datos que se tienen para los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín, en el oeste de las provincias de Río Negro y Neuquén, se limitan a la detección de la especie en unos pocos sitios. El hallazgo de pichones hasta la fecha era señalada para diciembre. En estos parques nacionales su estatus de presencia es de «rara» y está tratada como un ave residente permanente (Christie *et al.*, 2004). No se conocían datos de nidos para estas áreas. La descripción de estos nidos confirman la anidación de la especie en el noroeste de la Patagonia Argentina.

Los autores agradecen a Martín Rodolfo de la Peña por la lectura y las sugerencias realizadas al presente artículo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CHRISTIE, M., E. RAMILO y M. BETTINELLI. 2004. Aves del noroeste patagónico. Guía y atlas. Sociedad Naturalista Andino Patagónica y LOLA. Buenos Aires, 328 páginas.
DE LA PEÑA, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Edición del autor. Santa Fe, 229 páginas.
DE LA PEÑA, M. R. 1997. Nidos y huevos de aves argentinas. Fundación Hábitat. Santa Fe, 369 páginas.
HOUSSE R. 1945. Las aves de Chile en su clasificación moderna. Ediciones de la Universidad de Chile. Santiago.
HUMPHREY, P. S., D. BRIDGES, P. W. REYNOLDS y R. T. PETERSON. 1970. Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego). Smithsonian Institution. Washington, D. C., 411 páginas.

Recibida: diciembre 2003

Revista Nuestras Aves, 49:25-26

OBSERVACIONES NOVEDOSAS PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

Flavio Martínez¹ y Roberto Pereyra Lobos²

Dirección de Recursos Naturales Renovables. Boulogne sur mer s/n. Parque General San Martín Provincia de Mendoza. ¹martinezflavio@yahoo.com.ar ²robertopereyra@topmail.com.ar

Sirirí colorado (*Dendrocygna bicolor*)

El 6 de diciembre de 1999 se observaron cuatro ejemplares en las orillas del río San Juan, límite na-

tural entre las provincias de Mendoza y San Juan, a unos 4 kilómetros de la localidad de El Encon. Esta especie fue citada para la laguna de Llancanelo, de-