



ARTICULOS

horas de la tarde. Estaban posados en un quebracho colorado (*Schinopsis lorentzii*) con escaso follaje, en medio de un cultivo de maíz (*Zea mays*), aledaño a uno de soja, junto a dos ejemplares de carancho (*Caracara plancus*).

Luego de permanecer en el lugar, los aguiluchos levantaron vuelo planeando a unos 50 metros de altura por el lapso de unos diez minutos describiendo círculos concéntricos, en dirección al observador, lo que facilitó la documentación fotográfica de dos de los ejemplares. En la misma, puede apreciarse la coloración negruzca general del plumaje, patas y cera amarilla, y las remeras y cola ventrales blancuzcas, patrón característico de identificación para la especie.

Posteriormente, se posaron en un pastizal de gramíneas cercano, respetando cierta distancia entre ellos, para luego volar nuevamente hasta perderse de vista detrás del bosque natural situado a unos 500 metros del lugar.

El bosque de tipo chaqueño occidental, observado en el sitio de muestreo y zonas adyacentes, refleja cambios acelerados en el ambiente natural, al igual que en otras regiones del norte del país, producido por la intensa deforestación para incrementar el área de cultivo de soja principalmente. Esto crea

mayor disponibilidad de hábitat para algunas especies, aunque en desmedro de la contaminación producida por la aplicación de agroquímicos elevadamente tóxicos, que constituyen un peligro para la fauna silvestre, como los aguiluchos y sus presas.

Precisamente en el lugar citado, se detectó el trabajo continuo de las topadoras, eliminando la cobertura vegetal en todas sus formas, sumando áreas de cultivo a las ya miles de hectáreas establecidas.

Agradezco a Hernán Casañas por la verificación de la especie y a Alejandro Bodrati por la lectura crítica del manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BODRATI, A., H. DEL CASTILLO y J. KLAVINS. 2004. Nuevos registros del aguilucho jote (*Buteo albonotatus*), con comentarios sobre su presencia en el norte de la Argentina y Paraguay. *Nuestras Aves*, 47: 28-30.

DI GIACOMO, A. G. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. En A. G. Di Giacomo y S. Krapovickas (eds.), «Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, Provincia de Formosa, Argentina»: 201-465. *Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas*, 4. Buenos Aires, 578 páginas.

Recibida: febrero 2004

Revista Nuestras Aves, 49:28-29

EL AGUILUCHO JOTE (*Buteo albonotatus*) EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA

Saúl G. Borbolla¹ y Claudia F. Marano²

¹Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán y Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. Correo electrónico: clau_marano@yahoo.com.ar

Como parte del proyecto «Las Aves de la Reserva Experimental de Horco Molle», el 17 de noviembre de 2003, nos encontrábamos realizando los habituales muestreos de aves en la mencionada Reserva, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, cuando aproximadamente a las 8 pudimos observar una rapaz que hasta ese momento no habíamos registrado con anterioridad. Se trataba de un aguilucho de tamaño medianamente grande, de una coloración gris plumizo oscuro a negro, con una larga cola negra atravesada por tres bandas blancas, siendo la última algo más gruesa y subterminal. Las alas eran negras y no muy anchas, y en vista ventral remeras barradas de blanco.

Con el dibujo, consultamos bibliografía sobre el tema y sólo una especie de aguilucho coincidía con estos rasgos, *Buteo albonotatus*, Zone-tailed Hawk (Thiollay, 1994), aguilucho oscuro (Olrog, 1968). Grande fue nuestra sorpresa al consultar páginas de Internet donde pudimos apreciar fotos de esta especie y corroboramos que se trataba de la que habíamos visto en la Reserva.

En la Argentina, la especie tiene pocos registros (ver Bodrati *et al.*, 2004; Di Giacomo, 2005; Cejas, 2005).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BODRATI, A., H. DEL CASTILLO y J. KLAVINS. 2004. Nuevos registros del aguilucho jote (*Buteo albonotatus*), con



► ARTICULOS

comentarios sobre su presencia en el norte de la Argentina y Paraguay. *Nuestras Aves*, 47: 28-30.

CEJAS, W. 2005. Primer registro del aguilucho negro (*Buteo albonotatus*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 49: 27-28

DI GIACOMO, A. G. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. En A. G. Di Giacomo y S. Krapovickas (eds.), «Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, Provincia de Formosa, Argentina»: 201-465. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas, 4. Buenos Aires, 578 páginas.

OLROG, C. C. 1968. Las Aves Sudamericanas. Una guía de Campo. Tomo 1. Instituto Miguel Lillo. Tucumán, 507 páginas.

THIOLLAY, J. M. 1994. Family Accipitridae (Hawks and Eagles). En J. del Hoyo, A. Elliott y J. Sargatal (eds.), «Handbook of the Birds of the World», 2: 52-205. Lynx Edicions. Barcelona, 638 páginas.

PAGINAS DE INTERNET:

<http://www.avesphoto.com/website/n0209AZ/species/n0209AZ-2.htm>

<http://home.att.net/~amcimages/mtsignalbirdalert.html>

Recibida: marzo 2004

Revista Nuestras Aves, 49:29

REGISTROS DEL GAVIOTÍN PICO NEGRO (*Sterna nilotica*) Y PLAYERITO UNICOLOR (*Calidris bairdii*) EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA

Marcelo Romano, Fernando Pagano, Ignacio Barberis y Juan Maidagan

Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (ECOSUR). Pasaje Sunchales 329 (2000) Rosario, Argentina.
m cromano@arnet.com.ar

El gaviotín pico negro (*Sterna nilotica*) tiene pocos registros para la provincia (Martinez Achenbach, 1957; De la Peña, 1997; Di Giacomo *et al.*, 2001; Pautasso, 2002). Sin embargo fue sistemáticamente registrada durante nueve años en el transcurso de 18 censos realizados en la laguna Melincué (33° 43' S / 61° 28' O), en números variables (entre paréntesis figura el número de ejemplares): 24/01/92 (8), 05/07/92 (11), 14/02/93 (84), 10/07/93 (3), 12/02/94 (126), 12/05/94 (2), 03/07/94 (8), 20/09/94 (1), 25/02/95 (6), 29/07/95 (1), 25/02/96 (61), 04/08/96 (9), 08/02/97 (123), 10/08/97 (5), 09/08/98 (9), 10/04/99 (47), 14/08/99 (63), 06/02/02 (44).

De la Peña (1997) menciona escasas observaciones dispersas del playerito unicolor (*Calidris bairdii*) para la provincia, y Pautasso (2002) cita tres ejemplares registrados en 1998 en laguna La Salada. Durante los censos mencionados anteriormente la especie

fue registrada en los siguientes números: 14/08/99 (55), 10/08/97 (4), 25/02/96 (7), 03/07/94 (42).

Nuestros registros evidencian que la escasez de relevamientos sistemáticos pueden enmascarar el verdadero estatus de algunas especies poco conspicuas.

BIBLIOGRAFIA CITADA

DE LA PEÑA, M.R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Monografía L.O.L.A. 15. Buenos Aires, 128 pags.

DI GIACOMO, A. G., A. S. DI GIACOMO y C. A. MARCHISIO. 2001. Nuevos registros de aves para el centro de la Argentina. *Nuestras Aves*, 42: 18-20.

MARTINEZ ACHENBACH, G. M. 1957. Lista de las aves de la provincia de Santa Fe. Anales Museo Provincial de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino», 1:1-61.

PAUTASSO, A. 2002. Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves*, 43: 19-21.

Recibida: abril 2004