



► ARTICULOS

comentarios sobre su presencia en el norte de la Argentina y Paraguay. *Nuestras Aves*, 47: 28-30.

CEJAS, W. 2005. Primer registro del aguilucho negro (*Buteo albonotatus*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 49: 27-28

DI GIACOMO, A. G. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. En A. G. Di Giacomo y S. Krapovickas (eds.), «Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, Provincia de Formosa, Argentina»: 201-465. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas, 4. Buenos Aires, 578 páginas.

OLROG, C. C. 1968. Las Aves Sudamericanas. Una guía de Campo. Tomo 1. Instituto Miguel Lillo. Tucumán, 507 páginas.

THIOLLAY, J. M. 1994. Family Accipitridae (Hawks and Eagles). En J. del Hoyo, A. Elliott y J. Sargatal (eds.), «Handbook of the Birds of the World», 2: 52-205. Lynx Edicions. Barcelona, 638 páginas.

PAGINAS DE INTERNET:

<http://www.avesphoto.com/website/n0209AZ/species/n0209AZ-2.htm>

<http://home.att.net/~amcimages/mtsignalbirdalert.html>

Recibida: marzo 2004

Revista Nuestras Aves, 49:29

REGISTROS DEL GAVIOTÍN PICO NEGRO (*Sterna nilotica*) Y PLAYERITO UNICOLOR (*Calidris bairdii*) EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA

Marcelo Romano, Fernando Pagano, Ignacio Barberis y Juan Maidagan

Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (ECOSUR). Pasaje Sunchales 329 (2000) Rosario, Argentina.
m cromano@arnet.com.ar

El gaviotín pico negro (*Sterna nilotica*) tiene pocos registros para la provincia (Martinez Achenbach, 1957; De la Peña, 1997; Di Giacomo *et al.*, 2001; Pautasso, 2002). Sin embargo fue sistemáticamente registrada durante nueve años en el transcurso de 18 censos realizados en la laguna Melincué (33° 43' S / 61° 28' O), en números variables (entre paréntesis figura el número de ejemplares): 24/01/92 (8), 05/07/92 (11), 14/02/93 (84), 10/07/93 (3), 12/02/94 (126), 12/05/94 (2), 03/07/94 (8), 20/09/94 (1), 25/02/95 (6), 29/07/95 (1), 25/02/96 (61), 04/08/96 (9), 08/02/97 (123), 10/08/97 (5), 09/08/98 (9), 10/04/99 (47), 14/08/99 (63), 06/02/02 (44).

De la Peña (1997) menciona escasas observaciones dispersas del playerito unicolor (*Calidris bairdii*) para la provincia, y Pautasso (2002) cita tres ejemplares registrados en 1998 en laguna La Salada. Durante los censos mencionados anteriormente la especie

fue registrada en los siguientes números: 14/08/99 (55), 10/08/97 (4), 25/02/96 (7), 03/07/94 (42).

Nuestros registros evidencian que la escasez de relevamientos sistemáticos pueden enmascarar el verdadero estatus de algunas especies poco conspicuas.

BIBLIOGRAFIA CITADA

DE LA PEÑA, M.R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Monografía L.O.L.A. 15. Buenos Aires, 128 pags.

DI GIACOMO, A. G., A. S. DI GIACOMO y C. A. MARCHISIO. 2001. Nuevos registros de aves para el centro de la Argentina. *Nuestras Aves*, 42: 18-20.

MARTINEZ ACHENBACH, G. M. 1957. Lista de las aves de la provincia de Santa Fe. Anales Museo Provincial de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino», 1:1-61.

PAUTASSO, A. 2002. Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves*, 43: 19-21.

Recibida: abril 2004