ARTICULOS

Revista Nuestras Aves, 48:10-11

APORTES AL CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y HÁBITAT DEL PIOJITO PICUDO (*Inezia inornata*) EN LA REGIÓN CHAQUEÑA

Alejandro Bodrati

Los Ceibos 1695, (1.607) Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: alebodrati@hotmail.com

El piojito picudo (*Inezia inornata*) es un visitante estival en la Argentina y Paraguay (Hayes, 1995; Mazar Barnett y Pearman, 2001). En Argentina ha sido mencionado sólo para las provincias de Salta y Jujuy (Olrog, 1979; Narosky e Yzurieta, 1987; Canevari *et al.*, 1991; De la Peña, 1999), aunque recientemente fue incluida por primera vez para la región chaqueña (Mazar Barnett y Pearman, 2001) sin registros o localidades precisas. Los datos sugieren que la especie es un habitante estival regular, la cual parece haber pasado desapercibida durante mucho tiempo. La región ha sido poco estudiada, y la especie es pequeña, críptica, y muy similar a otros tiránidos que utilizan el mismo hábitat y región. Los ejemplos más cercanos son: el piojito común (*Serpophaga subcristata*), en menor medida el piojito pardo (*Phaeomyias murina*), y el piojito silbón (*Camptostoma obsoletum*). Para poder detectar e identificar al piojito picudo de forma rápida y segura, es indispensable conocer previamente sus voces o hacer *playback* con una grabación.

Doy a conocer varios registros personales, y de terceros inéditos y un resumen de localidades para el este y centro de Chaco, este de Formosa (provincias de Argentina), y el Bajo y Alto Chaco en Paraguay.

El 23 de noviembre de 1998, en el sector este del Parque Nacional Chaco (26º50'S, 59º36'W), H. Casañas, acompañado por J. Klavins y A. Bodrati, grabó un ejemplar aislado en un bosque xerófilo bajo, abierto, con suelos despejados (sin sotobosque), y predominio de algarrobos (*Prosopis* spp.). Este bosque representa una transición entre el monte fuerte alto con predominio de quebracho colorado (*Schinopsis balansae*) y la sabana húmeda con palmares. El individuo se encaramó en la parte alta de árboles bajos en donde vocalizó muy seguido. Al utilizar *playback* bajó a un garabato (*Acacia praecox*) en el cual se posó a no más de dos metros de altura (se acercó de inmediato a la fuente de emisión). Luego, en el mismo parque, se la halló en los meses de noviembre y diciembre de 1999, diciembre de 2000 y enero de 2001, siempre en ambientes como el descripto, en estrato alto de árboles bajos. En todos los casos se lo reportó en forma aislada y en bajo número, por lo cual debe ser considerada como rara en la región. Estos registros permiten incluir al piojito picudo para el Parque Nacional Chaco, el cual no contaba con citas previas (*sensu* Chebez, *et al.* 1998) ni para la provincia.

Los días 3 y 4 de diciembre de 1999 este piojito fue registrado en el Parque Provincial Pampa del Indio (26º16'S, 59º58'W), sector sudeste, departamento de Libertador General San Martín. Detectado por la voz y luego observado un individuo en bosque xerófilo bajo y abierto, con copas separadas, y sotobosques cerrados con predominio de *Capparis* spp., y suelos cubiertos por caraguatás (bromeliáceas). Se la consideró rara para el sector (Bodrati *et al.*, 2000).

Entre los días 7 y 11 de diciembre de 1999, fue registrada durante un inventario en la estancia Laguna Corá, en el extremo oriental de la provincia de Chaco dentro del valle aluvial del río Paraná, entre los departamentos San Fernando y 1º de Mayo. Realicé registros diarios de hasta cuatro individuos. Siempre fueron observados en arbustales xerófilos en el albardón de transición entre la selva ribereña empobrecida del arroyo Tragadero, y los palmares mixtos de caranday (*Copernicia alba*). Por lo general se desplazaban en las tuscas (*Acacia aroma*) más bajas, en donde vocalizaban muy seguido. De los registros conocidos, estos serían los más australes para la especie.

En la provincia de Formosa, en el Parque Nacional Río Pilcomayo, M. Pearman (com. pers.) lo encontró en verano como uno de los tiránidos más comunes en bosques xerófilos. Este parque no contaba con registros anteriores de la especie (*sensu* López Lanús, 1997 y Chebez *et al.*, 1998), lo cual se puede explicar por corresponder los inventarios a periodos de invierno. En la Reserva el Bagual, también ha sido hallada en periodo estival, inclusive anidando (A. Di Giacomo, com. pers.).

El 21 de septiembre de 2004, C. Ferrari y R. Güller (*in litt.*) encontraron a la especie como abundante durante una recorrida por el camino vehicular que une a la ruta 11 con el paraje conocido como Tres Marías, 10 kilómetros al sudeste de la ciudad de Formosa, provincia homónimo. En varios puntos de este trayecto consiguieron detectar hasta seis

ejemplares en un radio aproximado de 200 metros. La especie fue observada siempre en bordes de pequeñas isletas de bosque bajo que alternaban con pastizales y bañados. Luego, el 23 y 24 del mismo mes, documentaron ejemplares de este piojito por medio de grabaciones y fotografías en la seccional estero Poí y en el extremo noroeste del Parque Nacional Río Pilcomayo, provincia de Formosa, donde sus poblaciones parecían ser sumamente densas y los ejemplares usaban bordes de isletas de bosque bajo y xerófilo.

En Paraguay, Hayes (1995) la señala para el Alto y Bajo Chaco, y se refiere a la especie como una rara visitante estival en ambas regiones. Trabajos posteriores sugieren que en el chaco paraguayo es frecuente.

Entre el 8 y el 20 de marzo de 2001, durante los inventarios de avifauna en la estancia Santa Asunción (23º53'S, 58º35'W), distrito Benjamín Aceval, Bajo Chaco, departamento Presidente Hayes, fue registrada a diario en un número que superaba los cinco ejemplares por día, por lo que se la consideró común durante el estudio (A. Bodrati y J. Klavins, obs. pers.). En el mismo sitio en un trabajo realizado en mayo de 2001, se la halló en números muy bajos, y se da como fecha límite para Paraguay el 21 de ese mes (Guyra Paraguay, 2004; A. Bodrati y A. Esquivel, obs. pers.).

En el Chaco Central paraguayo, que pertenece a la región Alto Chaco, presenta ambientes generales que se identifican con los del chaco seco. En este hábitat la especie fue considerada como frecuente en distintos trabajos de campo realizados por Guyra Paraguay durante el verano. Por ejemplo, en la Reserva Natural Privada Campo María (22º34'S, 59º20'W), distrito Pozo Colorado, Alto Chaco, departamento Presidente Hayes, fue registrada a diario entre el 25 de febrero al 6 de marzo de 2001, con un número promedio de cuatro ejemplares diarios (A. Bodrati y J. Klavins obs. pers.). Estas observaciones contribuyeron a que se la considere por Guyra Paraguay (2004) con el estatus de frecuente en la región Alto Chaco.

Se concluye que la especie habita una gran porción de la región chaqueña como visitante estival, tanto en Argentina como en Paraguay. La distribución en este período incluye su reproducción. Por medio de los registros obtenidos se infiere que abarca la mayor parte del chaco paraguayo y el oriente, centro y oeste de la región en la Argentina. Recientemente ha sido registrada en el oriente de la provincia de Salta en distintas localidades (H. Casañas, com. pers.), extendiendo considerablemente su rango, aunque su presencia era esperable por continuidad de los ambientes que habita. La especie parece preferir ambientes semi-xerófilos, aunque a menudo se la halla en lugares húmedos. Es interesante estudiar su asociación con estos hábitats.

Agradezco a Juan Klavins la colaboración prestada en el trabajo de campo, a Mark Pearman por los comentarios de sus observaciones en Formosa. Asimismo a todas las personas que hicieron posibles nuestros trabajos en el chaco o aportaron información, entre ellos a Andrés Bosso, Carlos Leoni, Juan Carlos Chebez, Carlos Ferrari, Roberto Güller, Alejandro Di Giacomo, Hernán Casañas, Alejandro Pietrek, José María Hervás, Yamila Gutani, Claudio Onetto, Álvaro Alsogaray, Arnaldo Dalmasso, Daniel Portal, Roque Aguirre, Vicente Alfonso, Antonio Spiridonoff, Homi Gonzáles, Robert Clay, y Alberto Esquivel. Por el envío de información a Hugo del Castillo como responsable de la base de datos de Guyra Paraguay. Las observaciones en Paraguay fueron realizadas durante campañas financiadas por Guyra Paraguay. A Kristina Cockle por sus aportes al manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BODRATI, A., H. CASAÑAS y A. PIETREK. 2000. Relevamiento de los recursos biológicos del Parque Provincial Pampa del Indio (departamento Libertador Gral. San Martín, Chaco). Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 103 páginas.

CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.

CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía LOLA, 12. Buenos Aires, 126 páginas.

DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves argentinas, lista y distribución. Editorial LOLA. Monografía Nº18. Buenos Aires, 244 páginas.

GUYRA PARAGUAY 2004. Lista comentada de las aves de Paraguay/Annotated checklist of the birds of Paraguay. Asunción, Paraguay, 200 páginas.

HAYES, F. E. 1995. Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay. American Birding Association, Monographs in Field Ornithology, Nº 1, 230 páginas.

LÓPEZ LANÚS, B. 1997. Inventario de las aves del Parque Nacional «Río Pilcomayo», Formosa, Argentina. Monografía LOLA, 4. Buenos Aires, 78 páginas.

MAZART BARNETT, J. y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de las aves argentinas. Lynx Edicions. Barcelona, 164 páginas.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324

Recibida: marzo 2003