



## NIDO DE CACHIRLA PÁLIDA (*Anthus hellmayri*) EN LA RESERVA NATURAL OTAMENDI, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Roberto Güller<sup>1</sup>, Hugo Di Santo<sup>2</sup> y Reginaldo Lejarraga<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Blanco Encalada 5.033, «5» B, (1.431) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: rmguller@uolsinectis.com.ar

<sup>2</sup>Yapeyú 2078, (1.650) San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: hugo.l.di.santo@bancogalicia.com.ar

<sup>3</sup>Fitz Roy 545, (8.000) Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: lejarraga@speedy.com.ar

Se conoce poco en cuanto a la distribución y distintos aspectos biológicos de las especies del género *Anthus* (Casañas, 1997). Sobre la cachirila pálida (*Anthus hellmayri*) en particular, existen menciones sobre nidadas pero no descripciones detalladas de nidos. Casañas (1997), menciona que el 25 de noviembre de 1990, en Pampa de Achala, provincia de Córdoba, De la Peña encontró un nido con tres pichones, sin aportar otros detalles. Narosky y Di Giacomo (1993) señalan a la especie como nidificante para la provincia de Buenos Aires en base a la observación de un adulto alimentando a un juvenil (Narosky, 1983). No se consiguió obtener otra información sobre nidificación de la especie en la bibliografía consultada, por lo tanto nuestra observación, sería la primera descripción con detalles de un nido.

El 24 de noviembre de 2002, en la Reserva Natural Otamendi (partido de Campana, provincia de Buenos Aires), en el sector de Río Luján (34°16'S 58°54'W), encontramos dos ejemplares de cachirila pálida posadas en un tamarisco (*Tamarix gallica*), ambos con alimento en el pico, tenían un nido oculto en el suelo, en la base de una mata de pelo de chancho (*Distichlis spicata*) que lo cubría a modo de techo. El nido tenía forma de taza y estaba construido con pajitas secas de pelo de chancho, por lo cual pasaba desapercibido. Las medidas del nido

eran: diámetro externo 8,5 cm, diámetro interno 7 cm, espesor 1,5 cm, profundidad 4 cm, y desde el borde superior al suelo había unos 6 cm. Contenía tres pichones cubiertos de plumón gris parduzco. Los picos eran gris rosado, con comisura amarilla y con interior anaranjado rojizo.

Sobre la base de nuestras observaciones Babarskas *et al.* (2003), incluye la especie como nidificante para la Reserva Natural Otamendi.

Agradecemos a Jorge Veiga y Hernán Casañas por la información brindada y a Alejandro Bodrati por alentarnos y colaborar como corrector.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BABARSKAS, M., E. HAENE y J. PEREIRA. 2003. Aves de la Reserva Natural Otamendi. En E. Haene y J. Pereira (editores), «Fauna de Otamendi»: 47-113. Temas de Naturaleza & Conservación, 3. Buenos Aires, 191 páginas.
- CASAÑAS, H. E. 1997. Sobre la presencia de la cachirila pálida (*Anthus hellmayri*) en la provincia de Córdoba, Argentina. El Hornero, 14: 270-273.
- NAROSKY, S. 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. El Hornero, 12: 122-126.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 127 páginas.

Recibida: mayo 2003

## NUEVOS REGISTROS DE ARAÑERO SILBÓN (*Basileuterus leucoblepharus*) EN EL DELTA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Emilse Mérida<sup>1</sup> y Alejandro Bodrati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Blanco Encalada 4.755, 5 B, (1.431) Buenos Aires. Correo electrónico: emilsemerida@hotmail.com

<sup>2</sup>Los Ceibos 1.695, (1.607) Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires. Correo electrónico: alebodrati@hotmail.com

El arañero silbón (*Basileuterus leucoblepharus*) en la Argentina habita los bosques húmedos de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, noreste de Santa Fe, este de Formosa y Chaco, y Buenos Ai-

res (Olrog, 1979; De la Peña, 1999). En la provincia de Buenos Aires la especie sólo cuenta con registros concretos para la Reserva Punta Lara (Montaldo *et al.*, 1987; Moschione, 1989; Narosky y Di Giacomo,