



➤ ARTICULOS

1993). Otros registros (Olrog, 1963, 1979) según se interpreta de Narosky y Di Giacomo (1993), y Montaldo *et al.* (1987) requieren confirmación debido a que el ejemplar de Olrog colectado en San Vicente y depositado en la colección del Instituto Miguel Lillo parece de origen dudoso según concluyen Montaldo *et al.* (1987), quienes revisaron el ejemplar y su etiqueta identificatoria.

El 18 de agosto de 1999, A. Bodrati escuchó un individuo a unos 200 metros de la costa del río Paraná de Las Palmas, en la segunda sección del Delta, en la margen opuesta a la Reserva Natural Estricta Otamendi. El ejemplar se movía en la parte inferior de un bosque cerrado de ribera donde predominaban especies exóticas como la ligustrina (*Ligustrum sinense*) y ligustro (*Ligustrum lucidum*), con especies de monte blanco como la anacahuita (*Blepharocalyx salicifolius*). Un segundo ejemplar contestó las voces del anterior individuo dentro de un ambiente similar. Dada su proximidad a la reserva Otamendi estos registros fueron considerados por Babarskas *et al.* (2003) como para ser incluidos en esa área protegida.

El 19 de abril de 2003, E. Mérida detectó la vocalización de un individuo a una distancia aproximada de cinco kilómetros al sudeste del Camping Cielo, por el camino vecinal hacia la localidad de Nueva Esperanza. El registro se realizó a media mañana, a una distancia aproximada de 400 metros del Río Carabelas, segunda sección del Delta, partido de San Fernando, dentro de una zona de densa vegetación de álamos (*Populus spp.*).

El mismo día, aproximadamente a las 16 E. Mérida observó otro ejemplar en el área del Camping Cielo,

a orillas del Río Carabelas, situado río de por medio frente al establecimiento Papel Prensa S.A.

El individuo fue observado con detenimiento mientras se movía a mediana altura entre la vegetación densa conformada por ligustrina, morena (*Morus alba*) y casuarinas (*Casuarina cunninghamiana*). Estos registros (aunque en bajo número) confirmarían la presencia regular del araño silbón en algunos sectores del Delta bonaerense.

Agradecemos a Enrique Hortiguerras y Raúl Ortega por su compañía en las salidas de campo.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BABARSKAS, M., E. HAENE y J. PEREIRA. 2003. Aves de la Reserva Natural Otamendi. En E. Haene y J. Pereira (editores), «Fauna de Otamendi»: 47-113. Temas de Naturaleza & Conservación, 3. Buenos Aires, 191 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves Argentinas. Lista y distribución. LOLA. Buenos Aires, 195 páginas.
- MONTALDO, N. H., A. A. CHIAPPE y G. G. ROITMAN. 1987. *Basileuterus leucoblepharus* (Vieillot) en Buenos Aires. Registro en Punta Lara y comentarios sobre su presencia en la provincia. Historia Natural, 7: 1-3.
- MOSCHIONE, F. N. 1989. Nuevas aves para la Reserva de Punta Lara. Garganchillo, 10: 7-11.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 127 páginas.
- OLROG, C. C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Opera Lilloana, 9: 1-377.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324. páginas.

Recibida: mayo 2003.

Revista Nuestras Aves, 48:13-14

## NUEVAS OBSERVACIONES DE AVES PARA COMODORO RIVADAVIA Y ALREDEDORES, CHUBUT, ARGENTINA

Graciela Escudero<sup>1</sup>, Daniel Vaquero<sup>2</sup>, Hernán Marraco<sup>3</sup> y M. Gabriela Murga<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Asociación Patagónica de Ornitología, Esquel 2.283, Comodoro Rivadavia, (9.000) Chubut, Argentina.

<sup>2</sup>Perito Moreno 775, (9.001) Rada Tilly, Chubut, Argentina.

<sup>3</sup>Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco Km 4, (9.000) Comodoro Rivadavia. Chubut, Argentina. Correo electrónico: graesc@sinectis.com.ar

La presente nota tiene por objeto aportar nuevos datos sobre la distribución de las aves en el área cercana a las ciudades de Comodoro Rivadavia (45°56'S 67°33'W) y Rada Tilly (45°62'S 67°31'W).

#### Pingüino rey (*Aptenodytes patagonicus*)

Se encontró un individuo en noviembre de 1993

en la playa del límite entre las provincias del Chubut y Santa Cruz. El ejemplar estaba mudando y se hallaba muy delgado. H. Marraco lo alimentó en cautiverio y al cabo de dos semanas aumentó de peso y fue liberado. Con el fin de documentar el registro se obtuvieron fotografías. La especie efectúa su reproducción a fines de la primavera y durante el verano



austral (Del Hoyo *et al.*, 1992), pero es de esperar que los ejemplares aislados de pingüinos rey que llegan ocasionalmente a las costas patagónicas lo hagan fuera de la época de procreación (Canevari *et al.*, 1991; De la Peña, 1999), lo cual hace interesante el registro. Las colonias reproductivas más cercanas corresponden a las islas Malvinas (J.C. Chebez, com. pers.).

#### Albatros real (*Diomedea epomophora*)

Un individuo subadulto fue observado y fotografiado el 22 de marzo de 1997 desde un barco pesquero a 10 km de la costa a la latitud de Comodoro Rivadavia. Como dato adicional los pescadores lo reconocieron como una especie habitual en el área. Nidifica en Nueva Zelanda y se lo puede observar en el mar continental argentino (Clark, 1986; Canevari *et al.*, 1991; Rodríguez Moulin, 2001).

#### Pardela cabeza negra (*Puffinus gravis*)

El 22 de marzo de 1997 se observó y fotografió un individuo desde un barco pesquero al cual seguía, a 10 km de la costa a la latitud de Comodoro Rivadavia. La observación se efectuó junto a la especie anterior.

#### Tero-real (*Himantopus melanurus*)

El 14 de septiembre de 2002 fueron observados dos ejemplares en la laguna de Rada Tilly. Descansaban entre playeritos rabadillas blancas (*Calidris fuscicollis*) y gallaretas chicas (*Fulica leucoptera*). Su distribución conocida está considerada hasta Santa Cruz (Chebez *et al.*, 1998) con registros anteriores hasta el norte de la provincia de Chubut (Canevari *et al.*, 1991; De la Peña, 1999). El presente registro reconfirma su presencia al sur de su distribución meridional.

#### Playero ala blanca (*Catoptrophorus semipalmatus*)

Se observó un individuo en enero de 1998 el cual descansaba en el puerto de Comodoro junto a un grupo de ostreros australes (*Haematopus leucopodus*). En la Playa 99 de Comodoro Rivadavia desde noviembre del 2000 hasta el 25 de febrero de 2001 fue fotografiado un ejemplar observado durante todo el verano (se presume que era el mismo individuo). Este migrador neártico hasta la fecha había sido citado en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Tierra del Fuego (Canevari *et al.*, 1991; De la Peña, 1999).

Agradecemos a Kees Camphuysen por la ayuda en la identificación del albatros, Pim Edelaar, Daniel Blanco y Mónica Abril por sus comentarios varios.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía LOLA, 12. Buenos Aires, 126 páginas.
- CLARK, R. 1986. Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Guía de campo. LOLA. Buenos Aires, 294 páginas.
- DEL HOYO, J. A. ELLIOTT, y J. SARGATAL (eds.). 1992. Handbook of the birds of the world. Vol. 1, Lynx Editions. Barcelona, 696 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves Argentinas. Lista y RODRÍGUEZ MOULÍN, H. 2001. Hallazgo en Chubut (Argentina) de un albatros real (*Diomedea epomophora*) anillado en Nueva Zelanda. Nuestras Aves, 41: 31-32.

Recibida: junio 2003

## NOTAS SOBRE LA AVIFAUNA EN LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CATAMARCA, ARGENTINA

Carlos Ferrari<sup>1</sup>, Roberto Güller<sup>2</sup>, Patricia Rodríguez Elías<sup>2</sup> y Silvia Vitale<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Matheu 2.151 piso 1º B, (1.249) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: ferraricls@sinectis.com.ar.

<sup>2</sup>Blanco Encalada 5.033, «5» B, (1.431) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: rmguller@uolsinectis.com.ar

En febrero de 2003 realizamos prospecciones ornitológicas en las provincias de Santiago del Estero y Catamarca. En Santiago del Estero se recorrió la llanura chaqueña y las Sierras de Guasayán -con

chaco serrano y relictos de las selvas del noroeste (o yungas)-.

En Catamarca visitamos las faldeos de las Sierras de Graciana y de Ambato-Manchao, que presentan