BIBLIOGRAFÍA CITADA

BELTON, W. 1984. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil - Part 1. Rheidae through Furnariidae. Bull. American Museum of Natural History, 178 (4): 369-636.

CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.

DE LA PEÑA, M. R. 1992. Guía de las aves argentinas. Tomo II. Segunda edición. LOLA., Buenos Aires, 166 páginas.

DOUGLAS, H. D. III. 1998. Response of Eastern Willets (*Catoptrophorus s. semipalmatus*) to vocalizations of Western Willets (*C. s. inornatus*). The Auk, 115 (2): 514–518.

GAMBAROTTA, E. A. , J. GRAVINO y A. BARCA. 1987. Una nueva especie de ave para Uruguay: el Playero Aliblanco. Nuestras Aves, 14: 9–10.

HAYMAN, P., J. MARCHANT y T. PRATER. 1986. Shorebirds. An indentification guide to the waders of the world. Croom Helm. London, 412 paginas.

JARAMILLO, A. P. 2000. Punta Rasa, South America's first vagrant trap? Cotinga, 14: 33–38.

JOHNSGARD, P. 1981. The Plovers, Sandpipers and Snipes of the World. University of Nebraska Press, Lincoln. 493 páginas.

MARÍN, M. 1999. Distribución y situación del playero grande de alas blancas (*Catoptrophorus semipalmatus*) en Chile. Boletín Chileno de Ornitología, 6: 29–30.

NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 127 páginas.

ROBBINS, C. S. , B. BRUUN, y H. ZIM. 1983. Birds of North America. Golden Press. New York. 340 páginas.

SIBLEY, D. A. 2000. The Sibley guide to birds. National Audubon Society. A. A. Knopf. 543 páginas.

Recibida: septiembre 2003

Revista Nuestras Aves, 48:25-31

NUEVOS APORTES AL CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN Y ANIDACIÓN DE ALGUNAS ESPECIES DE AVES EN LA ARGENTINA

Pablo F. Petracci[1], Kaspar J. V. Delhey, Cristian H. F. Pérez, Diego Basanta, María Victoria Massola, Martín Zamorano y Mauro Fosatti.

[1]Patricios 712, (8.000) Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: ppetracci@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Pingüino rey *(Aptenodytes patagonicus)*

El 30 marzo de 1991 fue hallado un ejemplar juvenil en cercanía a La Lobería (41°12'02,2'' S, 63°11'32,2''W), ubicada al norte del litoral marino de la provincia de Río Negro. El 25 de enero de 1999 en el sector conocido como punta Mejillón, misma provincia, fue encontrado un ejemplar adulto en buen estado y sin rastros de petróleo en el plumaje. Ambos registros fueron documentados con fotografías. Si bien podría tratarse de individuos errantes, Narosky e Yzurieta (1987) indican que la especie llegaría hasta la provincia de Buenos Aires en su distribución pelágica invernal. Bachmann (1999) la registró en noviembre de 1992 para Miramar y Narosky y Di Giacomo (1993) dan varios registros para la costa de la provincia de Buenos Aires. Según Daciuk (1976) suelen encontrarse en las costas de Chubut y Santa Cruz como migratorios accidentales. Nuestros registros resultan interesantes no sólo por su cercanía con la costa bonaerense, sino también porque hacen un aporte a la discusión sobre los movimientos post-reproductivos de la especie.

Prion pico grande (*Pachyptila desolata*)

El 9 de abril de 1993 se encontró un ejemplar muerto en un sector de playa comprendido entre los balnearios Reta y Claromecó, partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. A pesar del deterioro del plumaje, el ancho del pico (1,5 cm) permitió separarlo fácilmente de la especie afín *Pachyptila belcheri*, de pico más delgado (1 cm) (Harrison 1987; Narosky e Yzurieta, 1987). El cráneo se encuentra depositado temporalmente en la colección de P. F. Petracci. Junto a esta especie también se hallaron ejemplares muertos de *Thalassarche melanophris*, *Procellaria aequinoctialis* y *Puffinus gravis*, seguramente arrojados a la costa por un temporal en los días anteriores.

Pachyptila desolata es citado por Harrison (1987) y Narosky y Di Giacomo (1993) para mar abierto a la latitud de la provincia de Buenos Aires. También cuenta con un sólo registro para las costas uruguayas (Achával, 1971). La especie no es incluida en la lista de aves pelágicas halladas en Costa Bonita, partido de Necochea, en Narosky y Fiameni (1986). La cita más concreta la aportan Isacch y Bachmann (1997) quienes encontraron un ejemplar en la localidad de Miramar, constituyendo el primer registro documentado de esta especie para el litoral bonaerense.

TABLA 1 - Medidas corporales de los tres ejemplares de pardela grande

Nro. de ejemplar	Cúlmen (mm)	Ancho pico (mm)	Cabeza + Pico (mm)	Largo primarias (cm)	Envergadura alar (cm)	Largo total (cm)
1-3/5/98	58	22,6	116,5	26,5	129	56
2-3/5/98	62,5	26,4	123,1	33	123	56
3-3/5/98	56	23,7	116,1	35	123	53

Pardela grande ***(Calonectris diomedea)***

El 3 de mayo de 1998 mientras se realizaba una recorrida de aproximadamente 40 km por la playa ubicada entre la desembocadura del río Sauce Grande y la localidad de Pehuén-Có (39°01'03,9''S, 61°31'31,9''W), provincia de Buenos Aires, fueron hallados muertos tres ejemplares adultos. Uno de ellos fue taxidermizado y se encuentra depositado temporalmente en la colección de P. F. Petracci con el número de repositorio 2-3/5/98. De los tres ejemplares hallados se tomaron medidas corporales **(TABLA 1)**

Los tres individuos fueron hallados luego de una fuerte sudestada junto a las siguientes especies: *Spheniscus magellanicus, Thalassarche melanophris, Puffinus gravis, Puffinus puffinus, Stercorarius* sp. y *Sterna* sp. Según Olrog (1979) y Harrison (1987) se trataría de una especie «regular» para los meses de enero-marzo cerca de las costas de Brasil, Uruguay y Buenos Aires. Narosky y Di Giacomo (1993) la mencionan como «probablemente ocasional», con sólo dos registros en la costa bonaerense para las localidades de San Clemente del Tuyú (Narosky, 1971) y Pinamar (N. Rey en Narosky y Di Giacomo, 1993).

Jote cabeza negra ***(Coragyps atratus)***

El 28 de septiembre de 2001 fue hallado un nido activo emplazado en una viejo remolcador abandonado en el estuario de Bahía Blanca, proximidades al puesto del Club Náutico Bahía Blanca. Los registros previos de anidación de la especie en la provincia de Buenos Aires corresponden a Belenguer y Zalba (1997) quienes documentan el hallazgo de dos nidos, uno para la localidad de Pehuén-Có, partido de Coronel Rosales, y otro para Monte Hermoso, partido homónimo. Otros dos nidos fueron encontrados en las instalaciones del exvivero forestal von Humboldt, ubicado a orillas de la laguna Chasicó (38°35'S, 64°45'W), partido de Villarino, provincia de Buenos Aires. Se encontraban ubicados dentro de un tanque de agua abandonado. Otros registros previos de anidación para esta especie en esta misma localidad corresponden a Zapata (2002) quien encontró en 1967, 1968 y 1996 tres nidos activos en diferentes estadios.

El 27 de julio de 1999 se halló un nido activo a orillas del salitral de la Gotera (39° 02'S, 66°35'W), departamento Caleu Caleu, provincia de La Pampa, en un puesto abandonado debajo de en una arboleda de eucaliptos (*Eucalyptus* sp.). Se comprobó la postura de dos huevos. Brown y Amadon (1968) proponen que en la Argentina esta especie se reproduciría entre los meses de octubre y noviembre. Belenguer y Zalba (1997) hallaron un nido con pichones el cual estimaron había sido construido en septiembre. Esta sería la primera cita concreta de reproducción invernal para la especie.

Pato fierro ***(Nomonyx dominicus)***

El 13 de septiembre y 3 de noviembre de 1999 se observaron uno y ocho individuos respectivamente en la laguna Los Patos (34°50'S, 57°57'W), partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires. El sitio es una antigua cantera inundada de formato cuadrangular de unas 20 ha de superficie, 1.5 m de profundidad máxima y con juncales periféricos de *Schoenoplectus californicus* como vegetación dominante. Narosky y Di Giacomo (1993) definen a esta especie de pato como «residente probable y raro de observar» en la provincia de Buenos Aires.

Caracolero ***(Rostrhamus sociabilis)***

Esta especie habita diversos ambientes acuáticos del norte y este de la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993). Su presencia está condicionada principalmente a la disponibilidad de caracoles del género *Pomacea*, de los cuales se alimenta casi con exclusividad (Brown y Amadon, 1968). Si bien el límite de distribución sur de la *Pomacea canaliculata* en la provincia de Buenos Aires se aproxima a la localidad de Bahía Blanca (Martín *et al.*, 2001), el caracolero había sido registrado sólo hasta el partido de Tres Arroyos. Recientemente Carrizo *et al.* (2001) lo citan en diciembre de 1998 para la laguna Los Chilenos, partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires. El 9 de octubre de 1991 y

el 2 de enero de 1994, en la misma laguna pero en un sector que corresponde al partido de Tornquist, observamos varios individuos. En ambas oportunidades fueron muy comunes durante casi todo el día mientras se alimentaban de caracoles en los juncales ribereños. Queda aún por evaluar si la especie se reproduce en el área, lo cual podría darse a juzgar por las características del hábitat.

Asimismo, debido a la introducción exitosa de *Pomacea canaliculata* en el dique Paso de las Piedras (38°26'43,4''S, 61°39'54,9''W), partido de Coronel Pringles, fue observado un individuo (fecha sin precisar).

Gavilán mixto (*Parabuteo unicintus*)

Observado en zonas aledañas a la laguna Chasicó, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires, en las siguientes oportunidades (número de individuos indicados entre paréntesis) 9 de agosto de 1997 (4), 26 de septiembre de 1997 (1), 11 de octubre de 1997 (2), 28 de marzo de 1998 (1), 26 de abril de 1998 (1), 20 y 30 de mayo de 1998 (2), 17 de junio de 1998 (una pareja), 15 y 24 de agosto de 1998 (1), 14 de septiembre de 1998 (1) y 28 de octubre de 1998 (1). Según Narosky y Di Giacomo (1993) y Darrieu y Camperi (2001) cuenta con escasos registros para el sur de la provincia de Buenos Aires. Existen algunas citas previas para el área (Zapata, 1998), quien la categoriza como rara.

La frecuencia con la que se observó la especie, con fechas que abarcan casi la totalidad del año, indicaría que para la zona de Chasicó es residente, lo cual coincide con lo propuesto por Zapata (1998).

Taguató común (*Buteo magnirostris*)

Observado el 6 de junio de 1993 posado sobre un poste de teléfono a orillas del arroyo del Loro en la localidad de Sierra de la Ventana (38°08'S, 61°47'W), partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires. El 21 septiembre de 1996 se halló un individuo posado sobre un poste de alambrado a orillas del río Sauce Grande, partido de Monte Hermoso (38º59'S, 61º17'W), provincia de Buenos Aires.

Según Narosky y Di Giacomo (1993) es una especie escasa en el sur de la provincia de Buenos Aires y no es mencionada por Bó y Darrieu (1991) para la zona de Monte Hermoso. Zapata (1997) la cita como visitante estival pero rara de observar en la laguna Chasicó. Existen algunos registros previos para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires en los partidos de Tornquist, Villarino y Bahía Blanca (Delhey y Carrete, 1999). La especie ha sido registrada en localidades aún más australes, pudiéndose mencionar la cita de Hartert y Venturi (1909) quienes informaron acerca de un macho adulto coleccionado en General Roca, provincia de Río Negro, material que fue examinado posteriormente por Bridge (Humphrey y Bridge, 1970). Según Olrog (1979) la subespecie *B. m. pucherani* llegaría en su distribución sur como «ocasional» hasta la provincia de Río Negro. Babarskas *et al.* (1996) citan a esta especie como anidante en la provincia de Neuquén.

Pollona azul (*Porphyrio martinicus*)

El 2 de diciembre de 2001 fue observado un ejemplar adulto en la laguna Los Patos (34°50'S, 57°57'W), partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros del casco urbano de la ciudad de La Plata (en un área con gran afluencia de público). El sitio es una cantera inundada de formato rectangular (20 ha), la cual debido a su escasa profundidad presenta abundante vegetación acuática arraigada (principalmente *Schoenoplectus californicus*) y flotante (*Pistia stratiotes* como dominante). Esta pollona no es mencionada por Darrieu y Camperi (2001) y es considerada rara para la provincia de Buenos Aires por Narosky y Di Giacomo (1993). Recientemente fue citada para la localidad de Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires (Bodrati *et al.*, 2001).

Pollona negra (*Gallinula chloropus*)

El 2 de enero de 1994 se observó un individuo con pichones en la laguna Los Chilenos, partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires. El ambiente era similar al de las lagunas pampásicas de la depresión del río Salado con formato tipo «sartén» y vegetación palustre en las orillas. No existen registros sobre la presencia de la especie para el extremo sur de la Provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Pollona pintada (*Gallinula melanops*)

El 22 y 23 de octubre de 1991 se observó un adulto en el dique Paso de las Piedras (38°26'43,4''S, 61°39'54,9''W), partido de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, en el sector del embalse cercano al arroyo El Divisorio (38°25'56''S, 61°39'02,8''W). Con posterioridad (fecha sin precisar) se observó un individuo en el arroyo Chasicó, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires. Este registro fue documentado con una fotografía. Según los datos aportados por Narosky y Di Giacomo (1993) la especie habita toda la provincia de Buenos Aires,

exceptuando su extremo sur. Para Darrieu y Camperi (2001) la especie cuenta con escasos registros al sur de la provincia. Zapata (1998) hace mención de esta especie como «escasa y visitante estival» en la zona de la laguna Chasicó, donde inclusive fue hallada nidificando para mediados de febrero de 1968. Las citas más australes para el país corresponden a Contreras (1977) quien observó a esta especie en el valle del río Collón Curá, provincia de Neuquén. Chebez *et al.* (1993) también la halló en Neuquén en un arroyo cercano a localidad de Las Lajas. Recientemente fue mencionada como una especie común de observar en el tramo medio e inferior del río Neuquén (Acerbo, 2000). Es probable que esta pollona en el futuro sea hallada en otras localidades aún más australes tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Patagonia septentrional.

Chorlito cabezón (*Oreopholus ruficollis*)

El 4 de febrero de 1996 fueron observados y fotografiados varios individuos con pichones volantones en cercanías al lago Burmeister, Parque Nacional Perito Moreno, provincia de Santa Cruz. La zona presentaba una vegetación muy baja con características de estepa, donde había ejemplares achaparrados del género *Nothofagus*. El 1 de diciembre de 2001 fueron observados durante la noche tres adultos con pichones en la ruta provincial 180 a la altura de la altiplanicie La Payunia, 102 km al sur de El Nihuil, provincia de Mendoza. Esta información constituye un aporte importante al conocimiento de las áreas de cría de esta especie dada la escasa información disponible.

Playero trinador *(Numenius phaeopus)*

El 8 de octubre de 2000 fueron observados siete individuos en un cangrejal de la isla Bermejo (39°01'03,9''S, 62°00'23,5''W), ubicada en el estuario de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La especie cuenta con escasos registros para la Argentina (Narosky y Yzurieta, 1987) y en la provincia de Buenos Aires es considerada como rara (Narosky y Di Giacomo, 1993). A pesar de ser registrada con cierta regularidad en la zona de Punta Rasa (Narosky y Yzurieta, 1987) otros estudios en la región (Belenguer *et al.*, 1992, Delhey *et al.*, 2001) no hacen mención de la misma.

Batitú (*Bartramia longicauda*)

Observada una bandada en vuelo de 12 individuos el 21 de diciembre de 2002 sobre la ruta nacional 3 a la altura del km 585 (a unos 95 km de Tres Arroyos). Esta especie característica de la zona pampeana es considerado como «vulnerable» (Narosky y Di Giacomo, 1993) y actualmente se lo encuentra en bajos números poblacionales. La especie cuenta con algunos registros recientes para las localidades de Bajo Hondo y Cabildo (Delhey *et al.*, 2001).

Playerito zancudo (*Micropalama himantopus*)

El 3 de marzo de 2002 fueron observados dos individuos en una laguna salobre ubicada en el partido de Monte Hermoso (38°59'S, 61°17'W), provincia de Buenos Aires. Esta laguna forma parte de las lagunas del Sauce Grande. Los dos individuos se hallaron junto a *Tringa flavipes*, *Phalaropus tricolor*, *Calidris fuscicollis* e *Himantopus melanurus*. Se obtuvieron fotografías. La especie no es mencionada por Bó y Darrieu (1991) para la zona de Monte Hermoso y fue recientemente citada por Delhey *et al.* (2001) en cercanías de la localidad de Claromecó y para la zona de la laguna Chasicó en el sur de la provincia de Buenos Aires. Resulta llamativo que la especie fuera observada en asociación con la mismas especies de Charadriiformes mencionadas por Delhey *et al.* (2001) y Di Giacomo *et al.* (2001).

Palomita cordillerana *(Metropelia melanoptera)*

El 3 de febrero de 2003 se observaron en el suelo diferentes grupos de cuatro, tres y dos individuos a 20 km al norte de la localidad de El Molle, Sierras de Calcatapul, provincia de Chubut, sobre la ruta provincial 13. Los individuos levantaban vuelo a medida que se avanzaba sobre el camino.

Martín pescador mediano (*Chloroceryle amazona*)

El 6 y 7 de junio de 1992 observado un individuo en un sector del arroyo Del Loro, el cual atraviesa la localidad de Villa Ventana (38°04'06,0''S, 61°54'41,5''W), partido de Tornquist. La especie cuenta con escasos registros en el sur de la provincia de Buenos Aires. La cita más cercana corresponde a la localidad de Saldungaray, partido homónimo, donde fue registrada por Marelli (1933).

Curutié ocráceo (*Cranioleuca sulphurifera*)

El 31 de enero de 1991 fue observado un individuo en un juncal de *Schoenoplectus californicus* ubicado en la margen sur del río Sauce Grande (38°59'S, 61°17'W), partido de Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires. La cita más austral de la especie para la provincia de Buenos Aires corresponde a Hudson (1872) quien la menciona para el río Negro, partido

de Patagones. Bó y Darrieu (1991) no hacen ninguna referencia para la zona de Monte Hermoso y según Narosky y Di Giacomo (1993) es escasa en la provincia de Buenos Aires. Recientemente fueron observados tres ejemplares en la ribera del río Colorado, departamento Caleu-Caleu en la provincia de La Pampa (Tittarelli, 2002).

Fiofío pico corto (*Elaenia parvirostris*)

Esta especie fue observada en reiteradas ocasiones en diferentes zonas residenciales de la localidad de Monte Hermoso (38°59'S, 61°17'W), provincia de Buenos Aires. Los registros se hicieron el 31 de enero del 2001 donde se hallaron tres individuos, el 1 de febrero del 2001 con dos individuos sobre un pino (*Pinus* sp.) y el 2 de febrero de 2001 donde se hallaron tres ejemplares. En la primera y última fecha se registraron forrajeando frutos maduros de lantana (*Lantana* sp.), verbenácea exótica muy común en los jardines de esta localidad.

Durante los meses de enero y febrero de 2002 se observaron y escucharon a diario. El 3 de marzo de 2002 se colectó un ejemplar muerto, el cual fue taxidermizado y se encuentra depositado en la colección de P. F. Petracci. Asimismo se cuenta con registros de grabación, los cuales fueron utilizados como herramienta auxiliar para la confirmación de las observaciones mediante *playback*. Se lo halló de nuevo el 9 de febrero de 2003, también forrajeando los frutos de una lantana. Para Narosky y Di Giacomo (1993) es un visitante estival de bosques, selvas y arboledas del este de la provincia de Buenos Aires , siendo el registro más cercano el partido de Tres Arroyos.

Según la información disponible hasta el momento este fiofío estaría ampliando su rango sur de distribución utilizando la vegetación arbórea cada vez más abundante de las localidades balnearias del litoral bonaerense.

Diucón (*Xolmis pyrope*)

El 8 y 27 de junio de 1993 se observó un ejemplar en un barrio residencial en cercanías de la ciudad de Bahía Blanca (38°41'37,1''S, 62°12'53,8''W), partido homónimo, provincia de Buenos Aires. Erize *et al.* (1981) la mencionan como visitante invernal para el Parque Nacional Lihué Calel, provincia de La Pampa. No se conocen otros registros extracordilleranos ya que la distribución conocida se extiende desde la provincia de Neuquén hasta Tierra del Fuego a lo largo de la cordillera de los Andes (Narosky e Yzurieta, 1987; Canevari *et al.*, 1991). No está incluida en Narosky y Di Giacomo (1993) ni en Darrieu y Camperi (2001). Se trataría del registro más oriental en su distribución y la primera cita para la provincia de Buenos Aires.

Golondrina rabadilla canela (*Petrochelidon pyrrhonota*)

El 1 de febrero de 2001 se observó un individuo junto a una pequeña bandada de golondrina parda grande (*Phaeoprogne tapera*) en la desembocadura del río Sauce Grande (38°59'S, 61°17'W), partido de Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires. El 3 de marzo de 2002 en una laguna cercana al río Sauce Grande fueron observados a corta distancia y fotografiados dos individuos hallados junto a una bandada de golondrina ceja blanca (*Tachycineta leucorrhoa*). A pesar de que es mencionada como visitante estival y común de observar para Monte Hermoso (Bó y Darrieu, 1991), cuenta con escasos registros para el extremo sur-sureste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*)

El estornino pinto, especie introducida recientemente en la Argentina en la actualidad se distribuye por el nor-noreste de la provincia de Buenos Aires. Básicamente se la observa en ambientes urbanos o periurbanos, formando grupos durante la temporada no reproductiva o de forma aislada durante su reproducción (Zamorano *et al.*, 2002).

En agosto de 2003 se observó un grupo de cuatro individuos sobre un cable telefónico en el camino vecinal que corre paralelo al arroyo Zapata, entre la ruta provincial No. 11 y la ribera del Río de La Plata, partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires.

Zamorano *et al.* (2002) cita a la especie nidificando en números importantes en la zona del partido de La Plata. Este nuevo registro en el arroyo Zapata, distante a escasos kilómetros del núcleo urbano de La Plata, se destaca por ser una de las primeras citas de estorninos pintos en un ambiente agrícola ganadero típico.

Comesebo andino (*Phrygilus gayi*)

El 11 de abril de 1994 se observó un macho en laguna Seca, cercanías a la localidad de Chimpay (39°10'S, 66°12'W), departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro. Fue observado mientras se encontraba posado en una isleta de chañar (*Geoffroea decorticans*) y luego en la costa de la laguna hacia donde voló para tomar agua. La formación vegetal corresponde a la provincia fitogeográfica del monte (Cabrera, 1971). El 15 de agosto de 1994 se halló una

hembra al costado de un camino vecinal de la localidad de Chimpay, también con vegetación circundante tipo monte.

Cachilo canela *(Donacospiza albifrons)*

El 24 de septiembre de 1991 se observaron dos ejemplares en los alrededores de la laguna Sauce Grande (38°59'S, 61°17'W), partido de Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires. El 24 de septiembre de 1997 se registraron dos ejemplares en lagunas del río Sauce Grande, partido homónimo. Los individuos vocalizaban desde los extremos de las hojas de una mata de hunco negro (*Juncus acutus*), especie vegetal dominante en los márgenes de las lagunas. Bó y Darrieu (1991) no la mencionan para el partido de Monte Hermoso. Narosky y Di Giacomo (1993) y Darrieu y Camperi (2001) no lo mencionan para el sur de la provincia de Buenos Aires.

Loica pampeana *(Sturnella defilippii)*

El 10 de agosto de 1992 se observaron 300 individuos cerca de Puente Caneza (38°34' 32,2"S, 62°04'24"W), a unos 25 km al noreste de la ciudad de Bahía Blanca, en la ruta Carrindanga. El 7 de noviembre 1992, 10 individuos sobre la ruta No. 35 a la altura del paraje Nueva Roma (38° 31'01,9"S, 62°36'58"W). El 12 de febrero y 4 de abril de 1993 se registraron aproximadamente 400 individuos en la ruta 51 a unos 40 km de Bahía Blanca y tres individuos en la ruta Carrindanga a 30 km de Bahía Blanca. El 2 de mayo de 1999 se observaron 60 individuos en el camino vecinal Camino de la Hormiga (38°33'01,4''S, 62°24'08,4''W), en potreros con pastura natural.

Según los resultados de Tubaro y Gabelli (1999) estas localidades se encuentran dentro del actual límite sur de distribución de la especie en la provincia de Buenos Aires. En general los ambientes donde fueron registrados son pasturas naturales de fisonomía tipo «tussock». Los registros de bandadas de 300 y hasta 400 ejemplares no tiene antecedentes previos, ya que los mayores grupos registrados hasta el momento no superan los 173 individuos. Estas observaciones apoyan el supuesto de que durante la finalización de la temporada reproductiva los individuos se congregan en grandes bandadas o grupos no reproductivos (Tubaro y Gabelli, 1999). Con estos datos se aporta más conocimiento para este ictérido amenazado de extinción.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

ACERBO, P. E. 2000. Aves del Río Neuquén. AIC, Neuquén.

ACHÁVAL, F. 1971. Nueva localidad geográfica para *Pachyptila desolata banksi*. El Hornero, 11: 125.

BABARSKAS, M., J. O. VEIGA y F. C. FILIBERTO. 1996. Nuevos registros de aves para la provincia de Neuquén. Nuestras Aves, 34: 44-46.

BACHMANN, S. 1999. Pingüino de Barbijo (*Pygoscelis antarctica*) y Pingüino Rey (*Aptenodytes patagonicus*) en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves, 40:8.

BELENGUER, C., K. J. V. ELHEY, S. DI MARTINO, P. F. PETRACCI y A. SCOROLLI. 1992. Observaciones de aves playeras migratorias de Bahía Blanca. Boletín Informativo Grupo Argentino de Limícolas, 10.

BELENGUER, C. y S. M. ZALBA. 1997. Primera cita de nidificación del Jote de Cabeza Negra (*Coragyps atratus*) para Buenos Aires. El Hornero, 14: 247-248.

BÓ, N. A. y C. A. DARRIEU. 1991. Ornitocenosis de un sector de la zona de dunas costeras de la provincia de Buenos Aires. En: Situación ambiental de la provincia de Buenos Aires, A: Recursos y rasgos naturales en la evaluación ambiental, 1 (2).

BODRATI, A. , G. BODRATI y H. FERNÁNDEZ. 2001. Notas sobre la avifauna del norte de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves, 41:17-21.

BROWN, L. y D. AMADON. 1968. Eagles, hawks and falcons of the world. McGraw–Hill, New York, 945 páginas.

CABRERA, A. L. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 14 (1-2): 1-42 + 8 láminas.

CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA Y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.

CARRIZO, M. A., P. A. SEEWALD y F.R. TIZÓN. 2001. Notas sobre la avifauna del partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves, 42: 31.

CHEBEZ, J. C., S. HEINONEN FORTABAT, J. VEIGA, M. BABARSKAS y F. FILIBERTO. 1993. Novedades ornitogeográficas argentinas IV. Nótulas Faunísticas, 38.

CONTRERAS, J. R. 1977. La avifauna del valle del río Collón Cura, Provincia de Neuquén. IDIA, suplemento, 34: 250-270.

DACIUK, J. 1976. Notas faunísticas y bioecológicas de la Península Valdés y Patagonia. 19. Pingüinos que nidifican y arriban en sus migraciones a las costas de Santa Cruz e Islas Malvinas (Aves, Spheniscidae). Neotrópica, 22: 87-92.

DARRIEU, C. A. y A. R. CAMPERI. 2001. Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires. . Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. COBIOBO y PROBIOTA. La Plata, 53 páginas.

DELHEY, J. K. V. y M. CARRETE. 1999. Aves nuevas o poco conocidas para el extremo sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves, 40: 11-12.

DELHEY, J. K. V., P. F. PETRACCI y C. H. F. PÉREZ. 2001. Observaciones de Charadriiformes en el sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves, 42: 14-16.

DI GIACOMO, A G., A. S. DI GIACOMO y C. A. MARCHISIO. 2001. Nuevos registros de aves para el centro de la Argentina. Nuestras Aves, 42: 18-20.

ERIZE F., M. CANEVARI, P. CANEVARI, G. COSTA y M. RUMBOLL. 1981. Los Parques Nacionales de la Argentina y otras de sus áreas naturales. INCAFO. Madrid.

HARRISON, P. 1987. Seabirds of the World: a Photographic Guide. Christopher Helm. London.

HARTERT, E. y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. Novit. Zool., 16: 159-267.

HUDSON, W. H. 1872. On the Birds of the Rio Negro of Patagonia. With notes by P.L. Sclater. Proc. Zool. Soc. London 1872: 534-550.

HUMPHREY, P.S. y D. BRIDGE. 1970. Apuntes sobre distribución de aves en la Tierra del Fuego y la Patagonia Argentina. Rev. Mus. Arg. de Cs. Nat. «Bernardino Rivadavia», 10 (17): 251-265.
ISACCH, J. P. y S. BACHMANN. 1997. Hallazgo del Prión Pico Ancho (*Pachyptila desolata*) en la Provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 37: 1.
MARELLI, C. A. 1933. Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hornero 5: 193-199.
MARTIN, P. R., A. L. ESTEBENET y N. J. CAZZANIGA. 2001. Factors affecting the distribution of *Pomacea canaliculata* (Gastropoda: Ampullariidae) along its southernmost natural limit. Malacologia, 43: 13-23.
NAROSKY, T. 1971. Dos hallazgos interesantes para la avifauna Argentina. *Puffinus diomedea* y *Chlidonias niger*. El Hornero, 11: 129-130.
NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la Provincia de Buenos Aires. distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 127 páginas.
NAROSKY, S. y M. A. FIAMENI. 1986. Aves pelágicas en Costa Bonita, Buenos Aires, Argentina. El Hornero, 12: 281-285.
NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.
TITTARELLI, F. 2002. Aves de la ribera del río Colorado en la Pampa, una nueva cita para la provincia y dos especies poco comunes. Nuestras Aves, 44: 9.
TUBARO, P. L. y F. M. GABELLI. 1999. The decline of the Pampas Meadowlark: difficulties of applying the UICN criteria to Neotropical grassland bird. Studies in Avian Biology, 19: 250 - 257.
ZAMORANO, M., G. DANIELE, G. AGUERRE y P. F. PETRACCI. 2002. Descripción del ambiente utilizado por el Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en la zona del Partido de La Plata. Primeras Jornadas de Cs. Nat. de la Univ. de Luján. Informe inédito.
ZAPATA, A. R. P. 1998. Aves registradas en la región de la laguna Chasicó, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Natura Neotropicalis, 29: 156-161.
ZAPATA, A. R. P. 2002. Nueva cita sobre la nidificación y crías del Jote de Cabeza Negra (*Coragyps atratus*) para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves, 44: 14-15.

Recibida: noviembre 2003.

Revista Nuestras Aves, 48:31-33

PRESENCIA INVERNAL DE JUVENILES DE CARACOLERO (*Rostrhamus sociabilis*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pablo F. Petracci[1], Martín Zamorano[1] y Diego Basanta[2]

[1]Cátedra de Zoología III, Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, (1.900) La Plata, Buenos Aires, Argentina
[2] Unidad de Didáctica, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, (1.900) La Plata, Buenos Aires, Argentina
Correo electrónico: ppetracci@museo.fcnym.unlp.edu.ar

El caracolero (*Rostrhamus sociabilis*) es una especie que frecuenta diversos ambientes acuáticos de agua dulce en tierras bajas de zonas tropicales y subtropicales. La especie se distribuye desde la Florida en los Estados Unidos hasta el norte y centro de la Argentina. Está considerada como una especie altamente especializada en la captura de caracoles acuáticos y su rango de distribución en la Argentina se encuentra correlacionado con la presencia de caracoles del género *Pomacea* (=*Ampullaria*) de los cuales se alimenta casi con exclusividad (Brown y Amadon, 1968; Del Hoyo *et al.*, 1994). En la Argentina habita la forma *R. s. sociabilis*, la cual se distribuye desde las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Córdoba hasta el centro de Buenos Aires (Narosky e Yzurieta, 1987; Canevari *et al.*, 1991). En la provincia de Buenos Aires es común en la zona norte y este, donde nidifica (Narosky y Di Giacomo, 1993; Darrieu y Camperi, 2001).

En cuanto a los hábitos migratorios del caracolero, generalmente se lo encuentra categorizado como «residente», siendo más común de observar durante la temporada reproductiva (Narosky y Di Giacomo, 1993; Darrieu y Camperi, 2001). No obstante, cabe destacar que la información existente en este aspecto es escasa y en algunos casos hasta contradictoria. Hudson (1974) fue uno de los primeros en observar cierto movimiento estacional de las poblaciones de caracoleros en el norte de la provincia de Buenos Aires, indicando que «en Buenos Aires aparecen en septiembre». Estas observaciones concuerdan con las de Hussey (1916) quien observó a la especie en los alrededores de la ciudad de La Plata desde agosto hasta diciembre.

Narosky e Yzurieta (1987) y De la Peña y Rumboll (1998), no hacen mención sobre la existencia de