



EL AÑAPERO CASTAÑO (*Lurocalis semitorquatus*) EN EL CHACO DE PARAGUAY Y LA ARGENTINA

Alejandro Bodrati¹ y Juan Klavins²

Guyra Paraguay, Casilla 1.132, Comandante Franco 381 c/Leandro Prieto, Asunción Paraguay. ¹Correo electrónico: alebodrati@hotmail.com ²Correo electrónico: piprites@yahoo.com.ar

Presentamos registros recientes obtenidos en estudios de campo realizados en la región chaqueña del Paraguay y la Argentina que contribuyen al conocimiento de la distribución del añapero castaño en los dos países.

El añapero castaño (*Lurocalis semitorquatus*) o yvyja'u mbyju'i, (este último el nombre que recibe en Paraguay), tiene una amplia distribución en América. Abarca desde México hasta el norte argentino y sudeste de Brasil (Cleere, 1999).

Según Hayes (1995) en Paraguay no cuenta con registros para el Chaco, al oeste del río Paraguay, y no la incluye para el Bajo Chaco, Alto Chaco ni la región matogrosense. Nosotros aportamos registros para dos de estas zonas.

En Paraguay se realizó un estudio de la avifauna de la estancia Santa Asunción (23°53'49"S, 58°35'19"W), distrito Benjamín Aceval, Bajo Chaco, departamento Presidente Hayes. Durante dicho relevamiento, la especie era observada casi a diario entre el 11 y el 19 de marzo de 2001, en abundancia de dos a cuatro ejemplares por jornada. Los contactos se hicieron al amanecer y al crepúsculo, momentos de marcada actividad. Un ejemplar fue observado al amanecer posarse en el interior de la copa de una palmera karanda'y (*Copernicia alba*), la cual posiblemente fue utilizada como dormitorio. El 14 de marzo de 2001, A. Bodrati grabó las voces de dos ejemplares al amanecer, a las 6:20, mientras volaban sobre un bosque nativo junto al borde de una sabana con palmar (*Copernicia alba*). Estas grabaciones se encuentran depositados en la base de sonidos de Guyra Paraguay. Nuestros registros permitieron incluir a la especie como "rara" para el Bajo Chaco en Guyra Paraguay (2004).

También fue registrado en el noreste del chaco paraguayo, área de importante influencia matogrosense (ver Hayes, 1995). En la estancia Guyra Toro (19°48'33"S, 58°37'24"W), departamento Alto Paraguay, ubicada al sur del Parque Nacional Río Negro y a unos 55 km al oeste de la localidad de Bahía Negra, J. Klavins lo observó diariamente entre el 4 y el 9 de octubre de 2002, durante el progra-

ma evaluaciones ecológicas rápidas liderado por Guyra Paraguay. En ocasiones, aparecía en grupos de hasta cuatro ejemplares. Si bien la zona requiere mayor prospección, la especie se consideró escasa y podría ser frecuente y de ocurrencia estacional.

En la Argentina la especie es conocida de las provincias de Misiones, Corrientes, Jujuy, Salta (Olrog, 1979; Cleere y Nurney, 1998; De la Peña, 1999; Mazar Barnett y Pearman, 2001) y un hallazgo accidental en Buenos Aires (Jaramillo, 2000). Algunos autores mencionan al añapero castaño para el este del Chaco (Short, 1975; Olrog, 1979; De la Peña, 1999), mientras que otros la excluyen (Contreras *et al.*, 1990; Cleere y Nurney, 1998; Cleere, 1999; Mazar Barnett y Pearman, 2001).

Encontramos a esta especie solamente una vez, durante extensos relevamientos con el objetivo de elaborar el inventario de aves del Parque Nacional Chaco (26°48'S, 59°36'W), departamentos Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral, provincia del Chaco, Argentina. El 13 de enero de 2001, al crepúsculo, A. Bodrati en compañía de K. Cockle, A. Pérez y G. Bodrati, registraron dos ejemplares en la Laguna Yacaré, localidad interna del parque. Fueron detectados e identificados inicialmente por sus vocalizaciones, y luego se los observó en vuelo errático sobre la selva de ribera del madrejón. Este sería el primer registro del añapero castaño para la provincia de Chaco y por lo tanto para el Parque Nacional Chaco, que sería el primer parque nacional chaqueño que cuenta con la especie. Chebez *et al.* (1998) mencionan una cita dudosa para el Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes). Nuestro registro extendería considerablemente la distribución meridional de la especie confirmando su presencia en la región chaqueña.

Agradecemos a José María Hervás, Yamila Gutani, Guillermo Bodrati, Alejandra Pérez y Kristina Cockle por el apoyo brindado en el Parque Nacional Chaco; Alberto Esquivel, Rob Clay, Antonio Spiridonoff y Fernando Homi Gonzáles por su colaboración en Paraguay y el aporte de información; y especialmente a Hugo Del Castillo, responsable de



ARTICULOS

la base de datos de Guyra Paraguay. Kristina Cockle hizo aportes al manuscrito. Los trabajos en Paraguay fueron cubiertos por Guyra Paraguay.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CONTRERAS, J., L. M. BERRY, A. O. CONTRERAS, C. C. BERTONATTI y E. E. UTGES. 1990. Atlas ornitogeográfico de la provincia del Chaco. República Argentina. I. No Passeriformes. Cuadernos Técnicos Félix de Azara I, 164 páginas.
 CLEERE, N. y D. NURNEY. 1998. Nightjars, A Guide to Nightjars and Related Nightbirds. Pica Press. Mountfield, United Kingdom, 317 páginas.
 CLEERE, N. 1999. Family Caprimulgidae (Nightjars). En J. del Hoyo, A. Elliott y J. Sargatal (eds.) "Handbook of the Birds of the world", Vol. 5: 302-387. Lynx Edicions. Barcelona, 759 páginas.
 CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los Parques Nacionales de Argentina. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial L.O.L.A N°12. Buenos Aires, 127 páginas.

DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves argentinas, lista y distribución. L.O.L.A. Monografía N°18. Buenos Aires, 244 páginas.
 GUYRA PARAGUAY. 2004. Lista comentada de las aves de Paraguay. Annotated checklist of the birds of Paraguay. Asunción, 200 páginas.

HAYES, F. E. 1995. Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay. Monographs in Field Ornithology N° 1. American Birding Association. 230 páginas.

JARAMILLO, A. P. 2000. Punta Rasa, South America's first vagrant trap? Cotinga, 14: 33-38.

MAZAR BARNETT, J. y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de las aves argentinas/Annotated checklist of the birds of Argentina. Lynx Edicions. Barcelona, 164 páginas.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

SHORT, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. Bulletin of the American Museum of Natural History, 154: 163-352.

Recibida: enero de 2003

Revista Nuestras Aves, 47:25-26

NUEVOS REGISTROS DE ÁGUILA CORONADA (*Harpyhaliaetus coronatus*) PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

Roberto Pereyra Lobos

Dirección de Recursos Naturales Renovables. Boulogne sur mer s/n, Parque General San Martín. Provincia de Mendoza.
 Correo electrónico: robertopereyra@topmail.com.ar

El águila coronada es una especie, que a diferencia de otras grandes águilas neotropicales, se distribuye principalmente en bosques y estepas arbustivas xerófilas de zonas bajas. Una reseña de

sus registros en la Argentina lo brindan Gonnet y Blendinger (1998) y Maceda (2001). Para la Provincia de Mendoza, se cuenta con los registros de Reed (1916), Contreras (1980) y Gonnet y Blendinger

Tabla 1. Nuevos registros del águila coronada para la Provincia de Mendoza.

Glosario: algarrobo (*Prosopis flexuosa*); chañar (*Geoffroea decorticans*); pichi (*Zaedyus pichiy*); retamo (*Bulnesia retama*).

Fecha	Localidad	Departamento	Coordenadas geográficas	Número de individuos
15/02/2001	La Horqueta	La Paz	34° 04' 48'' S: 66° 43' 36'' W	2 volando
18/07/2001	Ruta Provincial 153	Santa Rosa	34° 13' 19'' S: 67° 54' 35'' W	2 posados sobre un algarrobo cerca de la ruta
03/10/2001			34° 10' 29,8'' S: 68° 01' 30,7'' W	3 (2 adultos y 1 juvenil) en vuelo
03/10/2001			34° 11' 12,6'' S: 67° 18' 32,5'' W	3 en vuelo cerca de represa
17/04/2002	Reserva Telteca	Lavalle	32° 24' 6,9'' S: 68° 01' 49,2'' W	2, un adulto y un juvenil
18/04/2002				1 adulto
02/05/2002				1 adulto
07/07/2002				1 adulto
28/07/2002				1 adulto
03/08/2002				2 adultos
02/09/2002	Ruta 146	La Paz	34° 13' 15,97'' S: 67° 04' 13,2'' W	1 sobre un chañar
09/09/2002	Estancia San Eduardo	San Rafael	34° 26' 22,9'' S: 67° 33' 59,8'' W	1 adulto sobre chañar
13/09/2002	Finca cerca de San Martín	San Martín		1 herido de bala.
29/09/2002	Reserva Telteca	Lavalle	32° 24' 6,9'' S: 68° 01' 49,2'' W	1 adulto comiendo un pichi sobre un algarrobo
01/10/2002				1 adulto posado sobre un retamo
03/10/2002				1 adulto volando
25/10/2002	Ruta Provincial 153	Santa Rosa	32° 21' 39,8'' S: 68° 01' 10,3'' W	1 adulto volando