



ARTICULOS

la base de datos de Guyra Paraguay. Kristina Cockle hizo aportes al manuscrito. Los trabajos en Paraguay fueron cubiertos por Guyra Paraguay.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CONTRERAS, J., L. M. BERRY, A. O. CONTRERAS, C. C. BERTONATTI y E. E. UTGES. 1990. Atlas ornitogeográfico de la provincia del Chaco. República Argentina. I. No Passeriformes. Cuadernos Técnicos Félix de Azara I, 164 páginas.
 CLEERE, N. y D. NURNEY. 1998. Nightjars, A Guide to Nightjars and Related Nightbirds. Pica Press. Mountfield, United Kingdom, 317 páginas.
 CLEERE, N. 1999. Family Caprimulgidae (Nightjars). En J. del Hoyo, A. Elliott y J. Sargatal (eds.) "Handbook of the Birds of the world", Vol. 5: 302-387. Lynx Edicions. Barcelona, 759 páginas.
 CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los Parques Nacionales de Argentina. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial L.O.L.A N°12. Buenos Aires, 127 páginas.

DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves argentinas, lista y distribución. L.O.L.A. Monografía N°18. Buenos Aires, 244 páginas.
 GUYRA PARAGUAY. 2004. Lista comentada de las aves de Paraguay. Annotated checklist of the birds of Paraguay. Asunción, 200 páginas.

HAYES, F. E. 1995. Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay. Monographs in Field Ornithology N° 1. American Birding Association. 230 páginas.

JARAMILLO, A. P. 2000. Punta Rasa, South America's first vagrant trap? Cotinga, 14: 33-38.

MAZAR BARNETT, J. y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de las aves argentinas/Annotated checklist of the birds of Argentina. Lynx Edicions. Barcelona, 164 páginas.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

SHORT, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. Bulletin of the American Museum of Natural History, 154: 163-352.

Recibida: enero de 2003

Revista Nuestras Aves, 47:25-26

NUEVOS REGISTROS DE ÁGUILA CORONADA (*Harpyhaliaetus coronatus*) PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

Roberto Pereyra Lobos

Dirección de Recursos Naturales Renovables. Boulogne sur mer s/n, Parque General San Martín. Provincia de Mendoza.
 Correo electrónico: robertopereyra@topmail.com.ar

El águila coronada es una especie, que a diferencia de otras grandes águilas neotropicales, se distribuye principalmente en bosques y estepas arbustivas xerófilas de zonas bajas. Una reseña de

sus registros en la Argentina lo brindan Gonnet y Blendinger (1998) y Maceda (2001). Para la Provincia de Mendoza, se cuenta con los registros de Reed (1916), Contreras (1980) y Gonnet y Blendinger

Tabla 1. Nuevos registros del águila coronada para la Provincia de Mendoza.

Glosario: algarrobo (*Prosopis flexuosa*); chañar (*Geoffroea decorticans*); pichi (*Zaedyus pichiy*); retamo (*Bulnesia retama*).

Fecha	Localidad	Departamento	Coordenadas geográficas	Número de individuos
15/02/2001	La Horqueta	La Paz	34° 04' 48" S: 66° 43' 36" W	2 volando
18/07/2001	Ruta Provincial 153	Santa Rosa	34° 13' 19" S: 67° 54' 35" W	2 posados sobre un algarrobo cerca de la ruta
03/10/2001			34° 10' 29,8" S: 68° 01' 30,7" W	3 (2 adultos y 1 juvenil) en vuelo
03/10/2001			34° 11' 12,6" S: 67° 18' 32,5" W	3 en vuelo cerca de represa
17/04/2002	Reserva Telteca	Lavalle	32° 24' 6,9" S: 68° 01' 49,2" W	2, un adulto y un juvenil
18/04/2002				1 adulto
02/05/2002				1 adulto
07/07/2002				1 adulto
28/07/2002				1 adulto
03/08/2002				2 adultos
02/09/2002	Ruta 146	La Paz	34° 13' 15,97" S: 67° 04' 13,2" W	1 sobre un chañar
09/09/2002	Estancia San Eduardo	San Rafael	34° 26' 22,9" S: 67° 33' 59,8" W	1 adulto sobre chañar
13/09/2002	Finca cerca de San Martín	San Martín		1 herido de bala.
29/09/2002	Reserva Telteca	Lavalle	32° 24' 6,9" S: 68° 01' 49,2" W	1 adulto comiendo un pichi sobre un algarrobo
01/10/2002				1 adulto posado sobre un retamo
03/10/2002				1 adulto volando
25/10/2002	Ruta Provincial 153	Santa Rosa	32° 21' 39,8" S: 68° 01' 10,3" W	1 adulto volando



(1998); a los cuales sumamos 17 avistajes inéditos, realizados entre febrero del 2001 y octubre de 2002 en ambiente de monte (ver Tabla 1).

Es de destacar la importancia que tiene toda la porción oriental de la provincia de Mendoza, en especial los departamentos de La Paz, Santa Rosa y Laval, como zona de distribución del águila coronada. En el oeste de San Luis y La Pampa, y la región vecina de Mendoza, donde se concentran los registros de este trabajo, existen cuatro áreas naturales protegidas (Reservas Naturales Bosque de Telteca y Ñacuñán en Mendoza, Parques Nacionales Sierra de las Quijadas y Lihué Calel), que podrían contribuir a la conservación de esta rapaz, aunque sería fundamental asegurar corredores entre estas reservas.

Agradezco a Guillermo Ferraris. Santiago Mayorga, Domingo Mayorga, Sosante Mayorga,

Ricardo Yacante, Hernán Ponce, Graciela Mónaco, Francisco Molina por sus datos y colaboración en las tareas de campo. A Jorge Gonnet, Pedro Blendinger y Flavio Martínez por orientarme en la faz técnica de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CONTRERAS, J. R. 1980. Lista sistemática preliminar de los vertebrados de la Reserva Ecológica de Ñacuñán. Cuaderno Técnico, 1-79: 39-47.
- GONNET, J. M. y P. G. BLENDINGER. 1998. Nuevos registros de distribución del águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en el oeste de Argentina. El Hornero, 15: 39-42.
- MACEDA, J. J. 2001. Nuevas citas del águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para la Provincia de la Pampa, Argentina. Nuestras Aves, 41: 27-28.
- REED, C. 1916. Las aves de la Provincia de Mendoza. Museo Educativo de Mendoza. Mendoza, 47 páginas.

Recibida: enero 2003

Revista Nuestras Aves, 47:26-28

NUEVOS APORTES A LA DISTRIBUCIÓN DEL LECHUZÓN NEGRUZO (*Asio stygius*) EN EL NORESTE ARGENTINO

Alejandro Bodrati

Guyra Paraguay, Casilla 1.132, Comandante Franco 381 c/Leandro Prieto, Asunción Paraguay.
Correo electrónico: alebodrati@hotmail.com

El lechuzón negruzco (*Asio stygius*) tiene una distribución amplia aunque fragmentada e insuficientemente conocida que comprende seis subespecies, desde el oeste de México hasta Paraguay, sudeste de Brasil y gran parte del norte de la Argentina (Marks *et al.*, 1999). Presenta una extensa dispersión en el norte argentino con dos formas: *Asio stygius stygius* y *A. s. barberoi*. Abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Chaco y Corrientes (Olrog, 1979; De la Peña, 1999; Contreras, 1981; Contreras *et al.*, 1990). La forma *A. s. stygius* presenta una distribución localizada, con pocos reportes en la región Oriental de Paraguay, Misiones y el noroeste de la Argentina (Contreras *et al.*, 1990; Chebez, *in litt.*). En el chaco paraguayo y argentino estaría presente la forma *A. s. barberoi* (Bertoni, 1930) de discutida validez (ver Partridge, 1954; Chebez *et al.*, 1999).

El lechuzón negruzco es poco conocido y extremadamente raro a lo largo de toda su distribución, incluso en la Argentina (Contreras *et al.*, 1990; Chebez, 1994; Marks *et al.*, 1999). En el norte de Salta,

Olrog (1985) menciona a dos adultos capturados en redes de neblina en 1979 y 1980 respectivamente. En Misiones Partridge (1954) la obtuvo en bosques de pino Paraná (*Araucaria angustifolia*) y M. Castelino la registró en los últimos años (Chebez, 1994). En esta provincia se comprobó su presencia por medio de vocalizaciones en la Reserva Natural San Antonio durante campañas de la Administración de Parques Nacionales en 1994 (Chebez *et al.*, 1998), y por una foto de un ejemplar capturado en 1996 San Antonio (Chebez *et al.*, 1998). También oímos sus voces por la noche los días 11 y 12 de marzo de 1997 en el Parque Provincial de la Araucaria, departamento San Pedro, provincia de Misiones (A. Bodrati y G. Bodrati, obs. pers.), donde pocos días después, el 14 de mayo de 1997, J. Mazar Barnett (ver Hardy *et al.*, 1999) obtuvo grabaciones.

En la provincia de Corrientes la registré el 14 de octubre de 1999 en la Reserva Compensatoria Apipé Grande, cuando oí por espacio cercano a dos horas las voces de un ejemplar que se encontraba dentro de un monte selvático paranaense del sector central de la isla.