



DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves argentinas, lista y distribución. Monografía Especial LOLA N°18. Buenos Aires, 244 páginas.

HARDY, J. W., B. B. COFFEY JR. y G. B. REYNARD. 1999. Voices of the New World Owls 1999 edition (Cassettes). Revised by Terry Taylor. Prepared in the Bioacoustic Laboratory of the Florida Museum of Natural History. ARA Records. Gainesville, Florida.

LÓPEZ LANÚS, B. 1997. Inventario de las aves del Parque Nacional "Río Pilcomayo", Formosa, Argentina. Monografía Especial LOLA N°4. Buenos Aires, 78 páginas.

MARKS, J. S., R. J. CANNING, y H. MIKKOLA. 1999. Family Strigidae (typical owls). En del Hoyo, J., A. Elliott y J. Sargatal (eds.) "Handbook of the birds of the world", Vol. 5: 76-242. Lynx Edicions. Barcelona, 759 páginas.

MAZAR BARNETT, J., y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de las aves argentinas / Annotated checklist of the birds of Argentina. Lynx Edicions. Barcelona, 164 páginas.

NAROSKY, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

OLROG, C. C. 1985. Status of wet forest raptors in northern Argentina. I.C.B.P. Tech. Publ. N°5:191-197, Conservation Studies on raptors.

PARTRIDGE, W. E. 1954. Estudio preliminar sobre una colección de aves de Misiones. Revista Inst. Nac. Investigaciones Ciencias Naturales y Mus. Argentino Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Zool., 3: 87-153.

SHORT, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. Bulletin of the American Museum of Natural History, 154: 163-352.

ZOTTA, A. 1944. Lista sistemática de las aves argentinas. Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", tirada aparte. Buenos Aires, 236 páginas.

Recibida: enero de 2003

Revista Nuestras Aves, 47:28-30

NUEVOS REGISTROS DEL AGUILUCHO JOTE (*Buteo albonotatus*), CON COMENTARIOS SOBRE SU PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN EN EL NORTE DE LA ARGENTINA Y PARAGUAY

Alejandro Bodrati¹, Hugo del Castillo² y Juan Klavins³

Guyra Paraguay, Casilla 1.132, Comandante Franco 381 c/Leandro Prieto, Asunción, Paraguay.
Correos electrónicos: ¹alebodrati@hotmail.com, ²hugodc@guyra.org.py, ³piprites@yahoo.com.ar

El aguilucho jote (*Buteo albonotatus*) presenta una distribución discontinua y poco conocida (Thiollay, 1994), que abarca el extremo sur de Estados Unidos y el noroeste y norte central de México hasta el sudeste de Brasil, norte y este de Bolivia, Paraguay y la Argentina (Thiollay, 1994; Hayes, 1995; Mazar Barnett y Pearman, 2001). En la Argentina la especie fue citada recientemente (ver Fraga y Clark, 1999; Mazar Barnett y Pearman, 2001). En Paraguay existirían varios registros aunque son pocos los detallados (ver Hayes, 1995). En la Argentina y Paraguay los registros se han producido mayormente en ambientes chaqueños, tanto en sectores húmedos como en áridos.

Presentamos registros recientes que actualizan la presencia de la especie en ambos países y aportan mayor conocimiento sobre su distribución. Damos a conocer el material de museo originario de Paraguay. La mayoría de nuestros registros se han realizado sobre bordes o inmediaciones de rutas y por esto resulta llamativo la falta de registros en Argentina hasta hace muy poco tiempo. Por un lado el número poblacional de la especie parece ser bajo tanto en el norte argentino como en Paraguay (Hayes, 1995; Guyra Paraguay, 2004). Por otra parte,

la escasez de registros en Argentina podría ser resultado de lo poco estudiada a nivel sistemático que se encuentra la región chaqueña. Además, a cierta distancia, cuando la especie está en vuelo, es fácil confundirla con el jote cabeza colorada (*Cathartes aura*), al cual imitaría para no alertar a sus potenciales presas (Thiollay, 1994). Por este notable parecido a especies del género *Cathartes*, parecería adecuado adoptar como nombre común aguilucho jote, ya utilizado por Di Giacomo (2001). Las observaciones que damos a conocer parecen indicar que la especie, en bajo número aunque en forma regular, habitaría un importante sector del norte argentino y la mayor parte del Paraguay, al oeste del río del mismo nombre.

Argentina

López Lanús (1997) daba como probable su presencia en el Parque Nacional Río Pilcomayo y por lo tanto en la Argentina, basándose en registros de A. Madroño Nieto en el chaco paraguayo, cerca de la frontera argentina. El primer registro conocido de este aguilucho para la Argentina lo presentan Fraga y Clark (1999), quienes observaron un individuo en



► ARTICULOS

el arroyo de las Moras, extremo norte de la provincia de Salta. Sin embargo, existía un registro anterior dado a conocer recientemente por Mazar Barnett y Pearman (2001). En junio de 1977, R. Ridgely fotografió un ejemplar en la ruta entre Tartagal y Embarcación, en la provincia de Salta; esta fotografía fue revisada por J. Mazar Barnett (*in litt.*) y sería el primer registro documentado de la especie en el país (Mazar Barnett y Pearman, 2001). El tercer registro conocido para la Argentina y el primero para la provincia del Chaco, se produjo el 6 de diciembre de 1999, en el departamento Quitilipi, a unos 2 km al norte de la localidad de Pampa Verde, y a unos 10 km al sur del límite sudeste del Parque Provincial Pampa del Indio (26°16'S 59°58'W). En esa ocasión, A. Bodrati observó un ejemplar adulto planeando a poca altura, en forma paralela al trazado de la ruta 4 provincial (Mazar Barnett y Pearman, 2001). El cuarto registro conocido para el país y el primero para la provincia de Formosa se produjo en la Reserva El Bagual (26°10'S 58°56'W). En esta localidad, Alejandro Di Giacomo (com. pers.) observó un ejemplar juvenil el 4 de febrero de 2000 (Di Giacomo, 2001; Mazar Barnett y Pearman, 2001) y luego otros más, incluso varios individuos juntos.

Un nuevo registro se produjo el 27 de diciembre de 2000, en el departamento Sargento Cabral, provincia de Chaco, a 3 km al norte de la localidad de Colonia Elisa y a unos 17 km al sudeste del Parque Nacional Chaco. En este lugar, A. Bodrati observó un ejemplar adulto planeando bajo y haciendo cambiantes ascensos y descensos, paralelo a la vera de la ruta provincial 9. Este sería el quinto registro de la especie para Argentina, el segundo para la provincia de Chaco, y el más austral de los registros conocidos para la especie. El aguilucho jote podría hallarse en el Parque Nacional Chaco, debido a la proximidad de este último registro. Sin embargo, hasta el momento no existen registros para esa área (Chebez *et al.*, 1998; A. Bodrati, en prep.).

También recientemente, se han conseguido registros documentados para el noreste de la provincia de Santiago del Estero (Walter Cejas en prep.).

El 7 de agosto de 2003, A. Bodrati y Kristina Cockle observaron un individuo adulto de la especie sobrevolando el sector de acampe en la seccional Aguas Negras del Parque Nacional Calilegua, departamento Ledesma, provincia de Jujuy (23°42'S 64°48'W). El individuo se dirigió hacia el río San Lorenzo, perdiéndose de vista volando paralelo y a poca altura en dirección este, aguas abajo. Este sería el primer registro conocido de la especie dentro

de un área protegida del sistema nacional de parques, y el primero para la provincia de Jujuy. Por otra parte, resulta novedosa la aparición de este ejemplar en hábitat de transición entre la selva basal o pedemontana y ambientes chaqueños, a una altura de entre 500-600 m sobre el mar.

Paraguay

Hayes (1995) señala que existen muchos registros para el Chaco, y detalla tres. Contamos con los siguientes registros que contribuyeron a las categorías asignadas por Guyra Paraguay (2004).

En la región Campos Cerrados, Hayes (1995) establece la presencia de la especie como rara. Guyra Paraguay (2004) mantiene la misma categoría. Existe un registro reciente: el 11 de mayo de 2002, cerca del mediodía, J. Klavins observó un juvenil volando sobre un ambiente propio de Cerrado, 3 kilómetros al sur del arroyo Tagatiamí (22°40'S 57°33'W), en el camino vehicular que conduce a Vallemí, departamento Concepción.

En la región Matogrosense Hayes (1995) la considera rara y Guyra Paraguay (2004) escasa. Contamos con tres registros recientes: 1) El 16 de julio de 2002, J. Klavins observó un juvenil de la especie cerca del cruce de caminos que conducen a San Carlos y Bahía Negra (20°46'50"S 58°27'40"W), departamento Alto Paraguay. Días después, el 21 de julio de 2002, el mismo observador y H. del Castillo encuentran nuevamente a un juvenil cerca del sitio del registro anterior, a las afueras de San Carlos, departamento Alto Paraguay (20°46'59"S, 58°28'55"W), camino a Puerto Boquerón. Se presume que se trataría del mismo ejemplar. 2) El 26 de julio de 2002, Juan Klavins observó un adulto cerca del cruce entre los caminos que unen Guyra Toro (19°48'33"S 58°37'24"W) y Línea 1, departamento Alto Paraguay. 3) Un equipo de trabajo de la Universidad de Kansas compuesto por K. Zyskowski, K. S. Bostwick, y P. Peterson, la registra durante una campaña realizada entre los días 27 de septiembre y 3 de octubre de 1999, en el Río Negro, 8 km aguas arriba de la desembocadura, en la margen derecha (20°05'54"S, 58°08'48"W), cerca de Bahía Negra, departamento Alto Paraguay.

Para la región Alto Chaco Hayes (1995) la considera poco común, pero Guyra Paraguay (2004) escasa. Existen dos registros recientes: 1) Un ejemplar fue observado el 21 de agosto de 2001, por R. Fraga, en Laguna Capitán (22°32'25"S 59°40'35"W), Colonia Menno, departamento Presidente Hayes. 2) Un adulto fue observado por J. Klavins y R. P. Clay el 10 de enero de 2003, en la estancia Campo Grande



ARTICULOS

(19°46'51"S 59°46'51"W). También está incluida, sin detalles, en el inventario del Parque Nacional Defensores del Chaco (Amarilla y Barreto, 1999; 20°20'S, 60°20'W), departamento Alto Paraguay.

En la región Bajo Chaco Hayes (1995) trata a la especie como poco común, pero Guyra Paraguay (2004) la considera escasa. Registros recientes incluyen los siguientes: 1) El 24 de noviembre de 1999, A. Madroño Nieto, M. Velázquez y A. Bodrati observaron un adulto de la especie, volando paralelo y a baja altura en el km 153 de la ruta Transchaco (24°16'S 58°16'W), departamento Presidente Hayes. 2) El 23 de septiembre de 2002, H. Del Castillo y R. Fraga encontraron otro ejemplar adulto posado en la banquina de la ruta Transchaco en el km 197, departamento Presidente Hayes. Hayes (1995) no la incluye para el Paraguay Central, pero Guyra Paraguay (2004) la trata como rara. El primer y único registro conocido para la región lo constituye el publicado en Lowen *et al.* (1996), en Aguara Ñu (24°10'S, 55°16'W), en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, departamento Canindeyú.

Además, existen las siguientes pieles de museo provenientes de Paraguay:

Material del Field Museum of Natural History, Chicago

1) Un macho, N°102.764, de Puerto Casado, 195 km al oeste, Alto Paraguay, del 3 de mayo de 1939.

Material del University of Michigan Museum of Zoology, Ann Arbor, colectado por Alberto Schulze, y Jacob Unger

2) Un macho, N°111.356, de Campo Esperanza, Chaco, departamento Presidente Hayes, del 20 de junio de 1938 (N°ASC 5568).

3) Un macho, N°105044, de Puerto Casado, 240 km al oeste, Chaco, departamento Presidente Hayes, del 25 de abril de 1939 (N°ASC 7702).

Material del Museum Alexander Koenig, Bonn, y Senckenberg Museum, Franckfurt, según Steinbacher (1962)

4) Un macho, N°311, FL 383 (SMF 28780), de Orloff, 60 km al oeste, departamento Boquerón, del 14 de noviembre de 1956.

5) Un macho, N°419, FL. 392 (BONN 57189), de Orloff, departamento Boquerón, del 15 de junio de 1957.

6) Un macho, N°501, FL. 402 (BONN 601507), de Lichtenau, Presidente Hayes, del 7 de mayo de 1960.

Material del Senckenberg Museum. Franckfurt, según Steinbacher (1968)

7) Un macho, N°812, FL. 392 (SMF 47874), de Lichtenau, Presidente Hayes, del 23 de diciembre de 1963.

Agradecemos a Juan Mazar Barnett por los comentarios e información, a Walter Cejas, Alberto Madroño Nieto, Fernando Homi González, Alejandro G. Di Giacomo, Alberto Esquivel, Rosendo Fraga, Rob Clay, Myriam Velázquez, Adrián Di Giacomo y Antonio Spiridonoff como colaboradores de campo o por permitir incluir sus observaciones. Los registros en Paraguay fueron realizados durante campañas cubiertas por Guyra Paraguay. Kristina Cockle hizo aportes al manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- AMARILLA, L. y R. BARRETO. 1999. Aves. En Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre. 1065 Motivos iniciales para proteger el Parque Nacional Defensores del Chaco. Evaluación ecológica rápida. Asunción, Paraguay.
- BODRATI, A. En prep. Inventario de las aves del Parque Nacional Chaco, provincia de Chaco, Argentina.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial LOLA N°12. Buenos Aires, 127 páginas.
- DI GIACOMO, A. G. 2001. Estancia y Reserva El Bagual. Alparamis y Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, 176 páginas.
- FRAGA, R. M. y R. CLARK. 1999. Notes on the avifauna of the upper Bermejo River (Argentina and Bolivia) with a new species for Argentina. *Cotinga*, 12:77-78.
- GUYRA PARAGUAY. 2004. Lista comentada de las aves de Paraguay/Annotated checklist of the birds of Paraguay. Asunción, 200 páginas.
- HAYES, F. E. 1995. Status, distribution and Biogeography of the birds of Paraguay. Monography N°1. American Birding Association.
- LÓPEZ LANÚS, B. 1997. Inventario de las aves del Parque Nacional Río Pilcomayo. Formosa, Argentina. Monografía Especial LOLA N°4. Buenos Aires, 76 páginas.
- LOWEN, J. C., L. BARTRINA, R. P. CLAY y J. A. TOBÍAS. 1996. Biological surveys and conservation priorities in eastern Paraguay. The final reports of Projects Canopy and Yacutinga 95. CSB Conservation Publications. Cambridge, U. K.
- MAZAR BARNETT, J. y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de las aves Argentinas/Annotated checklist of the birds of Argentina. Lynx Edicions. Barcelona, 164 páginas.
- STEINBACHER, J. 1962. Beiträge zur Kenntnis der Vögel von Paraguay. Abhandl. Seckenbergischen Naturf. Gesell., 502: 1-106.
- STEINBACHER, J. 1968. Weitere Beiträge über Vögel von Paraguay. Seckenbergiana Biol., 49:317-365.
- THIOLLAY, J. M. 1994. Family Accipitridae (Hawks and Eagles). En J. del Hoyo, A. Elliott y J. Sargatal (eds.), "Handbook of the birds of the world", Vol. 2:52-205. Lynx Edicions. Barcelona, 638 páginas.

Recibida: febrero 2003.