



SITUACIÓN ACTUAL DEL CACHOLOTE CASTAÑO (*Pseudoseisura lophotes*) EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Alejandro Bodrati¹ y Enrique Sierra²

¹ Los Ceibos 1.695, (1.607) Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: alebodrati@hotmail.com

² Caroni 55, (2.930) San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: kikesierra@yahoo.com.ar

El cacholote castaño (*Pseudoseisura lophotes*) o sorototo, nombre este último que recibe en el Paraguay y algunos puntos del norte argentino, se distribuye desde Salta, Formosa y Corrientes hasta La Pampa, Mendoza, Río Negro (Olrog, 1979) y Neuquén (Babarskas *et al.*, 1996). Narosky y Di Giacomo (1993) señalan a la especie para el distrito del caldén en el extremo sur de Buenos Aires donde es escasa pero nidificante, y la consideran accidental para el noreste de la provincia debido a que solo se conocen registros de antigua data como los de Hudson (1870) y Lynch Arribálzaga (1878). Nores y Nores (1994) brindan información sobre la nidificación del caserote castaño.

Bodrati *et al.* (2001) dan a conocer varios registros de septiembre de 1998 para un relicto de talaes en Vuelta de Obligado (33° 36' S y 59° 49' W), partido de San Pedro. Luego, fue registrada en forma regular, ya que se encontró en todas las visitas realizadas al mismo sitio desde 1999 hasta septiembre de 2003.

Según el sereno asignado al cuidado del sector Histórico de Vuelta de Obligado "nunca los había observado a lo largo de muchos años de vivir en la zona, recién hace unos dos o tres años que empecé a verlos y escucharlos". Estos comentarios coinciden con nuestras observaciones: entre 1991 y 1997 no se registró en la zona (Bodrati *et al.*, 1996-1998) pero comenzó a ser observada desde septiembre de 1998 (Bodrati *et al.*, 2001) y hasta septiembre de 2003. Es de destacar que en extensos relevamientos que se hicieron durante varias temporadas en otros sectores de la región como en los partidos de Baradero (Haene *et al.*, 1996), Ramallo, San Pedro, Escobar y Campana la especie no la hemos registrado. Tampoco cuenta con registros para la Reserva Natural Otamendi (Babarskas *et al.*, 2003). Por lo tanto su presencia sería muy local y extremadamente baja su densidad poblacional en la región.

Se detallan algunos de los nuevos registros obtenidos a partir de 1999 en Vuelta de Obligado:

El 5 de octubre de 1999, A. Bodrati detectó por sus voces tres ejemplares de caserote castaño. Dos estaban cerca de la curva pronunciada que hace el arroyo de los Cueros en los campos llamados "bajos de Castro" en un ambiente de bosque bajo y algo abierto con predominio de espinillo (*Acacia caven*). Estos emitieron el estridente dueto característico de la especie. El tercer ejemplar vocalizó algo alejado desde la parte alta o terraza del talar, respondiendo a los anteriores.

El 16 de abril de 2000, A. Bodrati, E. Mérida y E. Sierra encontraron un ejemplar, al que ubicaron por su voz y luego observaron expuesto sobre un algarrobo blanco (*Prosopis alba*) que está a pocos metros del borde de la barranca. En este lugar la barranca cae a pique verticalmente sobre el río Paraná de las Palmas y está a pocos metros del Monumento Histórico Municipal de Vuelta de Obligado. El mismo día, tiempo más tarde, se oyeron las voces de dos ejemplares en el sector del camping municipal, cerca de la observación anterior. Además, se observó un juvenil en un reducido parche de espinal en el sector del poblado de esta localidad, en la esquina oeste de la manzana N°5 del sector que está en vías de urbanización.

Los días 19 y 20 de octubre de 2001, E. Mérida (*in litt.*) encontró nuevamente a la especie en el sector municipal lindante al Monumento Histórico. El 23 de diciembre de 2001, E. Sierra, A. Bodrati, G. Bodrati, E. Mérida, A. Pérez y K. Cockle avistaron ejemplares en la zona del camping municipal de Vuelta de Obligado. Dos individuos fueron oídos y observados a corta distancia y en distintos momentos de la jornada.

Los días 13 y 14 de octubre de 2002 E. Sierra, A. Bodrati, E. Mérida, G. Bodrati y A. Pérez hallaron



ARTICULOS

un nido activo de esta especie en el sector recientemente parquizado frente al lugar Histórico de Vuelta de Obligado. Este lugar se encuentra a poco más de 100 metros de la zona propuesta como reserva (Bodrati *et al.*, 1996-1998), y donde ha sido prácticamente eliminada la mayor parte de la cubierta boscosa nativa que hasta hace poco tiempo estaba presente.

El característico nido, voluminoso y de forma horizontal alargada (Narosky *et al.*, 1983), estaba construido con palitos espinosos de importante tamaño (grosor de un dedo) mayormente de espinillo y presentaba pedacitos de plástico. Sus medidas eran 90 x 55 cm y tenía la entrada lateral e inferior (hacia abajo). Se encontraba a 4,10 m de altura, trabado en una horqueta triple de una rama alta y exterior de un añejo ombú (*Phytolacca dioica*) quedando casi sobre el borde de la calle. Este árbol permanece en la esquina norte de la manzana 11 en la intersección de las calles 29 y 16 del trazado del poblado de Vuelta de Obligado. Aunque no se revisó el interior del nido, observamos a un adulto salir y minutos más tarde vimos una pareja en el mismo árbol. Pocos días después, el 16 de octubre E. Sierra regresó al sitio y vio dos adultos visitando el nido.

Los restos de un segundo nido se encontraban muy próximos al anterior, tan sólo a 10 m sobre un tala (*Celtis tala*). Seguramente su estado de deterioro se debiera a que la pareja reutilizara parte del material de este nido en la realización del que consideramos activo. Este aprovechamiento del material de anteriores nidos ya fue indicado por Nores y Nores (1994). Un tercer nido fue encontrado sobre otro tala a unos 30 m de los anteriores, también inactivo y algo deteriorado. El 16 de octubre de 2002 se hicieron filmaciones de los tres nidos por lo que estas observaciones quedaron documentadas.

El 15 de febrero de 2003, E. Sierra encontró otro nido activo en el mismo ombú del primer nido mencionado. Esta vez estaba apoyado sobre el extremo de una rama con orientación sur, aunque no se determinó si fue realizado por la misma pareja.

El 3 de septiembre de 2003, E. Sierra fotografió un nido activo de este furnárido, que estaba a 1 m de altura sobre un tala, y a corta distancia del camino que une San Pedro con Vuelta de Obligado, en campos de la Estancia Río Paraná (3,5 km al oeste de los anteriores nidos). En este campo alto, próximo al

sector de inundación de los arroyos Seco y de los Cueros (conocido en la zona como «Bajos de Castro»), hay talas y espinillos aislados.

En Vuelta de Obligado hemos estudiado en profundidad una superficie de 87 hectáreas, de las cuales, hoy, sólo unas 40 mantienen un estado aceptable de conservación. Nuestras observaciones sugerirían que pocos individuos del caserote castaño, probablemente no más de dos o tres parejas y algún juvenil, han colonizado o «recolonizado», por lo menos este sitio puntual de su antigua distribución austral oriental que alcanzaba el noreste bonaerense.

En el sector del poblado de Vuelta de Obligado hay un inminente avance de la urbanización. En la mayor parte de este sector solo quedan árboles aislados como vestigios que demuestran una anterior formación de espinal o talar de barranca del distrito del algarrobo, propio de esta parte de la provincia. Allí aparecen talas, ombúes, molles (*Schinus longifolius*), tembetaríes (*Fagara hyemalis*) y espinillos aislados o muy dispersos. La reciente urbanización ha provocado la deforestación de varias hectáreas que funcionaban como corredores naturales, aislando progresivamente el sector propuesto como reserva.

En otras partes de su distribución, el caserote castaño se adaptaría a importantes transformaciones ambientales. Sin embargo, en el norte bonaerense podría verse afectado seriamente si se sigue con el actual ritmo de deterioro y eliminación definitiva de los últimos y reducidos relictos de talar o espinal de barranca.

Una situación similar podrían atravesar otras especies de furnáridos de la zona como la bandurrita chaqueña (*Upucerthia certhioides*) o el curutié blanco (*Cranioleuca pyrrhophia*). La presencia de esta última, según nuestras observaciones, parece estar ligada a ambientes de vegetación nativa de barranca en buen estado, donde resulta común y nidifica; pero desaparece o es muy rara cuando se elimina dicha cubierta natural o predominan especies vegetales exóticas.

Agradecemos la colaboración suministrada por Emilse Mérida, Kristina Cockle, Guillermo Bodrati, Alejandra Pérez, Raúl Ortega, quienes además participaron de las salidas de campo. A Eduardo Campos y Daniel Ekerdt de Multicanal por las filmaciones de los nidos y los ambientes de Vuelta de Obligado desde 1998.



➤ ARTICULOS

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BABARSKAS, M., J. VEIGA y F. FILIBERTO. 1996. Nuevos registros de aves para la provincia de Neuquen. *Nuestras Aves*, 34: 44-46.
- BABARSKAS, M., E. HAENE y J. PEREIRA. 2003. Aves de la Reserva Natural Otamendi. En E. Haene y J. Pereira (eds.), "Fauna de Otamendi": 47-113. *Temas de Naturaleza & Conservación*, 3. Buenos Aires, 191 páginas.
- BODRATI, A., G. BODRATI y H. FERNÁNDEZ. 1996-1998. Sobre la importancia de la conservación de un refugio histórico y natural en las barrancas de Vuelta de Obligado, Partido de San Pedro. *Asociación Ornitológica del Plata*. Buenos Aires, 25 páginas.
- BODRATI, A., G. BODRATI y H. FERNÁNDEZ. 2001. Notas sobre la Avifauna del norte de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 41: 17-21.
- HAENE, E., M. C. BERWYN, A. BODRATI, G. BODRATI, T. CUTELLE, C. FERRARI, E. MÉRIDA, C. NARDINI, E. NUÑEZ, R. RODRÍGUEZ, S. SANTISTEBAN, M. J. SOLÍS y M. TCHARIAN. 1996. Diagnóstico general de las áreas naturales del partido de Baradero (provincia de Buenos Aires) y recomendaciones para su conservación. Informe inédito, Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 26 páginas.
- HUDSON, W. H. 1870. First letter on the ornithology of Buenos Ayres. *Proc. Zool. Soc. London* 1870:87-89.
- LYNCH ARRIBÁLZAGA, E. 1878. Rápida ojeada sobre la fauna del Baradero. *El Naturalista Argentino* 1: 3-18, 52-58, 75-83, 101-105, 242-248, 330-336.
- NAROSKY, S., R. FRAGA y M. DE LA PEÑA. 1983. Nidificación de las aves argentinas (*Dendrocolaptidae* y *Furnariidae*). *Asociación Ornitológica del Plata*. Buenos Aires, 99 páginas.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. *Asociación Ornitológica del Plata*, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.
- NORES, A. I. y M. NORES. 1994. Nest building and nesting behaviour of the Brown Cacholote. *Wilson Bulletin*, 106 (1): 106-120.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.

Recibida: diciembre de 2002

Revista *Nuestras Aves*, 46:43-44

REGISTROS DE NIDIFICACIÓN DE PATO CUTIRÍ (*Amazonetta brasiliensis*) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA

Walter E. Cejas

Museo de Zoología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
Correo electrónico: wecejas@yahoo.com.ar

El pato cutirí (*Amazonetta brasiliensis*) manifiesta una expansión geográfica notoria en los últimos años en la provincia de Córdoba, en particular en la zona norte y nordeste (Nores, 1996), y en la región central donde ha incrementado su número en el departamento General San Martín (Salvador y otros, datos no publicados), y en el departamento Unión (Salvador, com. pers.).

Desde 1993 se han realizado estudios periódicos sobre comunidades de aves acuáticas, en lagunas adyacentes al río Primero (Suquía) en proximidades a la localidad de Santa Rosa del Río Primero (31° 05' S 63° 28' W), dichos humedales estarían ubicados dentro de la región fitogeográfica del Espinal (Cabrera, 1976) y en la región ornitogeográfica Chaqueña, Distrito Occidental (Nores, 1987). Allí