



AVES NUEVAS O RARAS PARA LA RESERVA COSTANERA SUR, CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Horacio Reinaudo.

Alsina 259 7 piso 1 (1.704), Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: cranioleuca@hotmail.com

Se observaron y fotografiaron tres especies raras en la Reserva Ecológica Costanera Sur, que no estaban mencionadas en Narosky *et al.* (1996).

En la primera quincena de enero de 2001 se registró un adulto de tijerilla (*Xenopsaris albinucha*) alimentando a dos pichones. La especie ya figura como accidental para los bosques de la reserva (Babarskas y Zelaya, 1994), pero no estaba documentada como nidificante en el lugar.

Un ejemplar de tuquito rayado (*Empidonomus varius*) fue avistado sobre cortaderas (*Cortaderia selloana*) a principios de febrero de 2001. Figuraba como accidental para los bosques de Costanera Sur (Babarskas y Zelaya, 1994).

Un individuo de cerquero amarillo (*Atlapetes citrinellus*) fue observado a mitad de febrero de 2001 en los árboles de la reserva. La especie no estaba registrada en Costanera Sur y tiene escasos registros

para la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993); estos ejemplares serían escapados de cautiverio.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BABARSKAS, M. y D. ZELAYA. 1994. Las aves de la Reserva Costanera Sur. Asociación Ornitológica del Plata.

NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 127 páginas.

NAROSKY, T., C. HENSCHKE y D. YZURIETA. 1996. Aves de Costanera Sur y Ciudad de Buenos Aires. Guía para su reconocimiento. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 71 páginas.

AVISTAJE DEL AGUILUCHO COLA ROJIZA (*BUTEO VENTRALIS*) EN LA ZONA DEL RÍO ÑIRIHUAU, PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI

Hernán Pastore.

Proyecto Huemul - Wildlife Conservation Society y Fundación Vida Silvestre Argentina. Quaglia 725 (8.400) San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Correo electrónico: hpastore@bariloche.com.ar

El 14 de marzo de 2002 fue observado un ejemplar de aguilucho cola rojiza (*Buteo ventralis*) en la seccional Ñirihuau del Parque Nacional Nahuel Huapi (41° 19' 12,5" S; 71° 16' 22,6" O), a 1.109 m de altitud. Estaba posado sobre una rama seca de lenga (*Nothofagus pumilio*), a unos 12 metros del suelo. Ante la presencia del observador se alejó con vuelo pausado, sin emitir sonido.

El avistaje se produjo en una estepa graminosa arbustiva ubicada en el valle del río Ñirihuau, provincia de Río Negro. La vegetación está compuesta principalmente por gramíneas, arbustos y subarbustos como neneo (*Mulinum spinosum*), *Berberis* sp., pimpinela (*Acaena* sp.) y paramelas (*Adesmia* sp.), entre otras. También se encuentran parches aislados de lenga y ñire (*Nothofagus antarctica*), de 8 a 12 m de altura. En este sector, el valle está flanqueado por faldeos de exposición oeste-noroeste y este-sudeste,

cubiertos por arbustales bajos y bosques maduros de lenga, respectivamente.

Si bien el aguilucho cola rojiza ya estaba registrado para el Parque Nacional Nahuel Huapi (Chebez *et al.*, 1998), es una especie poco conocida, endémica de los ambientes cordilleranos de la Argentina y Chile, cuya distribución en la Patagonia está más relacionada con hábitats boscosos y sus bordes (FjeldsÅ y Krabbe, 1990; Gelain y Trejo, 2001).

Agradezco a Verónica Michelli y Mauro Tamone, quienes colaboraron en la salida de campo y a la doctora Ana Trejo por sus comentarios y la revisión del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques