



AVES NUEVAS O RARAS PARA LA RESERVA COSTANERA SUR, CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Horacio Reinaudo.

Alsina 259 7 piso 1 (1.704), Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: cranioleuca@hotmail.com

Se observaron y fotografiaron tres especies raras en la Reserva Ecológica Costanera Sur, que no estaban mencionadas en Narosky *et al.* (1996).

En la primera quincena de enero de 2001 se registró un adulto de tijerilla (*Xenopsaris albinucha*) alimentando a dos pichones. La especie ya figura como accidental para los bosques de la reserva (Babarskas y Zelaya, 1994), pero no estaba documentada como nidificante en el lugar.

Un ejemplar de tuquito rayado (*Empidonomus varius*) fue avistado sobre cortaderas (*Cortaderia selloana*) a principios de febrero de 2001. Figuraba como accidental para los bosques de Costanera Sur (Babarskas y Zelaya, 1994).

Un individuo de cerquero amarillo (*Atlapetes citrinellus*) fue observado a mitad de febrero de 2001 en los árboles de la reserva. La especie no estaba registrada en Costanera Sur y tiene escasos registros

para la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993); estos ejemplares serían escapados de cautiverio.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BABARSKAS, M. y D. ZELAYA. 1994. Las aves de la Reserva Costanera Sur. Asociación Ornitológica del Plata.

NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 127 páginas.

NAROSKY, T., C. HENSCHKE y D. YZURIETA. 1996. Aves de Costanera Sur y Ciudad de Buenos Aires. Guía para su reconocimiento. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 71 páginas.

AVISTAJE DEL AGUILUCHO COLA ROJIZA (*BUTEO VENTRALIS*) EN LA ZONA DEL RÍO ÑIRIHUAU, PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI

Hernán Pastore.

Proyecto Huemul - Wildlife Conservation Society y Fundación Vida Silvestre Argentina. Quaglia 725 (8.400) San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Correo electrónico: hpastore@bariloche.com.ar

El 14 de marzo de 2002 fue observado un ejemplar de aguilucho cola rojiza (*Buteo ventralis*) en la seccional Ñirihuau del Parque Nacional Nahuel Huapi (41° 19' 12,5" S; 71° 16' 22,6" O), a 1.109 m de altitud. Estaba posado sobre una rama seca de lenga (*Nothofagus pumilio*), a unos 12 metros del suelo. Ante la presencia del observador se alejó con vuelo pausado, sin emitir sonido.

El avistaje se produjo en una estepa graminosa arbustiva ubicada en el valle del río Ñirihuau, provincia de Río Negro. La vegetación está compuesta principalmente por gramíneas, arbustos y subarbustos como neneo (*Mulinum spinosum*), *Berberis* sp., pimpinela (*Acaena* sp.) y paramelas (*Adesmia* sp.), entre otras. También se encuentran parches aislados de lenga y ñire (*Nothofagus antarctica*), de 8 a 12 m de altura. En este sector, el valle está flanqueado por faldeos de exposición oeste-noroeste y este-sudeste,

cubiertos por arbustales bajos y bosques maduros de lenga, respectivamente.

Si bien el aguilucho cola rojiza ya estaba registrado para el Parque Nacional Nahuel Huapi (Chebez *et al.*, 1998), es una especie poco conocida, endémica de los ambientes cordilleranos de la Argentina y Chile, cuya distribución en la Patagonia está más relacionada con hábitats boscosos y sus bordes (FjeldsÅ y Krabbe, 1990; Gelain y Trejo, 2001).

Agradezco a Verónica Michelli y Mauro Tamone, quienes colaboraron en la salida de campo y a la doctora Ana Trejo por sus comentarios y la revisión del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques



► COMUNICACIONES

nacionales de la Argentina. Monografía LOLA, 12. Buenos Aires, 126 páginas.
 FJELDSÅ, J. y N. KRABBE. 1990. Birds of the high Andes. Zoological Museum, University of Copenhagen

y Apollo Books, Svendborg, Denmark, 876 páginas.
 GELAIN, M. A. y A. TREJO. 2001. Nuevos registros del aguilucho cola rojiza (*Buteo ventralis*) en la Patagonia argentina. El Hornero, 16 (2), 97-99.

REGISTROS DE PASSERIFORMES NUEVOS O POCO COMUNES PARA EL SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Christian Savigny.

Remolcador Guarani 979 B (7.600) Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: savigny@copetel.com.ar

Saíra de antifaz (*Pipraeidea melanonota*). Observada en la Laguna de los Padres durante la primera semana de agosto de 1992 (coincidiendo con la mas reciente nevada importante ocurrida en la zona). Hasta el momento de enviar esta comunicación se la ha observado esporádicamente en esa reserva y jardines de la ciudad de Mar del Plata generalmente en parejas, con mayor frecuencia en el período otoño-invernal. El 14 de julio de 1998 fueron observados dos ejemplares posados en lo alto de una cortadera (*Cortaderia selloana*), en las cercanías del balneario San Cayetano (38° 45' S; 59° 27' O), observación realizada junto a E. H. Chiurla, F. Donatti, J. P. Isacch, F. Rodríguez y R. C. Ymbernón. En la provincia de Buenos Aires es considerada una ocasional visitante invernal en selvas y bosques ribereños (Narosky y Di Giacomo, 1993). Fue registrada también en Bahía Blanca y Necochea (Delhey y Carrete, 1999; Döke, 2001).

Piquitodeoro común (*Catamenia analis*). Registrado en dos o tres ocasiones (Rogelio Ymbernón, com. pers.); durante el invierno de 1988 en la zona de la Villa Marista, Mar del Plata. En todos los casos se observó un individuo, que perchaba en un *Cotoneaster* sp. y bajaba al césped. Es citado como un raro visitante estival en sierra de la Ventana y cercanías (Narosky y Di Giacomo, 1993). Si bien es una especie frecuentemente incluida en el comercio de mascotas no debería descartarse fuera un ejemplar errante o colonizador. Estos registros son los primeros en el sudeste bonaerense.

Chopí (*Gnorimopsar chopi*). Observado con asiduidad en el parque de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, durante el invierno y primavera de 1996; con un máximo de cuatro ejemplares juntos. Fueron registrados tanto en la arboleda como posados en el césped, en compañía de torcaza (*Zenaida auriculata*), gorrión (*Passer domesticus*), chingolo (*Zonotrichia capensis*), zorzal colorado (*Turdus rufiventris*) y tordo músico (*Agelaioides badius*). En diciembre de 1997 fue observado un ejemplar en la zona residencial de Mar del Plata, bastante arisco, que se bañaba en un charco de agua. Utilizada como mascota enjaulada, la especie es propia de regiones más norteñas; en la provincia solo contaría con observaciones recientes de ejemplares presuntamente escapados de cautiverio en la ciudad de Buenos Aires y zonas cercanas (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Agradezco a Rogelio Ymbernón quien me comunicó algunos de sus registros para esta comunicación y a dos revisores anónimos.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- DELHEY, J. K. y M. CARRETE. 1999. Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 40: 11-12.
 DÖKE, J. D. 2001. Viuva (*Pipraeidea melanonota*) en Necochea, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 41: 34.
 NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.