



► COMUNICACIONES

nacionales de la Argentina. Monografía LOLA, 12. Buenos Aires, 126 páginas.
 FJELDSÅ, J. y N. KRABBE. 1990. Birds of the high Andes. Zoological Museum, University of Copenhagen

y Apollo Books, Svendborg, Denmark, 876 páginas.
 GELAIN, M. A. y A. TREJO. 2001. Nuevos registros del aguilucho cola rojiza (*Buteo ventralis*) en la Patagonia argentina. El Hornero, 16 (2), 97-99.

REGISTROS DE PASSERIFORMES NUEVOS O POCO COMUNES PARA EL SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Christian Savigny.

Remolcador Guarani 979 B (7.600) Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: savigny@copetel.com.ar

Saíra de antifaz (*Pipraeidea melanonota*). Observada en la Laguna de los Padres durante la primera semana de agosto de 1992 (coincidiendo con la mas reciente nevada importante ocurrida en la zona). Hasta el momento de enviar esta comunicación se la ha observado esporádicamente en esa reserva y jardines de la ciudad de Mar del Plata generalmente en parejas, con mayor frecuencia en el período otoño-invernal. El 14 de julio de 1998 fueron observados dos ejemplares posados en lo alto de una cortadera (*Cortaderia selloana*), en las cercanías del balneario San Cayetano (38° 45' S; 59° 27' O), observación realizada junto a E. H. Chiurla, F. Donatti, J. P. Isacch, F. Rodríguez y R. C. Ymbernón. En la provincia de Buenos Aires es considerada una ocasional visitante invernal en selvas y bosques ribereños (Narosky y Di Giacomo, 1993). Fue registrada también en Bahía Blanca y Necochea (Delhey y Carrete, 1999; Döke, 2001).

Piquitodeoro común (*Catamenia analis*). Registrado en dos o tres ocasiones (Rogelio Ymbernón, com. pers.); durante el invierno de 1988 en la zona de la Villa Marista, Mar del Plata. En todos los casos se observó un individuo, que perchaba en un *Cotoneaster* sp. y bajaba al césped. Es citado como un raro visitante estival en sierra de la Ventana y cercanías (Narosky y Di Giacomo, 1993). Si bien es una especie frecuentemente incluida en el comercio de mascotas no debería descartarse fuera un ejemplar errante o colonizador. Estos registros son los primeros en el sudeste bonaerense.

Chopí (*Gnorimopsar chopi*). Observado con asiduidad en el parque de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, durante el invierno y primavera de 1996; con un máximo de cuatro ejemplares juntos. Fueron registrados tanto en la arboleda como posados en el césped, en compañía de torcaza (*Zenaida auriculata*), gorrión (*Passer domesticus*), chingolo (*Zonotrichia capensis*), zorzal colorado (*Turdus rufiventris*) y tordo músico (*Agelaioides badius*). En diciembre de 1997 fue observado un ejemplar en la zona residencial de Mar del Plata, bastante arisco, que se bañaba en un charco de agua. Utilizada como mascota enjaulada, la especie es propia de regiones más norteñas; en la provincia solo contaría con observaciones recientes de ejemplares presuntamente escapados de cautiverio en la ciudad de Buenos Aires y zonas cercanas (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Agradezco a Rogelio Ymbernón quien me comunicó algunos de sus registros para esta comunicación y a dos revisores anónimos.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- DELHEY, J. K. y M. CARRETE. 1999. Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 40: 11-12.
 DÖKE, J. D. 2001. Viuva (*Pipraeidea melanonota*) en Necochea, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 41: 34.
 NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.