

Tordo gigante (*Scaphidura orycivora*) en Escobar, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Por Julio Schindler¹ y Horacio Reinaudo. ¹Alsina 259 7 piso 1 (1704), Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correos electrónicos: lorohablador@hotmail.com, cranioleuca@hotmail.com

El 15 de julio de 2001 fue observado un macho de tordo gigante (*Scaphidura orycivora*) en los Bajos del Cazador, Escobar, partido homónimo, provincia de Buenos Aires. Se encontraba en el suelo siguiendo los movimientos de una vaca, junto a un picabuey (*Machetornis rixosus*) a quien doblaba en tamaño. Cuando nos acercamos voló hacia una cerca de madera, luego a un árbol cercano y finalmente se alejó esquivo. Podría tratarse de un ejemplar escapado de una colección privada.

El límite austral conocido de esta especie se encuentra en el norte de Corrientes (Contreras, 1983; Chebez y Heinonen, 1987; Darrieu y Camperi, 1994). No existen registros anteriores para la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993).

BIBLIOGRAFÍA CITADA: CHEBEZ, J. C. y HEINONEN FORTABAT. 1987. Novedades ornitogeográficas argentinas. I. Nótulas faunísticas, 2: 1-2. CONTRERAS, J. R. 1983. Nota sobre el peso de aves argentinas. III. Historia Natural, 3 (8): 95-96. DARRIEU, C. y A. CAMPERI. 1994. Estudio de una colección de aves de Corrientes: Thraupidae e Icteridae. Neotrópica, 40 (103-104): 49-55. NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 127 páginas.

Burrito pico rojo (*Neocrex erythrops*) y burrito enano (*Coturnicops notatus*) en Santa Fe, Argentina

Por Martín Rodolfo de la Peña. 3 de Febrero 1870, (3080) Esperanza, Santa Fe, Argentina

El 28 de enero de 2000 apareció en el parque de una casa en las afueras de la ciudad de Santa Fe, próxima a la laguna Setubal, un ejemplar de burrito pico rojo (*Neocrex erythrops*). Estaba disminuido de peso y a pesar de los cuidados, murió. No se pudo determinar los motivos de su estado ni cómo llegó al lugar. Esta es la primera cita para la provincia. La especie se distribuye por Jujuy, Salta, Tucumán (Olrog, 1963; De la Peña, 1999), Chaco (Salvador y Narosky, 1987), Formosa (López Lanús, 1997) y Chubut (Camperi, 1992).

El 22 de setiembre de 2001, en el patio de una casa en la ciudad de Esperanza, se encontró un ejemplar de burrito enano (*Coturnicops notatus*). Estaba en buenas condiciones físicas y fue devuelto a su ambiente. De esta especie se conoce un ejemplar taxidermizado que se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Santa Fe y fue capturado en las afueras de la ciudad de Santa Fe el 21 de enero de 1941. Se trataría de la segunda cita para la provincia.

BIBLIOGRAFÍA CITADA: CAMPERI, A. R. 1992. Hallazgo extralimitar del burrito pico rojo *Neocrex erythrops olivascens*. Nuestras Aves, 27: 30-31. DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves Argentinas. Lista y distribución. LOLA. Buenos Aires, 195 páginas. LÓPEZ LANÚS, B. 1997. Inventario de las aves del Parque Nacional "Río Pilcomayo", Formosa, Argentina. Monografía LOLA, 4. Buenos Aires, 78 páginas. OLROG, C. C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Opera Lilloana, 9: 1-377. SALVADOR, S. y T. NAROSKY. 1987. Nuevos registros para aves argentinas. Nuestras Aves, 13: 9-11.