

CURIOSA COSTUMBRE DE OCULTAMIENTO DE LOS PICHONES EN GALLITO DE AGUA

Hace años que observo estos bellos ejemplares de nuestra avifauna (*Jacana jacana*) y he tenido la oportunidad de comprobar la costumbre de ocultamiento de sus pichones en un bañado adyacente al arroyo Yuquerí Grande, en el departamento de Concordia, provincia de Entre Ríos, como asimismo en una laguna del departamento Monte Caseros en la provincia de Corrientes, ambos sitios con abundante vegetación acuática donde las jacanas permanecen durante todo el año.

Los pichones, ya crecidos, aunque sin estar capacitados para volar, recorren el bañado en compañía de sus padres, caminando sobre los camalotes y demás plantas flotantes. Ante la presencia de algún intruso, los adultos dan agudos gritos de alerta y se alejan del lugar, a veces en dirección al campo. Los pichones, que aparentemente quedan desprotegidos y a merced del usurpador, corren por la superficie pero ante la inminencia del peligro de pronto se sumergen

desapareciendo de la vista. Por largo rato observé en silencio el lugar sin señal de aparición de los pichones sumergidos. Caminando me adentré al bañado hasta el preciso lugar de la inmersión sin encontrar al principio rastro alguno. Tras muy prolija observación descubrí lo que parecía un tallito seco que sobresalía del agua, al alcance de mi mano. Al principio me resistí a pensar que pudiera ser el pico del pichón que permanecía en total inmovilidad, confiando más en su mimetismo que en una apresurada y tal vez tardía huída. Pero bastó tomarlo para comprobar que efectivamente se trataba del pico del pichón, que sobresalía desde los orificios nasales hacia arriba. Su posición era vertical dentro del agua y habría podido pasar muy cerca de él sin que diera señales de su presencia.

Faustino Juan Torrano
Concordia -E. Ríos-

NOTAS SOBRE LA MONJITA CASTAÑA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Monjita Castaña (*Xolmis rubetra*) es una especie migratoria que en invierno llega a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no existen muchos registros concretos sobre su presencia en el primer estado argentino.

Mediante esta nota se dan a conocer algunas observaciones realizadas en Salto, Buenos Aires.

El 11 de julio de 1985, junto a Adrián Di Giacomo, fueron observados 6 ó 7 ejemplares en un campo arado. Compartían el lugar con otros dos visitantes invernales, el Chocolate (*Neoxolmis rufiventris*) y el Chorlo Cabezón (*Oreopholus ruficollis*).

El 14 de setiembre de 1985 en un potrero con pastos muy cortos, cerca de un curso esporádico de agua, se encontró un grupo de unas 30 monjitas. Al día siguiente sólo había media docena de ellas.




Foto: Axel Bos

Son aves muy activas y confiadas. Mediante breves carreritas recorren el terreno en busca de alimento. Se posan en diversas elevaciones de la tierra, cardos, matas, rara vez en los alambrados. Su vuelo es bajo, ágil y no muy prolongado. En ningún momento se las escuchó emitir canto alguno.

Hudson (1974) llamó a esta especie Diu-cón Espalda Castaña. Dice haberla encontrado en el Río Negro, durante cualquier época del año. Sobre su comportamiento comenta que en el modo de correr por la tierra se parece a las Muscisaxicolas (Dormilonas).

Pereyra (1925) la encontró, formando bandadas sobre los campos arados, en Con-helo (La Pampa).

Marelli (1933) la observó en Bahía Blanca.

Ringuelet y Aramburu (1957) indican la presencia de la Monjita Castaña en el NE y S de la provincia.

No es incluida por Narosky (1978).

Olog (1979) señala que habita campos arbustivos con pajonal en Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. En otoño migra

hacia las provincias centrales, Santa Fe, San-tiago del Estero y Tucumán.

BIBLIOGRAFIA

- Hudson, G. E. 1974. Aves del Plata. Libros de Hispanoamérica. Buenos Aires.
- Marelli, C. A. 1933. Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. "El Hornero" 5 (2), pág. 193-199.
- Narosky, T. 1979. Aves Argentinas. Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. A.O.P. Buenos Aires.
- Olog, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilioana XXVII. Tucumán.
- Pereyra, J. A. 1925. Segunda lista de las aves colectadas en la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. "El Hornero" 4 (1), pág. 23-34.
- Ringuelet, R. A. y R. H. Aramburu. 1957. Enumeración Sistemática de los Vertebrados de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Asuntos Agrarios. La Plata.

Alejandro G. Di Giacomo
Ornitogúia

PEQUEÑA BANDADA DE JILGUEROS EUROPEOS AVISTADA EN LAS AFUERAS DE BUENOS AIRES

El 17 de setiembre de 1985 por la tarde, durante una reciente estadía en la Argentina, tuve ocasión de hacer como en varias visitas anteriores, un paseo por el parque de la antigua estancia de Pacheco en la vecindad de la estación General Pacheco (F. C. Mitre, partido de Tigre). Al pie de una barranca, en un montecito de talas que linda con un potrero bajío, percibí las vocalizaciones de una bandadita de avecillas que me sonaban muy familiares pero que, aunque algo parecidas a las del Cabecita Negra, (*Carduelis magellanicus*), no podía asociar con ninguna de las especies locales que conocía. No tuve dificultades en

acercarme, y desde unos 8 metros pude observar detenidamente con prismáticos 10 x 50 y bajo luz ideal a 3 diferentes miembros del grupo (oía a varios individuos más pero no podía distinguirlos entre el ramaje). El reconocimiento fue inmediato y perfecto ya que se trataba de ejemplares del llamativo e inconfundible Jilguero Europeo (*Carduelis carduelis*), que pocas semanas antes había observado en las cercanías de Bochum (Ruhr, Alemania), ciudad en la que habitualmente resido. Los jilgueros permanecieron llamando y cantando unos 5 minutos entre los talas para alejarse en bandada (por lo menos 10 indivi-